



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 16.06.2023  
Αριθ. πρωτ: 498/15946

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα  
Πληροφορίες: Α. Μπρατίδου Παρλαπάνη  
Τηλέφωνο: 210 9287228  
e-mail: [abratidou@minagric.gr](mailto:abratidou@minagric.gr)

Προς: AIFAR SPA, Ιταλίας  
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας  
ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ ΑΕ,  
Μουρούζη 9, 10674, Αθήνα)  
email: [info@anorgachim.com](mailto:info@anorgachim.com)

**ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 8236 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) VIO-GIBB 5 SL (Gibberellic acid 5% β/β) ως προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης και την προστασία του καταναλωτή»**

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - γ) του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
  - α) (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 45 και 37.4 αυτού.
  - β) ΕΕ) με αριθμ. 2022/708 της Επιτροπής της 5ης Μαΐου 2022 για την έγκριση της δραστικής ουσίας etherphon για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών ...**γιββερελλικό οξύ...**
  - γ) ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
  - ε) (ΕΚ) με αριθμ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
4. Την από 04/2022 σχετική Έκθεση Αξιολόγησης της Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης της Ιταλίας.
5. Την αριθμ. 7469/87016/05.08.2015 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 8236 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) VIO-GIBB 5 SL (Gibberellic acid 5% β/β) ως προς το φάσμα δράσης και τα στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας

ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους, τις δηλώσεις προφύλαξης και την προστασία του καταναλωτή.

6. Τις αριθμ. 5118/138336/28.05.2020 και 498/15946/18.01.2023 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε την αριθμ. **8236** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **(φυτορρυθμιστική ουσία) VIO-GIBB 5 SL (Gibberellic acid 5% β/β) ως προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης και την προστασία του καταναλωτή**, που χορηγήθηκε με την αριθμ. 7469/87016/05.08.2015 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Τα σημεία **5, 11 και 13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού	κ.εκ./στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Κλημεντίνες CIDCL	1. Για αύξηση της καρπόδεσης και της παραγωγής  2. Για παράταση του χρόνου συγκομιδής.	20	30	150	1. Μέχρι 2 εφαρμογές στην πλήρη άνθηση μέχρι το τέλος της άνθησης (BBCH 65-71).  2. Μία εφαρμογή όταν οι καρποί αλλάζουν χρώμα (BBCH 81).	3 / 7
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Πορτοκαλιά CIDSI Μανταρινιά CIDRE	1. Για αύξηση της καρπόδεσης και του αριθμού των συγκομιζόμενων καρπών.  2. Για καθυστέρηση της ωρίμανσης.	5-30	10-30	100-200	Μέχρι 2 εφαρμογές στην πλήρη άνθηση έως την έναρξη της καρπόδεσης (BBCH 65-71).  Μία εφαρμογή όταν οι καρποί αρχίζουν να αλλάζουν χρώμα – έναρξη της ωρίμανσης (BBCH 81).	3 / 7
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Λεμονιά CIDLI	1. Για αύξηση της καρπόδεσης και της συνολικής παραγωγής.  2. Για καθυστέρηση	5-30	10-30	100-200	Από την αρχή της καρπόδεσης και μέχρι την έναρξη αλλαγής του	2 / 7

	<b>της ωρίμανσης.</b>				<b>χρώματος των καρπών (BBCH 71-81).</b>	
ΑΜΠΕΛΙ Επιτραπέζιες άσπερμες ποικιλίες VITVI	Για αύξηση του μήκους του τσαμπιού και του μεγέθους των ραγών.	1-40	1-12	30-100	έξι (6) εφαρμογές από την έναρξη της άνθησης μέχρις ότου οι ράγες αποκτήσουν μέγεθος 3 mm. (BBCH 60-77).	6 / 2-3
ΑΜΠΕΛΙ Επιτραπέζιες ένσπερμες ποικιλίες VITVI	Για αύξηση του μήκους του τσαμπιού και του μεγέθους των ραγών.	8-20	8-16	80-100	Εφαρμογές από τη διόγκωση των ταξιανθιών μέχρις ότου οι ράγες αποκτήσουν μέγεθος 3 mm. (BBCH 55-75).	4 / 7
Αγκινάρα CYUSC	Πρωίμηση και αύξηση της παραγωγής	20	16	80	Εφαρμογές από την εμφάνιση μέχρι την πλήρη ανάπτυξη της κεφαλής. (BBCH 40-49)	3 / 7
Κερασιά PRNAV  (Χρήση Ήσσοнос Σημασίας)	Βελτίωση της καρπόδεσης, επιβράδυνση της ωρίμανσης, αύξηση του μεγέθους και του βάρους του καρπού, της συνεκτικότητας του καρπού, των περιεχόμενων σακχάρων και της παραγωγής, μείωση του σχισίματος των καρπών.	20-40	20-40	100	Εφαρμογές από όταν οι καρποί αποκτήσουν το 70% του τελικού μεγέθους μέχρι την έναρξη χρωματισμού τους. (BBCH 77-81)	2/7
Τομάτα (Υ+Θ) LYPES	Για αύξηση της καρπόδεσης, του αριθμού των συγκομιζόμενων καρπών και της συνολικής παραγωγής.	10-40	8-16	40-80	Από την έκπτυξη της 9 <sup>ης</sup> ταξιανθίας και μέχρι την ανάπτυξη των καρπών (BBCH 59-75).	3 / 7

Αχλαδιά ΡΥΥCO	1. Για αύξηση της καρπόδεσης, του αριθμού των συγκομιζόμενων καρπών και της συνολικής παραγωγής.  2. Για καθυστέρηση της ωρίμανσης.	10-40	20-40	100-200	Από την έναρξη της άνθησης και μέχρι την πλήρη άνθηση (BBCH 61-65).	2 / 7
Φράουλα (Υ+Θ) FRAAN	Για αύξηση της καρπόδεσης, του αριθμού των συγκομιζόμενων καρπών και της συνολικής παραγωγής.	10-40	8-16	40-80	Από την έναρξη της άνθησης και μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης. (BBCH 61-81).	3 / 7

## Παρατηρήσεις:

1. Στις επιτραπέζιες ένσπερμες ποικιλίες αμπελιού, οι δύο πρώτες εφαρμογές (στη διόγκωση των ταξιανθιών και όταν έχουν πέσει το 40% των πυλιδίων) να γίνονται με δόση 8 κ.εκ./στρ., η τρίτη εφαρμογή (στην έναρξη ανάπτυξης των καρπών) με δόση 12 κ.εκ./στρ. και η τέταρτη εφαρμογή (όταν οι ράγες αποκτήσουν μέγεθος 3 mm) με δόση 16 κ.εκ./στρ.
2. Οι δόσεις εφαρμογής στο Αμπέλι μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις καλλιεργούμενες ποικιλίες και τις συνθήκες ανάπτυξης.
3. Στην Κερασιά, για την αύξηση του μεγέθους και του βάρους του καρπού, της συνεκτικότητας του καρπού και των περιεχόμενων σακχάρων συνίσταται εφαρμογή με 40 κ.εκ./στρ., ενώ για την αύξηση της παραγωγής και τη μείωση του σχισίματος των καρπών συνίσταται εφαρμογή με 30 κ.εκ./στρ.
4. Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της Κερασιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για την εν λόγω χρήση, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχιές που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

11

Δηλώσεις προφύλαξης:

P102+405: Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.

P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**«Φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος»****«Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκάσμό, φοράτε μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο»**

SP1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους).

EUH401: «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

**13 Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Πεδίο Εφαρμογής	ΡΗΙ (σε ημέρες)
<b>Πορτοκάλια, Μανταρίνια/ Κλημεντίνες, Λεμόνια, Σταφύλια (ένσπερμα και άσπερμα), Αγκινάρες, Κεράσια, Τομάτες (Υ+Θ), Αχλάδια, Φράουλες (Υ+Θ)</b>	--

- II. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 7469/87016/05.08.2015 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**