



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 5 ΚΑΙ 13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 19/10/2023
Αριθ. πρωτ.: 9768/279351

Ταχ. Δ/ση:	Λ. Συγγρού 150	Προς:	ΑΔΑΜΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ
Ταχ. Κώδικας:	176 71 - ΑΘΗΝΑ		ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλ.:	210 9287223		Λεωφόρος Κηφισίας 44, Κτήριο Γ Μαρούσι
Πληροφορίες:	Ι. Καλαϊτζόγλου		15125, Αθήνα
e-mail:	ikalaitzoglou@minagric.gr	e-mail:	technical@adama.com

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) ΖΙΛΙΟΝ 10 EC (δ.ο. propraquizafor 10 % β/ο)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - i. Του νόμου 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως ισχύει.
 - ii. Του νόμου 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
 - iii. Του νόμου 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - i. (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
 - ii. (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25^{ης} Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, όπως ισχύει.
 - iii. (ΕΕ) αριθ. 2023/1757 της Επιτροπής της 11^{ης} Σεπτεμβρίου 2023 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών.... propraquizafor....
 - iv. (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - v. (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
 - vi. (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
 - vii. (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει.

3. Το αριθμ. 79/2023 Π.Δ. “Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών” (Α’131/27.06.2023).
4. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β’4612/19-10-20).
5. Τη με αριθ. 70095 έγκριση του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού σκευάσματος (ζιζανιοκτόνο) AGIL 10 EC (propaquizafop 10% β/ο), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 9582/106948/27.08.2014 Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Τη με αριθμό πρωτ. 9768/279351/12.09.2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν ZILION 10 EC της εταιρείας ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

70504

19.10.2023

28.02.2028

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
1.2.β Μορφή

ZILION 10 EC

Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

propaquizafop

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

92% (β/β) min

Χημική ομάδα

Αρυλοξυφαινοξυαλκανοϊκά οξέα

Παρασκευαστής

ADAMA AGAN LTD

Northern Industrial Zone,

Ταχ. Δ/ση: P.O.B. 262,

77 102 - Ashdod, Ισραήλ

Dr. Geula Dagan

Τηλ.: +972 / 7 / 32321325

E-mail: Geula.Dagan@adama.com

European address:

ADAMA Agricultural Solutions Ltd

c/o **ADAMA Deutschland GmbH**

Edmund Rumpler Str. 6

51149 Köln, Γερμανία

Dr. Wolfgang Busch

Τηλ. +49 2203 5039-501

E-mail: Wolfgang.Busch@de.adama.com

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
ADAMA AGAN LTD
 Northern Industrial Zone,
 Ταχ. Δ/ση: P.O.B. 262,
 77 102 - Ashdod, Ισραήλ
 Dr. Geula Dagan
 Τηλ.: + 972 / 7 / 32321325
 E-mail: Geula.Dagan@adama.com

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας proaquizafor προσδιορίζονται στην με αριθμό πρωτ. 134262/19-11-2009 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το προϊόν αναφοράς AGIL 10 EC, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
 Λεωφόρος Κηφισίας 44, Κτήριο Γ
 Μαρούσι 151 25, Αθήνα
 Τηλ.: 211 120 5570
 Fax.: 211 120 5572
 E-mail: technical@adama.com

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

--

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ,
 Λεωφόρος Κηφισίας 44, Κτήριο Γ Μαρούσι 151 25
 Τηλ.: 211 120 5570
 Fax.: 211 120 5572
 E-mail: technical@adama.com
Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

ADAMA AGAN LTD
 Northern Industrial Zone,
 Ταχ. Δ/ση: P.O.B. 262,
 77 102 - Ashdod, Ισραήλ
 Dr. Geula Dagan
 Τηλ.:+ 972 / 7 / 32321325
 E-mail: Geula.Dagan@adama.com

ε) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
ADAMA AGAN LTD
 Northern Industrial Zone,
 Ταχ. Δ/ση: P.O.B. 262, 77 102 - Ashdod, Ισραήλ
 Dr. Geula Dagan
 Τηλ.: + 972 / 7 / 32321325
 E-mail: Geula.Dagan@adama.com

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
1. ADAMA AGAN LTD
 Northern Industrial Zone,
 Δ/ση: P.O.B. 262, 77 102 - Ashdod, Ισραήλ
 Dr. Geula Dagan
 Τηλ.: + 972 / 7 / 32321325
 E-mail: Geula.Dagan@adama.com
2. MAGMA-AGRO AEBE
 Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτίας 32 011 - Οινόφυτα,
 Βοιωτίας
 Τηλ.: 2262 – 30821-3
 FAX: 2262 – 30820
 E-mail: nikos.kosmidis@magma-agro.gr

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: propaquizafop 10% (β/ο)
Βοηθητικές ουσίες: 89,5% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε στη με αριθ. πρωτ. 6134/63481/31.5.12 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το προϊόν αναφοράς AGIL 10 EC. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλη	75 κ.εκ. έως και 1 λίτρου	Πλαστικό multilayer τύπου COEX (PE/PA) ή (HDPE/EVOH) ή τύπου HDPE/PA ή fluorinated HDPE
2.	Δοχεία	2 λίτρων έως και 20 λίτρων	Πλαστικό multilayer τύπου COEX (PE/PA) ή (HDPE/EVOH) ή HDPE/PA ή τύπου HDPE/PA ή fluorinated HDPE
3.	Βαρέλι	200 λίτρων	Μεταλλικά βαρέλια με εξωτερική επένδυση alkyl melamine ή polyester και εσωτερική επένδυση epoxy phenolic lacquer

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Μεταφυτρωτικός ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 20-60 λίτρα νερό το στρέμμα. Χρησιμοποιείστε μπεκ τύπου σκούπας . Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 45 psi (2-3 atm)

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το ψεκαστικό μέσο μέχρι τα $\frac{3}{4}$ με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιώστε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

Συνδυαστικότητα:

Συνδυάζεται με τα σκευάσματα Goltix 70 SC, Ethosat 50 SC και Ethofumesate Αλφα 50 SC.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό, μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών αγρωστωδών ζιζανίων. Το proaquizafor απορροφάται από τα φύλλα των ζιζανίων και μεταφέρεται στις ρίζες, στους στόλωνες και στα ριζώματα.

Τα ψεκασμένα ζιζάνια σταματούν να αναπτύσσονται 1 – 2 ημέρες μετά την εφαρμογή. Τα νεότερα φύλλα γίνονται κίτρινα και το χαμηλότερο μέρος των βλαστών νεκρώνεται. Τελικά όλο το ζιζάνιο καταστρέφεται μέσα σε 10 – 20 ημέρες, ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά Καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ		
Εσπεριδοειδή (Λεμονιά, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά /Κλημεντίνες, Γκρέιπ φρουτ, Φράπες, Περγαμόντο, Νεραντζιά, Κιτριά Κουμκουάτ) (CIDLI,CIDSI, CIDRE/CIDCL, CIDTG,CIDPA, CIDGR,CIDAB, CIDAU,CIDME, FOIJA)	Ετήσια και πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια *	α) 75-120 β) 150-200 γ)100-150	20-60	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. α) <u>Για ετήσια ζιζάνια</u> : από το στάδιο των 2-3 φύλλων έως την έναρξη επιμήκυνσης του στελέχους των ζιζανίων β) <u>Για πολυετή ζιζάνια</u> : όταν το ύψος των ζιζανίων είναι 15-20 εκ. γ) <u>Για το βέλιουρα (Sorghum halepense)</u> : όταν το ύψος των ζιζανίων είναι 30-40 εκ.	1 (πριν την άνθηση της καλλιέργειας)
Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Καστανιά, Φιστικιά Καρυδιά, Φουντουκιά, Κουκουναριά) (PRNDU,	>>	>>	>>	>>	1 (πριν την άνθηση της καλλιέργειας)

CSNSA,ΡΙΑΒΕ, ΙΥΓΡΕ,ΚΥΛΑΒ, ΡΙΥΡΝ)					
Μηλιά, Αχλαδιά (ΜΑΒΣΔ,ΡΥΥΣΣ)	>>	>>	>>	>>	1
Ροδακινιά, Νεκταρινιά (ΡΡΝΡΣ, ΡΡΝΡΝ)	>>	>>	>>	>>	1
Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά (ΡΡΝΑΡ, ΡΡΝΔΟ, ΡΡΝΑΥ)	>>	>>	>>	>>	1 (πριν την άνθηση της καλλιέργειας)
Αμπέλι (ΥΙΤΣΣ)	>>	>>	>>	>>	1
Καρότο Ρίζα μαϊντανού (ΔΑΥΚΣ,ΡΑΡΚΡ)	>>	α) 75-120 β) 150 γ) 100-150	>>	>>	1
Σκόρδο, Κρεμμύδια, Ασκαλώνια (ΑΛΛΣΑ, ΑΛΛΚΕ, ΑΛΛΑΣ)	>>	α) 75-120 β) 150-200 γ) 100-150	>>	>>	1
Τομάτα, Μελιτζάνα (ΛΥΡΕΣ, ΣΟΛΜΕ)	>>	>>	>>	>>	1
ΠΕΠΟΝΙ (υπαίθρου) (ΚΥΜΜΕ)	>>	>>	>>	>>	1
Μπρόκολο (ΒΡΣΟΚ)	>>	>>	>>	>>	1
Λάχανο Κουνουπίδι (ΒΡΣΟΛ, ΒΡΣΟΒ)	Ετήσια και πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια *	α) 75-120 β) 150 -200 γ) 100-150	20-60	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. α) <u>Για ετήσια ζιζάνια</u> : από το στάδιο των 2-3 φύλλων έως την έναρξη επιμήκυνσης του στελέχους των ζιζανίων β) <u>Για πολυετή ζιζάνια</u> : όταν το ύψος των ζιζανίων είναι 15-20 εκ. γ) <u>Για το βέλιουρα (Sorghum halepense)</u> : όταν το ύψος των ζιζανίων είναι 30-40 εκ.	1
Σπανάκι (ΣΡΚΟΛ)	>>	α) 75-120 β) 150 γ) 100-150	>>	>>	1

Μάραθος (FOEVU)	>>	α) 75-120 β) 125 γ) 100-125	>>	>>	1
Σπαράγγι (ASPOF)	>>	α) 75-120 β) 120 γ) 100-120	>>	>>	1
Φασολάκια, Αρακάς (φρέσκα) (PHSVX, PIBSX)	>>	α) 75-120 β) 150-200 γ) 100-150	>>	>>	1
Όσπρια: Αρακάς Ρεβίθια Φακές Φασόλια Λούπινα Κουκιά (PIBSX, CIEAR, LENCU, PHSVX, LUPSS, VICFX)	>>	α) 75-120 β) 150 -200 γ) 100-150	>>	>>	1
Ελαιοκράμβη Βαμβάκι Λινάρι (BRSNN, GOSSS, LINVU)	>>	α) 75-120 β) 150-200 γ) 100-150	>>	>>	1
Ηλιάνθος Σόγια (HELAN, GLXMA)	>>	75-120	>>	>>	1
Πατάτα (SOLTU)	>>	α) 75-120 β) 150 γ) 100-150	>>	>>	1
Ζαχαρότευτλα (BEAVA)	>>	α) 75-120 β) 150-200 γ) 100-150	>>	>>	1
Μηδική Τριφύλλι Βίκος (MEDSA) (TRFPR, VICSA)	>>	α) 75-120 β) 150 γ) 100-150	>>	>>	1
Καπνός (NIOTA)	>>	α) 75-120 β) 150-200 γ) 100-150	>>	>>	1
Καλλωπιστικά φυτά Φυτώρια	>>	α) 75-120 β) 150-200	>>	>>	1

Δασικά δένδρα		γ) 100-150			
Ρύζι (ORYSA)	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια	75-120	>>	Η εφαρμογή γίνεται πριν τη σπορά της καλλιέργειας και μεταφυτρωτικά των ζιζανίων (ως ανωτέρω) σε αποστραγγισμένο έδαφος	1
<p>Παρατηρήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Η εφαρμογή συνιστάται να γίνεται πριν καλυφθούν τα ζιζάνια από την καλλιέργεια. • Η δόση εφαρμογής κυμαίνεται ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων. <p>*Καταπολεμούμενα ζιζάνια: <u>Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια:</u> <i>Alopecurus myosuroides</i> (Αλεπονουρά)(ALOMY), <i>Avena fatua</i> & <i>A. sterilis</i> (Αγριοβρώμη μεγάλη και μικρή)(AVEFA,AVEST), <i>Bromus spp.</i> (Βρώμοι)(BROSS), <i>Digitaria sanguinalis</i> (Αιματόχορτο)(DIGSA), <i>Echinochloa crus-galli</i> & <i>E. colonum</i> (Μουχρίτσα & μικρή μουχρίτσα)(ECHCG,ECHCO), <i>Eleusine indica</i> (Ελευσίνη)(ELEIN), <i>Hordeum spp.</i> (αγριοκρίθαρο)(HORSS), <i>Lolium spp.</i> (Ήρες)(LOLSS), <i>Phalaris spp.</i> (Φαλαρίδες) (PHASS), <i>Panicum spp.</i> (Πάνικο)(PANSS), <i>Setaria spp.</i> (Σετάριες)(SETSS), <i>Sorghum halepense</i> (Βέλιουρας από σπόρο)(SORHA), <i>Triticum spp.</i> (Σιτάρια) (TRZSS)</p> <p><u>Πολυετή ζιζάνια:</u> <i>Agropyron/Elymus repens</i> (Αγρόπυρο/Ελυμος)(AGRRE), <i>Agrostis spp.</i> (Άγρωστης)(AGSSS), <i>Cynodon dactylon</i> (Αγριάδα)(CYNDA), <i>Paspalum spp.</i> (Πάσπαλο)(PASSS), <i>Poa trivialis</i> (Τραχεία λειβαδοπόα)(POATR), <i>Poa pratensis</i> (λεία λειβαδοπόα)(POAPR), <i>Sorghum halepense</i> (Βέλιουρας από ριζώματα)(SORHA).</p> <p>Για την χρήση ήσσονος σημασίας παντζαριού δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση αυτή ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. Υπεύθυνος σε σχέση με τις αποτυχίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα του προϊόντος για την χρήση αυτή, είναι το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν.</p> <p>Οι χρήσεις του πίνακα που ακολουθεί θα χορηγηθούν σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ όταν καθοριστούν στον κανονισμό 396/2005 MRLs. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή.</p>					
Μαρούλι και λοιπά σαλατικά Ραδίκι Μαϊντανός (φύλλα)	>>	α) 75-120 β) 150 γ) 100-150	>>	>>	1

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία **Proprazine**, η οποία ανήκει στην ομάδα **A** κατά **HRAC**.

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

--

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

Μην σπέρνετε σιτάρι/κριθάρι/σίκαλη και αραβόσιτο πριν περάσουν 10 εβδομάδες από την εφαρμογή του σκευάσματος.
Μην σπέρνετε βρώμη πριν περάσουν 16 εβδομάδες από την εφαρμογή του σκευάσματος.

Μην σπέρνετε μπιζέλι, φασόλι, ελαιοκράμβη πριν περάσουν 4 εβδομάδες από την εφαρμογή του σκευάσματος.

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Να αποφεύγεται η επανείσοδος των ανθρώπων μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και τον τρόπο εφαρμογής στις συνιστώμενες καλλιέργειες και στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

9 Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



GHS08



GHS09

10 Δηλώσεις
Επικινδυνότητας:

H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.

H351: Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.

H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

EUH208: Περιέχει **proprazifor**, μπορεί προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

11 Δηλώσεις
Προφύλαξης:

P405 +P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα.

P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.

«Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και γάντια και ολόσωμη φόρμα κατά την εφαρμογή»

«Σε περίπτωση επανεισόδου φοράτε παπούτσια μακρυμάνικη μπλούζα, μακρύ παντελόνι και γάντια»

P501: Διάθεση περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα.

SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από μη γεωργική γη.

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

- 12** Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

P308 + P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

P301 + P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

P331: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

P304 + P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με άφθονο νερό.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Λεμονιά (0110030), Πορτοκαλιά (0110020) Μανταρινιά /Κλημεντίνες (0110050), Γκρέιπφρουτ (0110010), Φράπες, Περγαμόντο (0110020-001), Νεραντζιά (0110020-002), Κιτριά (0110030-002), Κουμκουάτ (0161040), Αμυγδαλιά (0120010), Καστανιά (0120040), Φιστικιά (0120100) Καρυδιά (0120110), Φουντουκιά (0120060), Κουκουναριά (0120090) Δαμασκηλιά (0140040), Κερασιά (0140020), Βερικοκιά (0140010)	Δ.Ε. (Εφαρμογή πριν την άνθηση της καλλιέργειας)
Μηλιά (0130010), Αχλαδιά (0130020), Ροδακινιά (0140030), Νεκταρινιά (0140030-002) Αμπέλι (0151010 & 0151020), Καρότο (0213020), Ρίζα μαϊντανού (0213070) Σκόρδο (0220010), Κρεμμύδια (0220020), Ασκαλώνια (0220030), Τομάτα (0231010), Μελιτζάνα (0231030), Μπρόκολο (0241010), Λάχανο (0242020), Κουνουπίδι (0241020), Σπανάκι (0252010), Μάραθος (0810070), Σπαράγγι (0270010)	30
Φασολάκια (0260010 & 0260020), Αρακάς (φρέσκα) (0260040 & 0260030) Πατάτα (0211000), Καπνός	40
Ζαχαρότευτλα (0900010), Μηδική/ Τριφύλλι (0632010-003), Βίκος	45
Όσπρια: Αρακάς (0300030), Κουκιά (0300010-001), Ξηρά φασόλια 0300010, Φακές 0300020, Ρεβίθι (0260030-003), Λούπινα (0300040),	50
Πεπόνι (υπαίθρου) 0233010	60
Ελαιοκράμβη (0401060), Βαμβάκι (0401090), Ηλίανθος (0213050), Σόγια (0401070), Λινάρι (0401010)	90
Ρύζι (0500060)	Δ.Ε.

Οι παρακάτω τελευταίες επεμβάσεις πριν τη συγκομιδή θα συμπληρωθούν όταν και εάν χορηγηθούν οι χρήσεις στις καλλιέργειες

Μαρούλι (0251020) κ.α. σαλατικά, Ραδίκι (0255000), Μαϊντανός (φύλλα) (0256040-001)	30
--	----

- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από ηλιακό φως, το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο Παράρτημα III του προϊόντος αναφοράς, φυτοπροστατευτικού σκευάσματος (ζιζανιοκτόνο) AGIL 10 EC (proprazinefor 10% β/ο), με αριθμό έγκρισης 70095 και αριθμό πρωτ. 9582/106948/27.08.2014 όπως ισχύει, καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

--

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ