



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 11-2-2016
Αριθ. πρωτ: 7859/91081

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Μ. Γάσπαρη
Τηλέφωνο: 210 928 7250
e-mail: mgaspari@minagric.gr

Προς BASF Ελλάς ΑΒΕΕ
Λ. Μεσογείων 449
153 43 Αγία Παρασκευή
Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της με αριθ. 60098 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SIGNUM 26.7/6.7 WG σε χρήση ήσσονος σημασίας (καστανιά) »

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) «για την διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις»
3. Την με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 (ΦΕΚ 2587/Β'/14-10-2013) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας»
4. Τη με αριθ. 9379/119137/2.11.15 (ΦΕΚ 2367/Β'/4-11-2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής "με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού" στον Γενικό

Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

5. Την με αριθ. Πρωτ. 12116/137125/31-10-2014 αίτηση της εταιρείας BASF Agro Ελλάς ΑΒΕΕ
6. Το σημείωμα από την αρμόδια αρχή αξιολόγησης (αρ. πρωτ. 7856/91081/21-8-2015)
7. Την σχετική εισήγηση της υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Χορηγούμε διεύρυνση στη με αριθ. 60098 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυροπροστατευτικό προϊόν **SIGNUM 26.7/6.7 WG** (μυκητοκτόνο) που χορηγήθηκε με τη με αριθ. 95706/13-4-2011 ΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Καν. 1107/2009.

Συγκεκριμένα τα σημεία 5, 8, 9, 10, 11 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ/ στρέμμα (max)	γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρό	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Ροδακινιά Νεκταρινιά	Μονιλία (<i>Monilinia laxa</i>)	60-75	60-75	100	Από την έναρξη της άνθησης έως την πτώση των πετάλων και κατά την ανάπτυξη των καρπών.	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες εφόσον απαιτείται
	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	60	60			
Βερικοκιά	Μονιλία (<i>Monilinia laxa</i>)	60-75	60-75	100	Από την έναρξη της άνθησης έως την πτώση των πετάλων και κατά την ανάπτυξη των καρπών.	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες εφόσον απαιτείται
	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	60	60			
Δαμασκηνιά	Μονιλία (<i>Monilinia laxa</i>)	60-75	60-75	100	Από την έναρξη της άνθησης έως	Μέχρι 3 εφαρμογές με

	Ωιδιο (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	60	60		την πτώση των πετάλων και κατά την ανάπτυξη των καρπών.	μεσοδιάστημα α 7-14 ημέρες εφόσον απαιτείται
Κερασιά	Μονιλια (<i>Monilinia laxa</i>)	60-75	60-75	100	Από την έναρξη της άνθησης έως την πτώση των πετάλων.	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα α 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται
	Ωιδιο (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	60	60			
Φράουλα* (Θ)	Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i>)	135-150	135-150	100	Από την έναρξη της άνθησης μέχρι την ωρίμανση των καρπών.	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα α 5-7 ημέρες εφόσον απαιτείται
	Ωιδιο (<i>Sphaerotheca macularis</i>)	75-100	75-100			
Καρότο* (Υ)	Ωιδιο (<i>Erysiphe heraclei</i>)		100	80	Κατά την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα α 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται
	Αλτερνάρια (<i>Alternaria dauci</i>)	60-80	75			
Τομάτα, Πιπεριά* (Υ + Θ)	Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i>)	100-150	100-150	100	Έναρξη ψεκασμών με την εμφάνιση των πρωτων συμπτωμάτων της ασθένειας. Η μεγαλύτερη δόση θα πρέπει να εφαρμόζεται κάτω από έντονες συνθήκες προσβολής.	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα α 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται
	Ωιδιο (<i>Leveillula taurica</i>)					
Μαρούλι* (Υ)	Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i>)	60-75	120-150	50	Στην περίοδο της	Μέχρι 2 εφαρμογές

	Σκληρωτίνια (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)				έντονης ανάπτυξης της καλλιέργειας	με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται
Σπαράγγι	Σκωρίαση (<i>Puccinia asparagi</i>)	75-100	75-100	100	Από την έναρξη της άνθισης μέχρι τη γήρανση του υπέργειου τμήματος	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-15 ημέρες εφόσον απαιτείται
Κρεμμύδι, Σκόρδο (Υ)	Βοτρυτής (<i>Botrytis cinerea</i>), Περονόσπορος (<i>Peronospora destructor</i>)	150	150	100	Από το στάδιο της πάχυνσης της βάσης των φύλλων μέχρι την ανάπτυξη του ανθικού στελέχους.	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται
Αμυγδαλιά	Μονιλία (<i>Monilinia spp.</i>), Εξώασκος (<i>Taphrina deformans</i>)	100	67-100	100-150	Από την αρχή της άνθισης μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος.	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-15 ημέρες εφόσον απαιτείται
Φιστικιά	Καμαροσπόριο (<i>Botryosphaeria dothidea</i>)	75-100	50-100	100-150	Από την αρχή της άνθισης μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος.	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-15 ημέρες εφόσον απαιτείται

Φουντουκιά (μικρής σημασίας χρήση)	Αλτερνάρια (<i>Alternaria sp.</i>), Φουζάριο(<i>Fusarium lateritium.</i>), Ανθράκνωση (<i>Colletotrichum spp.</i>), Κλαδοσπόριο (<i>Cladosporium sp.</i>) Σκληρωτίνια (<i>Sclerotinia sp</i>)	100	67-167	60-150	Από την αρχή της άνθισης μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος.	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-15 ημέρες εφόσον απαιτείται
Μελιτζάνα (Θ) (μικρής σημασίας χρήση)	Τεφρά σήψη (<i>Botrytis cinerea</i>) Ωίδιο (<i>Leveillula taurica</i>)	100-150	100	100-150	Έναρξη ψεκασμών με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας. Η μεγαλύτερη δόση θα πρέπει να εφαρμόζεται κάτω από έντονες συνθήκες προσβολής	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται
Καρυδιά (μικρής σημασίας χρήση)	Αλτερνάρια (<i>Alternaria sp.</i>), Φουζάριο(<i>Fusarium sp.</i>), Ανθράκνωση (<i>Gnomonia leptostyla</i> , GNOMLE), Κλαδοσπόριο (<i>Cladosporium sp.</i>)	100	67-167	60-150	Από την αρχή της άνθισης μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος.	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-15 ημέρες εφόσον απαιτείται
Καστανιά (μικρής σημασίας χρήση)	Ανθράκνωση (<i>Mycosphaerella maculiformis</i> , <i>Phyllosticta maculiformis</i> , <i>Cylindrosporium castaneiculum</i>)	100	67-167	60-150	Από την αρχή της άνθισης μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος.	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-15 ημέρες εφόσον απαιτείται

Κουκιά (φρέσκα) Φασόλια χωρίς λοβό (φρέσκα) (Υ)	Βοτρύτης (<i>Botrytis spp.</i>), Σκληρωτίνια (<i>Sclerotinia spp.</i>), Σκωρίαση (<i>Uromyces spp.</i>)	100-150	100-385	40-100	Από την εμφάνιση του 5 ^{ου} φύλλου μέχρι και το τέλος της άνθισης.	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται
Σπανάκι	Ανθράκνωση (<i>Colletotrichum sp.</i>), Περονόσπορος (<i>Peronospora sp.</i>), Κλαδοσπόριο (<i>Cladosporium sp.</i>)	75-100	75-250	40-100	Από την εμφάνιση του 4ου φύλλου, μέχρι το φυτό να αποκτήσει το φυτό να αποκτήσει το τελικό του μέγεθος	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται
Αρωματικά φυτά (Βασιλικός) (Θ)	Σκληρωτίνια (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), (<i>Botrytis cinerea</i>)	150	150-375	40-100	Από την εμφάνιση του 5 ^{ου} φύλλου, μέχρι το 70% της ανάπτυξης των φύλλων του φυτού.	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται
Καλλωπιστικά (Τριαντάφυλλο) (Θ)	Ωίδιο	80-150	150-375	40-100	Από την εμφάνιση του 3 ^{ου} φύλλου, μέχρι το τέλος της άνθισης.	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται

Παρατηρήσεις:* Όταν είναι παρόντα και τα δυο παθογόνα, συνιστάται η μεγαλύτερη δόση.

- 1) Να γίνονται προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών.
- 2) Να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων
- 3) **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Οι μεγάλες δόσεις στο εκατόλιτρο να εφαρμόζονται με τις χαμηλές δόσεις ψεκαστικού υγρού και αντίστροφα.
- 4) Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.
- 5) Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες της καρυδιάς, της φουντουκιάς,

της καστανιάς και της μελιτζάνας θερμοκηπίου από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του επομένως η χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευθύνη του χρήστη

6) Η χρήση σε φασόλια με λοβό (φρέσκα) και μπιζέλια θα χορηγηθεί σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ όταν καθοριστούν αναθεωρημένα MRLs για το pyraclostrobin σύμφωνα με τον Κανονισμό 396/2005. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή.

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο	ΡΗΙ (Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή)
		γρ./ στρέμμα	γρ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού ή λίτρα / στρέμμα			
Ψυχανθή Μπιζέλια (φρέσκα) (Υ)	Ασκοχύτωση (<i>Ascochyta pisi</i>) Ωίδιο (<i>Erysiphe spp.</i>), Περονόσπορος (<i>Peronospora spp.</i>), Σκληρωτίνια (<i>Sclerotinia spp.</i>),	100-150	100-385	40-100	Από την εμφάνιση του 5 ^{ου} φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση.	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται	7
Ψυχανθή Φασόλια με λοβό (φρέσκα) (Υ)	Βοτρυτής (<i>Botrytis spp.</i>), Σκληρωτίνια (<i>Sclerotinia spp.</i>), Σκωρίαση (<i>Uromyces spp.</i>)	100-150	100-385	40-100	Από την εμφάνιση του 5 ^{ου} φύλλου μέχρι και το τέλος της άνθισης.	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται	7

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Στα κουκιά συνιστάται δοκιμή φυτοτοξικότητας.

9 ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:



ΠΡΟΣΟΧΗ

GHS07
GHS09

10 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

11 ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

P102 Μακριά από παιδιά

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν

P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο

P264 Πλύνετε το στόμα σχολαστικά μετά το χειρισμό

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα

«Οι εργάτες να μην εισέρχονται στο πεδίο εφαρμογής πριν στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό στην φυλλική επιφάνεια.»

«Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια εάν εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής λίγο μετά τον ψεκασμό»

P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα

SP1 ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

SRe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων ή 15 μέτρων με ακροφύσια μειωμένης διασποράς (75%) από τα επιφανειακά ύδατα για την αμυγδαλιά, τη φιστικιά, την καστανιά, την καρυδιά και τη φουντουκιά, 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τα ψυχανθή και 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις υπόλοιπες καλλιέργειες.

EUH401 «Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

13

Προστασία των καταναλωτών

13.1 Για τις καλλιέργειες μπιζέλια (φρέσκα), φασόλια με λοβό, σπανάκι , δεν έχουν καθοριστεί προς το παρόν από ΕΕ κοινοτικά Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) για το pyraclostrobin σύμφωνα με την αιτούμενη Ο.Γ.Π.

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργειες	ΡΗΙ(ημέρες)
Αμυγδαλιά	28
Καρυδιά	28
Φουντουκιά	28
Κερασιά	7
Ροδακινιά Νεκταρινιά	7
Βερικοκιά	7
Δαμασκηνιά	7
Καστανιά	28
Φιστικιά	28
Φράουλα (Θ)	3
Καρότο (Υ)	14
Τομάτα (Υ + Θ)	3
Πιπεριά (Υ + Θ)	3
Μελιτζάνα (Θ)	3
-Μαρούλι (Υ)	7
Σπαράγγι (Υ)	Μη εφαρμόσιμο (>120 ημέρες)

-Κρεμμύδι (Υ) -Σκόρδο (Υ)	14
Σπανάκι	14
-Φασόλι (χωρίς λοβό) (φρέσκα) (Υ) -Κουκιά (φρέσκα) (Υ)	7
Αρωματικά φυτά Βασιλικός (Θ)	14
Καλλωπιστικά (Θ)	Μη εφαρμόσιμο

Π. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 60.098 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του **SIGNUM 26.7/6.7 WG** (δ.ο. boscalid & pyraclostrobin) που χορηγήθηκε με τη με αριθ. 95706/13-4-2011 ΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ν. ΣΤΟΥΠΗΣ