

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 22 -11-2016  
Αριθ. πρωτ: 1872/21473

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Άννα Παπαμιχαήλ  
Τηλέφωνο: 210 92 87 237  
e-mail: [apapamichail@minagric.gr](mailto:apapamichail@minagric.gr)

Προς: BASF Ελλάς ΑΒΕΕ  
Παραδείσου 2 & Κηφισίας  
Τ.Κ. 15125, Μαρούσι  
E-mail: [dimitris.theodosiou@basf.com](mailto:dimitris.theodosiou@basf.com)

**ΘΕΜΑ:** Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο)  
**FORUM 15 DC (δ.ο. dimethomorph)**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ**  
**ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο έχει συμπεριληφθεί και η δραστική ουσία dimethomorph.
7. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2015/404 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2015 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών beflubutamid, καπταν, dimethoate, dimethomorph, κ.α.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

8. Τη με αριθ. 9379/119137/02-11-2015 (ΦΕΚ 2367/τΒ'/4-11-2015) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού για Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του πρώην Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9. Την υπ' αρ. 1872/21473/19-02-2016 αίτηση της εταιρείας.
10. Την από 20 Ιουνίου 2015 απόφαση έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος FORUM 15 DC από την Αρμόδια Αρχή της Ισπανίας (Αρ. Αδείας 19.411), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει
11. Την σχετική Αξιολόγηση από την AAA της Ισπανίας η οποία απεστάλη στην υπηρεσία μας με το υπ' αρ. 10574/115105/17-10-2016 διαβιβαστικό έγγραφο.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40, του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **FORUM 15 DC** της εταιρείας Basf Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος****1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

60574

22.11.2016

31.07.2019

**1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

FORUM 15 DC

1.2.β Μορφή:

Εναιωρηματοποιημένο Συμπύκνωμα (DC)

**1.3 Δραστικές ουσίες****Δραστική ουσία**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

dimethomorph

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

96.5 % (β/β) min

Χημική ομάδα

Αμίδια του κινναμικού οξέος

Παρασκευαστής

**BASF Agro B.V.**

Arnhem (NL) Zürich Branch

Im Tiergarten 7, 8055 Zürich, Ελβετία

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

**1 Servatis S.A**

Rodovia Presidente Dutra, km 300.5

27537-000 Resende- Rio de Janeiro, Βραζιλία

**2 Jiangsu Huifeng Agrochemicals Co, Ltd.**

Weier Road, South Area of Ocean Economic

Development Zone

Dafeng , Jiangsu 224145

P.R. , Κίνα

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας:

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε  
Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι,  
ΑΜΕ: BASGR  
Τηλ.: 2106860120  
Fax: 2106860200  
E-mail: [dimitris.theodosiou@basf.com](mailto:dimitris.theodosiou@basf.com)

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Ο κάτοχος της έγκρισης

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

Ο κάτοχος της έγκρισης

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**BASF SE,**  
Carl-Bosch-Strasse 38,  
67056 Ludwigshafen, Γερμανία

ε) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1 BASF Agri-Production S.A.S.**  
Rue Jacquard, Z.I. Lyon Nord  
69727 Genay Cedex - B.P. 73, Γαλλία
- 2 BASF Espanola S.L.**  
Carretera N-340, km 1.156  
43006 Tarragona, Ισπανία

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1 BASF Agri-Production S.A.S.**  
Rue Jacquard, Z.I. Lyon Nord  
69727 Genay Cedex - B.P. 73, Γαλλία
- 2 BASF Espanola S.L.**  
Carretera N-340, km 1.156  
43006 Tarragona, Ισπανία

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: dimethomorph 15% (β/ο),  
Βοηθητικές ουσίες: 85.82 % β/β  
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ .

**2****Συσκευασίες:****2.2 Συσκευασίες:**

| A/A | Είδος  | Μέγεθος  | Υλικό                                   |
|-----|--------|--|---|
| 1.  | Δοχείο | 600 κ.εκ., 700 κ.εκ., 1 λίτρο, 3 λίτρα, 3.5 λίτρα, 5 λίτρα, 10 λίτρα, 25 λίτρα | HDPE – Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας. |

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

## 3 Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως για το αμπέλι και την πορτοκαλιά. Εφαρμογές μέσω του συστήματος άρδευσης για την καλλιέργεια της φράουλας.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το ψεκαστικό βυτίο με νερό μέχρι τα  $\frac{3}{4}$  και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας. Συμπληρώνουμε το βυτίο με το υπόλοιπο νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:** Το προϊόν εφαρμόζεται μόνο του.

## 4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

**Μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση ωομυκήτων στις καλλιέργειες αμπελιού, πορτοκαλιάς και φράουλας.**

**Dimethomorph:** Το dimethomorph (DMM) είναι ένα μυκητοκτόνο με ιδιότητες προστατευτικές, θεραπευτικές και αντισπορογόνες κατά των μυκήτων που ανήκουν στην τάξη των Ωομυκήτων. Ο στόχος του είναι ένα ένζυμο, η συνθάση κυτταρίνης, η οποία εμπλέκεται στην βιοσύνθεση της κυτταρίνης (κύριο συστατικό του τοιχώματος των Ωομυκήτων). Δρα στο σύνολο του κύκλου ανάπτυξης του παθογόνου οργανισμού-στόχου και, παρότι είναι θεραπευτικό, συστήνεται να χρησιμοποιείται προληπτικά. Το dimethomorph είναι μια ένωση που παρουσιάζει μια ακροπέταλη διασυστηματικότητα καθώς και μια διαφυλλική κινητικότητα.

## 5 5.1 Φάσμα δράσης

| Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος   | Δόσεις σκευάσματος |                             |                                  | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής                         | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο |
|-----------------|--|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|--|
|                 |  | κ.εκ./ στρέμμα     | κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού | Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα |   |  |
| Αμπέλι          | <b>Περονόσπορος</b><br>( <i>Plasmopara viticola</i> )    | 150-200            | 150-200                     | 100                              | Κάνετε προληπτικές εφαρμογές καλύψεως του αμπελιού. | 1  |
| Πορτοκαλιά      | <b>Φυτόφθορα</b><br>( <i>Phytophthora citrophthora</i> ) | 250                | 83.33                       | 300                              | Κάνετε προληπτικές εφαρμογές καλύψεως των δέντρων.  | 2 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 14 ημέρες                |

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

|   |  |         |   |     |   |   |
|---|--|---------|---|-----|---|---|
| Φράουλα<br>(Υπαίθρου &<br>Θερμοκηπίου)  | <b>Φυτόφθορα</b><br>( <i>Phytophthora</i><br><i>spp.</i> ) | 100-500 | - | 500 | Κάνετε<br>προληπτικές<br>εφαρμογές<br>μέσω του<br>συστήματος<br>άρδευσης. | 2 με<br>μεσοδιάστημα<br>εφαρμογών 14<br>ημέρες. |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:<br><b>Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο <u>Παράρτημα II</u></b> |  |         |   |     |   |   |

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Διαχείριση Ανθεκτικότητας:

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, συστήνεται η εναλλαγή του, σε προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης, με σκευάσματα που εμπεριέχουν δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης από αυτόν του dimethomorph.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

|  |  |
|--|--|
| - σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας   | -  |
| - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν  | -  |
| - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα. | Δεν θα πρέπει να εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τις επιφάνειες των φύλλων. Επιτρέπεται η επανείσοδος στην ψεκασμένη περιοχή (για εργασίες που απαιτούν την παραμονή στην καλλιέργεια για διάστημα μεγαλύτερο των 2 ωρών) μετά από: 8 ημέρες στο αμπέλι και 10 ημέρες στην πορτοκαλιά. |

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

- 9** Εικονογράμματα κινδύνου



GHS09

GHS05

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- 10** Δηλώσεις επικινδυνότητας

**H302:** Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

**H318:** Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

**H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**11** Δηλώσεις  
προφύλαξης

**P102+405:** Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.  
**P270:** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια.  
 «Φορέστε γάντια και ρούχα προστασίας κατά τη διάρκεια όλων των χειρισμών ανάμιξης/φόρτωσης και εφαρμογής.»  
**Spo2** Πλύνετε όλες τις προστατευτικές ενδυμασίες μετά τη χρήση.  
**SP1:** Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Αποφύγετε τη ρύπανση των υδάτων μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους).  
**Spe3** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, αφήστε μια απέκαστη ζώνη ασφαλείας με φυτική βλάστηση από τα επιφανειακά ύδατα, **10** μέτρων για την καλλιέργεια της πορτοκαλιάς και της φράουλας και **20** μέτρων για την καλλιέργεια του αμπελιού.  
*Περιέχει βενζυλική αλκοόλη*  
**EUH401:** «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

**12** Πρώτες βοήθειες -  
Αντίδοτο

**Περιγραφή μέτρων πρώτων βοηθειών**  
**ΓΕΝΙΚΑ:**  
 Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια, το στόμα και το δέρμα. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ενδύματα. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, ζητήστε ιατρική βοήθεια και δείξτε τον περιέκτη ή την ετικέτα του.  
**P305 + P351 + P338:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  
**Σε περίπτωση κατάποσης:** Πιείτε άφθονο νερό.  
**P330:** Ξεπλύνετε το στόμα.  
**Σε περίπτωση εισπνοής:** Κρατήστε τον ασθενή ήρεμο και μεταφέρετε τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.  
**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική βοήθεια.  
**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.  
**ΓΙΑΤΡΟΙ:** Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.  
**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:** 210-77.93.777

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**13 Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

| Φυτικά προϊόντα | Ημέρες |
|-----------------|--------|
| Αμπέλι          | 28     |
| Πορτοκαλιά      | 14     |
| Φράουλα         | 1      |

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Το σκεύασμα διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια, αν αποθηκευτεί στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

**15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών**

Στο **Παράρτημα III** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών**

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα:

- Πειράματα φυτοτοξικότητας (2 τουλάχιστον) από τη Ελλάδα τα οποία να υποστηρίζουν την ασφαλή χρήση του σκευάσματος στις ποικιλίες της καλλιέργειας του αμπελιού: Σουλτανίνα, Κορινθιακή σταφίδα.

**B****Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.

7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

**Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ**