



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 14-12-2016
Αριθ. πρωτ: 10066/109877

Ταχ. Δ/νση: Α. Συγγρού 150, 176 71-ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7211
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr

Προς: Rotam Agrochemical Europe Limited,
Ηνωμένο Βασίλειο
(δια της εταιρείας ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.,
Ξενίας 1, 11527-Αθήνα)

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) ABAMAX 1,8 EC (δ.ο. abamectin) »

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 40, 41 και 42 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνεται η δραστική ουσία *abamectin*.
4. Τον Κανονισμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-12-08 “για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006”, καθώς και τη με αριθ. 7923/87577/12.7.13 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 546/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τα 8^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
7. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τα 23^{ης} Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τα ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση τα οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τα τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τη με αριθμό 22.981 έγκριση του σκευάσματος στην Ισπανία (εμπορική ονομασία στην Ισπανία: MARISOL), καθώς και τη σχετική έκθεση αξιολόγησης του προϊόντος, η οποία αναρτήθηκε από τα Ισπανικές αρχές στον ιστότοπο CIRCABC.
9. Τη με αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β' 2367/4.11.15) με θέμα την "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
10. Τη από 5-10-16 σχετική αίτηση τα εταιρείας ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (αριθμός πρωτοκόλλου 10066/109877) ως υπεύθυνης επικοινωνίας τα εταιρείας Rotam Agrochemical Europe Limited, Ηνωμένο Βασίλειο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- A.** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **ABAMAX 1,8 EC** (δραστική ουσία *abamectin*) τα εταιρείας Rotam Agrochemical Europe Limited, Ηνωμένο Βασίλειο, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

14.590
14/12/2016
30-04-2020

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
1.2.β Μορφή:

ABAMAX 1,8 EC
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία τα/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	Abamectin
Περιεκτικότητα τα τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	97,5 % (w/w) min
Χημική ομάδα	avermectins
Παρασκευαστής	Rotam Agrochemical Co Ltd Unit 6, 26/F Trend Centre, 29 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, R.P. Κίνα
Εργοστάσιο παρασκευής τα δ.ο.	Rotam Agrochemical Co Ltd με πλήρη διεύθυνση εργοστασίου: HEIBEI VEYONG No. 393 East Heping Road, Shijiazhuang, 050031, Κίνα
Τεχνικές προδιαγραφές τα δραστικής ουσίας:	έχουν υποβληθεί και παραμένουν στα αρχεία τα αρμόδιας αρχής

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος τα άδειας:

Rotam Agrochemical Europe Limited, Hamilton House, Mabledon Place London, WC1H 9BB, Ηνωμένο Βασίλειο

Υπεύθυνος επικοινωνίας

ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Ξενίας 1, 11527-Αθήνα

Τηλ.: 210 7471000, E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

K & N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ

Βι. Πε. Σίνδος, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 570 22, Τηλ: 2310 56 86 56

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Rotam Agrochemical Co Ltd
Unit 6, 26/F Trend Centre, 29 Cheung Lee Street,
Chai Wan, Hong Kong, R.P. Κίνα

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO., LTD**,
No. 88 Longdeng Road, Kunshan 215301, Jiangsu, Κίνα
- Rotam Biotechnology Limited**
566, Longpu St.,Yongkang Dist., Tainan City 710, Taiwan (R.O.C.)

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO., LTD**.
N°88 Longdeng Road, Kunshan, 215301, Jiangsu – Κίνα
- LOODS VABIX**
Driemanssteeweg 560,3084 CB, Rotterdam – Ολλανδία
- Rotam Biotechnology Limited**
566, Longpu St.,Yongkang Dist., Tainan City 710, Taiwan (R.O.C)
- SCAM S.p.A.**
Strada Bellaria 164, 41126 Modena, Ιταλία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: abamectin **1,8% β/ο**
Βοηθητικές ουσίες: **98,2% β/β**
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιαλίδια	10, 20, 25, 40, 50, 75 κ.εκ.	- Fluorinated HDPE (SELLAR)
2.	Φιάλες ή Δοχεία	100, 200, 250, 500 κ.εκ., 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12 και 20 λίτρων	- Fluorinated HDPE (SELLAR)

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής

Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικό υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού με τη μισή ποσότητα νερού και προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα σκευάσματος και όπου συνιστάται λαδιού ανακατεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό ανακατεύοντας.

Καθαρισμός ψεκαστήρα:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος

Εντομοκτόνο – ακαρεοκτόνο στομάχου και επαφής. Προκαλεί παράλυση στα

δράσης:

έντομα με αποτέλεσμα το θάνατό τους από αστία.

5. 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφαρμ. ανά καλλ. περίοδο/ μεσοδιάστ. εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ / στρέμμα (max)	κ.εκ / 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά)	Πανόνυγχος Panonychus citri	120	40	50 - 200	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων ή με την εμφάνιση των ακάρεων στους νεαρούς βλαστούς (όχι κατά την ανθοφορία)	1
	Φυλλοκνίστης Phyllocnistis citrella, Τετράνυχος Tetranychus urticae	120	30 - 40	50 - 200		
Λεμονιά	Παραμορφωτικό άκαρι Aculus pelekassi, A. sheldoni	120	40	50 - 200	Ειδικά για το Φυλλοκνίστη , σε μίγμα με παραφινικό λάδι 0,25%.	
Μηλιά, Αχλαδιά,	Ψύλλα (Psylla pyri, Psylla mali, Cacopsylla pyri Eritrimerus pyri) Τετράνυχος (Tetranychus urticae, Panonychus ulmi, Aculus schlechtendali, Aculus sp, Eryophyes spp)	75	75	100 – 150	Ψεκασμός φυλλώματος πριν την εκκόλαψη των αυγών, σε μίγμα με παραφινικό λάδι 0,25-0,3% ή άλλο προσκολλητικό. Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών (πριν την ανθοφορία ή μετά την ανθοφορία).	Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 38 - 60 ημέρες
Φράουλα (Υπαίθρου/θερμοκηπίου)	Τετράνυχος Tetranychus urticae Λιριόμυζα Liriomyza sp.	120	50 - 100	50 – 120	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων (δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά την ανθοφορία στον αγρό).	Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες
Τομάτα (Υπαίθρου/θερμοκηπίου)	Τετράνυχος Tetranychus urticae, Λιριόμυζα Liriomyza sp.	120	50 – 100	60 – 150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται κατά την ανθοφορία στον αγρό.	Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 20 ημέρες
Μελιτζάνα (Υπαίθρου/θερμοκηπίου)	Τετράνυχος Tetranychus urticae Λιριόμυζα Liriomyza sp.	120	50 - 100	60 – 150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται κατά την ανθοφορία στον αγρό.	Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 20 ημέρες
Πιπεριά (Υπαίθρου/θερμοκηπίου)	Τετράνυχος Tetranychus urticae	120	50 - 100	60 – 150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται κατά την ανθοφορία στον αγρό.	Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 20 ημέρες
Αγγούρι Κολοκύθι (Υπαίθρου/θερμοκηπίου)	Τετράνυχος Tetranychus urticae Λιριόμυζα Liriomyza sp.	120	50 - 100	60 – 150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται κατά την ανθοφορία στον αγρό.	Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 20 ημέρες
Πεπόνι Καρπούζι	Τετράνυχος Tetranychus urticae	120	50 - 100	60 – 150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων	Μέχρι 2 εφαρμογές

(Υπαίθρου/ θερμοκηπίου)	Λιριόμυζα Liriomyza sp.				συμπτωμάτων. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται κατά την ανθοφορία στον αγρό.	ανά 20 ημέρες
Μαρούλι (Υπαίθρου/ θερμοκηπίου)	Τετράνυχος Tetranychus urticae Λιριόμυζα Liriomyza sp.	100	50 - 100	50 – 100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.	Μέχρι 3 εφαρμογές ανά 14 ημέρες
Καλλωπιστικά Υπαίθρου και θερμοκηπίου	Τετράνυχος Tetranychus urticae Λιριόμυζα Liriomyza sp.	120	50 - 100	50 – 250	Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη των προσβολών.	1

Παρατηρήσεις:

1. Η δόση ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού θα πρέπει να συνδυαστεί κατάλληλα με τον όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην ξεπεραστεί η μέγιστη συνιστώμενη δόση ανά στρ.
2. Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα σε καλλιέργειες θερμοκηπίου κατά τους χειμερινούς μήνες (Νοέμβριο-Φεβρουάριο).
Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται να γίνεται εναλλαγή με άλλα εντομοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

-σποράς ή φύτευσης της προσ-
τατευόμενης καλλιέργειας:

--

-σποράς ή φύτευσης των
καλλιεργειών που ακολουθούν:

--

-της πρόσβασης του ανθρώπου
ή των ζώων στην καλλιέργεια που
έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Δεν θα πρέπει να εισέρχεστε στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα πριν να έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό και συγκεκριμένα πριν περάσουν :
13 ημέρες, σε Μαρούλι
3 ημέρες, στα υπόλοιπα λαχανικά
10 ημέρες, σε Καλλωπιστικά υπαίθρου
11 ημέρες, σε Καλλωπιστικά Θερμοκηπίου
6 ημέρες, σε Εσπεριδοειδή
Σε περίπτωση που εισέλθετε στον αγρό αμέσως μετά την εφαρμογή να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής. Στην αχλαδιά να αποφεύγεται ο συνδυασμός ABAMAX με λάδι, 14 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή του μυκητοκτόνου Captan.

9 ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS07 GHS08 GSH09

10 ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

11

ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο νευρικό σύστημα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Περιέχει Cyclohexanol και Butylated hydroxytoluene.

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.

P260: Μην αναπνέετε εκνεφώματα.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. **P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτικά ενδύματα.

«Φοράτε κατάλληλη ολόσωμη φόρμα και γάντια κατά την ανάμιξη /φόρτωση, τον ψεκασμό και το χειρισμό του σκευάσματος».

Sp1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς και τους οργανισμούς μη στόχους να εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας: -Για τις εφαρμογές σε φυλλώδεις καλλιέργειες και κηπευτικά, να αφήνετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων.

-Για τις εφαρμογές στα εσπεριδοειδή να αφήνετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων ή εναλλακτικά αφέκαστη ζώνη 10 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 75% της διασποράς του ψεκαστικού υγρού

-Για τις εφαρμογές στις λοιπές καλλιέργειες, να αφήνετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων ή εναλλακτικά αφέκαστη ζώνη 15 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 90% της διασποράς του ψεκαστικού υγρού.

Spe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας:

-Για τις εφαρμογές σε εσπεριδοειδή και μηλοειδή να αφήνετε μία αφέκαστη ζώνη προστασίας 15 μέτρων

-Για τις εφαρμογές σε κηπευτικά να αφήνετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από ακαλλιέργητες εκτάσεις.

Spe8: Πιθανώς επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία τους ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

Για την προστασία των μελισσών θα πρέπει οι μελισσοκόμοι της περιοχής να ενημερωθούν ώστε τα μελίσσια να απομακρυνθούν από την περιοχή για τουλάχιστον:

-39 ώρες από την ώρα εφαρμογής στις καλλιέργειες μηλοειδών και εσπεριδοειδών

-43 ώρες από την ώρα εφαρμογής στις καλλιέργειες τομάτας Υπαίθρου

-96 ώρες από την ώρα εφαρμογής στις καλλιέργειες θερμοκηπίου, για εξαπόλυση βομβίνων/ μελισσών στα θερμοκήπια.

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

12

Πρώτες
βοήθειες -
Αντίδοτο

Γενικά: Να έχετε διαθέσιμη, την συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στο γιατρό ή στο Κέντρο Δηλητηριάσεων.

P301+P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και ξεπλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό. Αν ο ερεθισμός επιμένει καλέστε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Διατηρήστε τον

ζεστό και ξαπλωμένο. Καλέστε γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία. Να αποφεύγεται η χορήγηση βαρβιτουρικών, βενζοδιαζεπινών και βαλπροϊκού οξέος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77.93.777

13. Προστασία των καταναλωτών:

13.1 Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs): σύμφωνα με τον Κανονισμό 396/2005, όπως ισχύει.

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ΤΑΕ):

Φυτικά προϊόντα	ΤΑΕ (ημέρες)
Εσπεριδοειδή (πορτοκάλια, λεμόνια, μανταρίνια)	10
Μήλα, αχλάδια	28
Φράουλα, Πιπεριά, Αγγούρι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι	3
Τομάτα, Μελιτζάνα	7
Μαρούλι	14

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε ξηρό και δροσερό χώρο, μακριά από θερμότητα.

15 **Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης:** Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 **Κατάλογος προστατευομένων μελετών:** Στο Παράρτημα III καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

B. Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής

ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ