

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 20-12-2016
Αριθ. πρωτ: 12107/132111

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7211
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr

Προς: **ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 73,
Τ.Κ.152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) PHYTOSTAR 5 EC (δραστική ουσία: quizalofop-p-ethyl)»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και συγκεκριμένα το άρθρο 34 αυτού (κλώνος).
2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η δραστική ουσία quizalofop-p-ethyl.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 546/2011 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστ. προϊόντων.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό 1272/2008 του Ε. Κ. και του Συμβουλίου της 16-12-08 “για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006”.
7. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει.
8. Τη με αριθ. 70.123 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) JAGUAR 5 EC (δρ. ουσία: quizalofop-p-ethyl), που χορηγήθηκε με την αριθ. 4118/48377/11.6.15 (ΑΔΑ: ΩΘΔΚ465ΦΘΗ-7ΚΜ) και τροποποιήθηκε με την αριθ. 10897/119595/9.11.16 (ΑΔΑ: 795Μ4653ΠΓ-6Π) Απόφασή μας.

9. Τη με αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β' 2367/4.11.15) με θέμα την "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
10. Τη με αριθ. πρωτ. 12107/132111/25.11.16 σχετική αίτηση που υπέβαλε η εταιρεία ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- A.** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) PHYTOSTAR 5 EC (δραστική ουσία: quizalofop-p-ethyl), ως πανομοιότυπο (κλώνος) του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) JAGUAR 5 EC, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

70.193
20-12-2016
30-11-2019

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

1.2.β Μορφή:

PHYTOSTAR 5 EC
Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Quizalofop-p-ethyl
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	95 % (β/β) min (isomer R)
Χημική ομάδα	Αρυλοξυφαινοξυαλκανοϊκά οξέα
Παρασκευαστής της δ.ο.	ADAMA AGAN LTD Northern Industrial Zone, Haashlag St. 77 102 - Ashdod, Ισραήλ Dr. Geula Dagan, Τηλ.: + 972 / 7 / 32321325 E-mail: Geula.Dagan@adama.com <i>European address</i> ADAMA Deutschland GmbH Edmund Rumpler Str. 6 51149 Köln, Germany Dr. Wolfgang Busch Τηλ. +49 2203 5039-501 E-mail: Wolfgang.Busch@de.adama.com
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): ADAMA AGAN LTD Northern Industrial Zone, Haashlag St. 77 102 - Ashdod, Ισραήλ
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Quizalofop-p-ethyl όπως αυτές κατατέθηκαν με το αριθ. πρωτ. 182901/29-1-2010 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 73, 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
 Τηλ.: 211 120 5570, Fax.: 211 120 5572
 E-mail: technical@alfagro.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

--

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 73, 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
 Τηλ.: 211 120 5570, Fax.: 211 120 5572
 E-mail: technical@alfagro.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

ADAMA AGAN LTD
 Northern Industrial Zone, Haashlag St.
 77 102 - Ashdod, Ισραήλ
 Dr. Geula Dagan
 Τηλ.: + 972 / 7 / 32321325
 E-mail: Geula.Dagan@adama.com

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
ADAMA AGAN LTD
 Northern Industrial Zone, Haashlag St.
 77 102 - Ashdod, Ισραήλ

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
1. ADAMA AGAN LTD
 Northern Industrial Zone, Haashlag St.
 77 102 - Ashdod, Ισραήλ
2. ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ ,
 Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτία
 32 011 –Οινόφυτα ,Βοιωτία
 Τηλ. 22620-30821-3, Φαξ. 22620-30820
 e-mail: nikos.kosmidis@alfagro.gr

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία Quizalofop-p-ethyl 5% (β/ο)
 Βοηθητικές ουσίες 94,4% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	100, 120, 200, 250, 300, 500 κ.εκ. & 1 λίτρο	Πλαστικό multilayer τύπου COEX (HDPE/EVOH) και HDPE
2	Δοχεία	2, 3, 5, 10 και 20 λίτρα.	Πλαστικό multilayer τύπου COEX (HDPE/EVOH) και HDPE

3	<p>Οδηγίες χρήσης: Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.</p> <p>Τρόπος εφαρμογής: Μεταφωτρωτικός ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 30-40 λίτρα νερό το στρέμμα. Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας . Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 45 psi (2-3 atm)</p> <p>Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το ψεκαστικό μέσο μέχρι τα $\frac{3}{4}$ με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.</p> <p>Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιώστε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό</p> <p>Συνδυαστικότητα: -</p> <p>Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.</p>
----------	---

4	<p>Κατηγορία και τρόπος δράσης: Διασυστηματικό, μεταφωτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών αγρωστωδών ζιζανίων. Το Quizalofop-p-ethyl απορροφάται από τα φύλλα των ζιζανίων και μεταφέρεται στις ρίζες, στους στόλωνες και στα ριζώματα.</p> <p>Τα ψεκασμένα ζιζάνια σταματούν να αναπτύσσονται 1 – 2 ημέρες μετά την εφαρμογή. Τα νεότερα φύλλα γίνονται κίτρινα και το χαμηλότερο μέρος των βλαστών νεκρώνεται. Τελικά όλο το ζιζάνιο καταστρέφεται μέσα σε 10 – 20 ημέρες, ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες.</p>
----------	---

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά Καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ		
Εσπεριδοειδή (Λεμονιά, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά /Κλημεντίνες, Tangerine Γκρέπ φρουτ, Φράπες, Περγαμόντο, Νεραντζιά, Κιτριά Κουμκούάτ)	Ετήσια και πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια	α) 100-140 β) 200 - 300	30 - 40	α) Για ετήσια ζιζάνια β) Για πολυετή ζιζάνια	1
Ακρόδρυα	>>	α) 100-140 β) 200 - 300	30 - 40	α) Για ετήσια ζιζάνια β) Για πολυετή ζιζάνια	1
Μηλοειδή Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά	>>	α) 100-140 β) 200 - 300	30 - 40	α) Για ετήσια ζιζάνια β) Για πολυετή ζιζάνια	1
Πυρηνόκαρπα Ροδακινιά, Νεκταρινιά Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά	>>	α) 100-140 β) 200 - 300	30 - 40	α) Για ετήσια ζιζάνια β) Για πολυετή ζιζάνια	1
Αμπέλι (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια)	>>	α) 100-140 β) 200 - 300	30 - 40	α) Για ετήσια ζιζάνια β) Για πολυετή ζιζάνια	1

Καρότο Ρίζα μαϊντανού	>>	α) 100-140 β) 200 - 300	30 - 40	α) Για ετήσια ζιζάνια β) Για πολυετή ζιζάνια	1
Σκόρδο, Κρεμμύδια, Ασκαλώνια	>>	α) 100-140 β) 200 - 300	30 - 40	α) Για ετήσια ζιζάνια β) Για πολυετή ζιζάνια	1
Τομάτα, Μελιτζάνα	>>	α) 100-140 β) 200 - 300	30 - 40	α) Για ετήσια ζιζάνια β) Για πολυετή ζιζάνια	1
Λάχανο Κουνουπίδι Μπρόκολο	>>	α) 100-140 β) 200 - 300	30 - 40	α) Για ετήσια ζιζάνια β) Για πολυετή ζιζάνια	1
Μπιζέλια (Αρακάς) Ρεβίθι, Φασόλια, (φρέσκα)	>>	α) 100-140 β) 200 - 300	30 - 40	α) Για ετήσια ζιζάνια β) Για πολυετή ζιζάνια	1
Όσπρια: Μπιζέλια (Αρακάς) Ρεβίθι, Φασόλια, Φακή, Κουκιά	>>	α) 100-140 β) 200 - 300	30 - 40	α) Για ετήσια ζιζάνια β) Για πολυετή ζιζάνια	1
Ελαιοκράμβη Βαμβάκι Λινάρι	>>	α) 100-140 β) 200 - 300	30 - 40	α) Για ετήσια ζιζάνια β) Για πολυετή ζιζάνια	1
Σόγια Ηλιάνθος	>>	α) 100-140 β) 200	30 - 40	α) Για ετήσια ζιζάνια β) Για πολυετή ζιζάνια	1
Πατάτα	>>	α) 100-140 β) 200 - 300	30 - 40	α) Για ετήσια ζιζάνια β) Για πολυετή ζιζάνια	1
Ζαχαρότευτλα Κτηνοτροφικά τεύτλα	>>	α) 100-140 β) 200 - 250	30 - 40	α) Για ετήσια ζιζάνια β) Για πολυετή ζιζάνια	1
Μηδική Τριφύλλι Βίκος	>>	α) 100-140 β) 200 - 300	30 - 40	α) Για ετήσια ζιζάνια β) Για πολυετή ζιζάνια	1
Καπνός	>>	α) 100-140 β) 200 - 300	30 - 40	α) Για ετήσια ζιζάνια β) Για πολυετή ζιζάνια	1
Καλλωπιστικά φυτά Φυτόρια	>>	α) 100-140 β) 200 - 300	30 - 40	α) Για ετήσια ζιζάνια β) Για πολυετή ζιζάνια	1
Δασικά δένδρα	>>	α) 100-140 β) 200 - 250	30 - 40	α) Για ετήσια ζιζάνια β) Για πολυετή ζιζάνια	1

Παρατηρήσεις:

1. Εφαρμογή μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, στο στάδιο των 2-4 φύλλων μέχρι το αδελφωμα και πριν τα ζιζάνια καλυφθούν από την καλλιέργεια
2. Οι μικρές δόσεις εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια είναι μικρά.

Καταπολεμούμενα ζιζάνια:*Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια:**

Alopecurus myosuroides (Αλεπονουρά), *Avena fatua* & *A. sterilis* (Αγριοβρώμη μεγάλη και μικρή), *Bromus* spp. (Βρώμοι), *Digitaria sanguinalis* (Αιματόχορτο), *Echinochloa crus-galli* & *E. colonum* (Μουχρίτσα & μικρή μουχρίτσα), *Eleusine indica* (Ελευσίνη), *Hordeum* spp. (αγριοκρίθαρο), *Lolium* spp. (Ήρες), *Phalaris* spp. (Φαλαρίδες), *Panicum* spp. (Πάνικο), *Setaria* spp. (Σετάριας), *Sorghum halepense* (Βέλιουρας από σπόρο), *Triticum* spp. (Σιτάρια)

Πολυετή ζιζάνια:

Agropyron/Elymus repens (Αγρόπυρο/Ελυμος), Agrostis spp (Άγρωστης), Cynodon dactylon (Αγριάδα), Paspalum spp. (Πάσπαλο), Poa trivialis (Τραχεία λειβαδοπόα), Poa pratensis (λεία λειβαδοπόα), Sorghum halepense (Βέλιουρας από ριζώματα).

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
-σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
-σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

--

Μην σπέρνετε σιτάρι/κριθάρι/σίκαλη και αραβόσιτο πριν περάσουν 10 εβδομάδες από την εφαρμογή του σκευάσματος.
Μην σπέρνετε βρώμη πριν περάσουν 16 εβδομάδες από την εφαρμογή του σκευάσματος
Μην σπέρνετε μπιζέλι, φασόλι, ελαιοκράμβη πριν περάσουν 4 εβδομάδες από την εφαρμογή του σκευάσματος

-της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά .

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και τον τρόπο εφαρμογής στις συνιστώμενες καλλιέργειες και στις ελληνικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες. Είναι φυτοτοξικό στα σιτηρά και στις μη εύρωστες πλατύφυλλες καλλιέργειες.

9 Σήμανση σκευάσματος:



GHS07 GHS08 GHS09

Κίνδυνος

10 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
H315 Προκαλεί δερματικό ερεθισμό
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο

11 ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

P405 +P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια/εκνεφώματα.
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
 «Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών /προσώπου κατά την ανάμιξη/φόρτωση και γάντια κατά την εφαρμογή»
 «Συνιστάται η εφαρμογή του προϊόντος να γίνεται με τρακτέρ με κλειστή καμπίνα».
 «Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν γάντια, εάν εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής λίγο μετά τον ψεκασμό».
SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.
SPe3 Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας από μη γεωργική γη
όταν χρησιμοποιείτε δόση μέχρι 250 κ.εκ./ στρέμμα, 10 μέτρων με την χρήση συμβατικών ακροφύσιων ή 5 μέτρων με την χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφος κατά 50 %
όταν χρησιμοποιείτε δόση μέχρι 300 κ.εκ./ στρέμμα, 10 μέτρων σε συνδυασμό με την χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφος κατά 50 %
EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

12 Πρώτες
βοήθειες -
Αντίδοτο

P305+ P351+ P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P301 + P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
P331 ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
P304 + P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με άφθονο νερό .
 Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Εσπεριδοειδή	Δ.Ε. (Εφαρμογή πριν την άνθηση της καλλιέργειας)
Ακρόδρυα	Δ.Ε. (Εφαρμογή πριν την άνθηση της καλλιέργειας)

Μηλοειδή	30
Πυρηνόκαρπα Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Βερικοκιά	30
Αμπέλι οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια)	45
Καρότο, Ρίζα μαϊντανού	30
Σκόρδο, Κρεμμύδια, Ασκαλώνια	30
Τομάτα, Μελιτζάνα	30
Μπρόκολο, Λάχανο, Κουνουπίδι	30
Μπιζέλι (Αρακάς), Φασόλια, Ρεβίθι (φρέσκα)	42
Όσπρια: Μπιζέλι (Αρακάς), Φασόλια, Φακή, Κουκιά, Ρεβίθι	30
Σόγια	60
Ελαιοκράμβη	100
Βαμβάκι, Λινάρι	100
Ηλίανθος	75
Πατάτα	30
Ζαχαρότευτλα, Κτηνοτροφικά τεύτλα	60
Μηδική, Τριφύλλι, Βίκος	50
Καπνός	40

- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από ηλιακό φως, το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

- 15.** Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης: Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

Β. Γενικές υποχρεώσεις:

Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.

Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση

Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση

Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.

Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής**

ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ