



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 4 - 4 - 2017
Αριθ.πρωτ: 1697/18949 π.ε.

Ταχ . Δ/νηση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου
Τηλέφωνο: 210 928 7161
e-mail: chpanagoroulou@minagri.c.gr

Προς: Bayer Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
Σωρού 18-20
Τ.Κ.151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

E-mail: ioannis.tsoutsanis@bayer.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 60382 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SERENADE MAX WP ως προς το φάσμα δράσης (χρήσεις ήσσονος σημασίας)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου , όπως τροποποιήθηκε με το SANCO doc.357 /rev.3/ 2008
3. Τον Ν. 4036 (ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012) σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, την ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 (ΦΕΚ Β'/2587) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας»

5. Τη από 1/2/2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής
6. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
7. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 1697/189492/15-2—2016 και 7713/85175/25-7-2016 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. 60382 οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **SERENADE MAX WP** (δ.ο. *Bacillus subtilis*- strain **QST 713**), που χορηγήθηκε με την με. αριθ. πρωτ. 2161/23744/12-9 – 2013 απόφαση μας, ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Συγκεκριμένα τα σημεία 4, 5 και 13.2 διαμορφώνονται ως εξής:

4	Κατηγορία και τρόπος δράσης:	<p>Το SERENADE MAX είναι ένα σκεύασμα με βάση το στέλεχος του <i>Bacillus subtilis</i> QST 713, σε μορφή βρέξιμης σκόνης για την καταπολέμηση του μυκητολογικών προσβολών σε ένα μεγάλο εύρος καλλιεργειών με προληπτικές εφαρμογές.</p> <p>Το στέλεχος του <i>Bacillus subtilis</i> QST 713 παράγει κυρίως λιποπεπτίδια τα οποία ενεργούν στις κυτταρικές μεμβράνες/κυτταρικό τοίχωμα των παθογόνων καταστρέφοντας τα κύτταρά τους. Έτσι παρεμποδίζεται η βλάστηση των σπορίων των μυκήτων, η επιμύκηση του βλαστικού σωλήνα και η διείδυσή τους στον φυτικό ιστό. Επιπλέον παράγει ουσίες με αντιβακτηριακή δράση οι οποίες παρεμποδίζουν το σχηματισμό του κυτταρικού τοιχώματος και την παραγωγή πρωτεϊνών στα βακτήρια.</p>
----------	------------------------------	---

5 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ./στρέμμα	γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Αμπέλι	Βοτρυτής (<i>Botrytis cinerea</i>)	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις και αφού έχει ανθίσει το 80% των ανθέων μέχρι την αρχή της ωρίμανσης των καρπών (όταν οι καρποί αρχίζουν να αποκτούν το τυπικό χρώμα της ποικιλίας τους) Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 14	5
Μηλιά Αχλαδιά (1)	Φουζικλάδιο (<i>Venturia Spp.</i>)	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις, από την πράσινη κορυφή μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν μέγεθος 20 χιλιοστών (mm). Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 7	8
	Βακτηριακό κάψιμο μηλοειδών (<i>Erwinia amylovora</i>)	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής (κατά τη διάρκεια της άνθισης) ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 7	
Φράουλα (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου)	Βοτρυτής (<i>Botrytis cinerea</i>)	250-350	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις, από την έναρξη της άνθισης και μέχρι τη συγκομιδή. Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 7	4

Μαρούλι (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου)	Σκληρωτίνια (<i>Sclerotinia spp.</i>)	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις, από το στάδιο των τεσσάρων πραγματικών φύλλων μέχρι και τον πλήρη σχηματισμό της κεφαλής του μαρουλιού. Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 7	4
Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηινιά, Κερασιά, Νεκταρινιά (2)	Φαϊά σήψη (<i>Monilinia spp.</i>)	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις, από το στάδιο που ο καρπός έχει το μέγεθος καρυδιού μέχρι και τη συγκομιδή Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 7	4
	Βακτηριακό κάψιμο (<i>Xanthomonas arboricola</i>)	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις,, από την πτώση του κάλυκα (τέλος καρπόδεσης) μέχρι που καρποί αρχίζουν να αποκτούν το τελικό τους χρώμα. Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 7	4
Τομάτα (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου)	Βοτρυτής (<i>Botrytis cinerea</i>)	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις, από το στάδιο της καρπόδεσης μέχρι και τη συγκομιδή. Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 7	4
	Βακτηριακή κηλίδωση (<i>Pseudomonas syringae</i>)	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις, από το στάδιο πριν την άνθιση μέχρι και τη συγκομιδή. Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 7	

Πιπεριά, Μελιτζάνα (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου)	<i>Βοτρύτης</i> (<i>Botrytis</i> <i>cinerea</i>)	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις, από το στάδιο της καρπόδεσης μέχρι και τη συγκομιδή. Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 7	4
ΡΟΔΙΑ (μικρής σημασίας χρήση) ⁴	<i>BOTRYTHΣ</i> (<i>Botrytis spp.</i> <i>Botrytis</i> <i>cinerea</i>)	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμογή από την έναρξη της καρπόδεσης μέχρι την πλήρη ωρίμανση των καρπών BBCH: 71-89 Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες.	4
ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ (μικρής σημασίας χρήση) ⁴	<i>BOTRYTHΣ</i> (<i>Botrytis spp.</i>) <i>ΒΑΚΤΗΡΙΟ</i> (<i>Pseudomonas</i> <i>syringae</i> pv. <i>Actinidiae</i> (PSA)	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμογή από την έναρξη της καρπόδεσης μέχρι την πλήρη ωρίμανση των καρπών BBCH: 71-89 Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες.	4
ΑΓΚΙΝΑΡΑ (μικρής σημασίας χρήση) ⁴	<i>BOTRYTHΣ</i> (<i>Botrytis spp.</i>)	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμογή από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων μέχρι την πλήρη ωρίμανση. BBCH: 71-89 Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες.	4
ΚΡΕΜΜΥΔΑΚ Ι ΧΛΩΡΟ (μικρής σημασίας χρήση) ⁴	<i>BOTRYTHΣ</i> (<i>Botrytis spp.</i>)	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμογή από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων μέχρι την πλήρη ωρίμανση. BBCH: 71-89 Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες.	4

ΦΑΣΟΛΙ ΞΕΡΟ (μικρής σημασίας χρήση) ⁴	<i>ΒΑΚΤΗΡΙΟ</i> (<i>Xanthomonas</i> <i>spp.</i> <i>Pseudomonas</i> <i>spp.</i> <i>Pseudomonas</i> <i>syringae</i>)	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμογή από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων μέχρι την πλήρη ωρίμανση. BBCH: 71-89 Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες.	4
ΜΠΑΜΙΑ (μικρής σημασίας χρήση) ⁴	<i>ΒΟΤΡΥΤΗΣ</i> (<i>Botrytis spp.</i>)	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμογή από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων μέχρι την πλήρη ωρίμανση. BBCH: 71-89 Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες.	4
ΜΠΡΟΚΟΛΟ (μικρής σημασίας χρήση) ⁴	<i>ΒΑΚΤΗΡΙΟ</i> (<i>Pseudomonas</i> <i>spp.</i>)	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμογή από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων μέχρι την πλήρη ωρίμανση. BBCH: 71-89 Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες.	4
ΣΤΕΒΙΑ (μικρής σημασίας χρήση) ⁴	<i>ΒΟΤΡΥΤΗΣ</i> (<i>Botrytis spp.</i>)	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμογή από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων μέχρι την πλήρη ωρίμανση. BBCH: 71-89 Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες.	4

<p>Μικρής σημασίας χρήση⁴</p> <p>ΜΥΡΤΙΛΛΟ</p> <p>ΣΜΕΟΥΡΟ</p>	<p>ΒΟΤΡΥΤΗΣ (<i>Botrytis spp.</i> <i>Botrytis cinerea</i>)</p> <p>ΜΟΝΙΛΙΑ (<i>Monilinia vaccinii-corymbosi</i>)</p> <p>ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i>)</p> <p>ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΛΑΙΜΟΥ (<i>Agrobacterium tumefaciens</i>)</p> <p>ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΚΟΣ (<i>Gordonia cassandrae</i>, <i>Fusicoccum putrefaciens</i>)</p>	250-400	---	50-100	<p>Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμογή από την έναρξη της καρπόδεσης μέχρι την πλήρη ωρίμανση των καρπών . Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες.</p>	4
<p>Μικρής σημασίας χρήση⁴</p> <p>ΣΥΚΙΑ</p>	<p>ΒΟΤΡΥΤΗΣ (<i>Botrytis spp.</i>)</p> <p>ΕΝΔΟΣΗΨΗ ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑ (<i>Pseudomonas syringae</i>)</p>	250-400	---	50-100	<p>Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμογή από την πτώση του κάλυκα (τέλος καρπόδεσης) μέχρι και τη συγκομιδή. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες.</p>	4
<p>Μικρής σημασίας χρήση⁴</p> <p>ΑΒΟΚΑΝΤΟ</p>	<p>ΒΟΤΡΥΤΗΣ (<i>Botrytis spp.</i>)</p>	250-400	---	50-100	<p>Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμογή από την έναρξη της καρπόδεσης μέχρι την πλήρη ωρίμανση των καρπών Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες.</p>	4
<p>Μικρής σημασίας χρήση⁴</p> <p>ΚΟΛΟΚΥΘΙ (αποκλειστικά για την ποικ. Melopepo)</p>	<p>ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ (<i>Pseudomonas syringae</i>)</p>	250-400	---	50-100	<p>Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις, από το στάδιο πριν την άνθιση μέχρι και τη συγκομιδή. Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 7</p>	4

Μικρής σημασίας χρήση ⁴ ΣΠΑΝΑΚΙ (Υ & Θ)	ΒΟΤΡΥΤΗΣ (<i>Botrytis</i> spp.)	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμογή από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων μέχρι την πλήρη ανάπτυξη της φυλλικής μάζας. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες.	4
Μικρής σημασίας χρήση ⁴ ΑΝΤΙΔΙ ΣΤΑΜΝΑΓΚΑ ΘΙ (Υ & Θ):	ΒΟΤΡΥΤΗΣ (<i>Botrytis</i> spp.)	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμογή από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων μέχρι την πλήρη ανάπτυξη της φυλλικής μάζας. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες.	4
Μικρής σημασίας χρήση ⁴ ΡΟΚΑ (Υ & Θ)	ΒΟΤΡΥΤΗΣ (<i>Botrytis</i> spp.) ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ (<i>Pseudomonas syringae</i>)	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμογή από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων μέχρι την πλήρη ανάπτυξη της φυλλικής μάζας. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες.	4
Μικρής σημασίας χρήση ⁴ ΠΡΑΣΟ	ΒΟΤΡΥΤΗΣ (<i>Botrytis</i> spp.)	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμογή από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων μέχρι την πλήρη ωρίμανση. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες.	4
Μικρής σημασίας χρήση ⁴ ΟΣΠΡΙΑ (Υ & Θ): ΑΡΑΚΑΣ ΦΑΚΗ ΚΟΥΚΙΑ ΡΕΒΙΘΙ	ΒΟΤΡΥΤΗΣ (<i>Botrytis</i> spp.) ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>ptsi</i> , <i>Pseudomonas pisi</i>)	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμογή από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων μέχρι την πλήρη ωρίμανση. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες.	4

<p>Μικρής σημασίας χρήση⁴</p> <p>Καπνός</p>	<p>ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ (<i>Pseudomonas tabacina</i>, <i>Pseudomonas sp.</i>)</p>	<p>250-400</p>	<p>---</p>	<p>50-100</p>	<p>Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμογή από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων μέχρι την πλήρη ωρίμανση. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες.</p>	<p>4</p>
<p>Μικρής σημασίας χρήση⁴</p> <p>ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ Α.ΥΠΑΙΘΡΟΥ: Ρίγανη, Σέλινο, Βασιλικός, Δυόσμος, Γιασεμί, Γλυκάνισος, Δάφνη, Δενδρολίβανο, Δίκταμο, Θυμάρι, Κάππαρη, Κορίανδρος, Κρόκος, Κύμινο, Λεβάντα, Μάραθος, Μαντζουράνα, Μελισσόχορτο, Μέντα, Μαϊντανός, Άνιθος, Μαστίχα Χίου, Αρώνια, Χαμομήλι, Φασκόμηλο, Ύσσωπος, Σάλβια, Τσάι βουνού, Τριανταφυλλιά (για αρωματοποιία). Β. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ: Ρίγανη, Σέλινο, Βασιλικός, Δυόσμος, Γιασεμί, Γλυκάνισος, Δάφνη, Δενδρολίβανο, Δίκταμο, Θυμάρι, Κάππαρη, Κορίανδρος,</p>	<p>ΒΟΤΡΥΤΗΣ (<i>Botrytis spp.</i>)</p> <p>ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ (<i>Pseudomonas syringae</i>)</p>	<p>250-400</p>	<p>---</p>	<p>50-100</p>	<p>Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμογή από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων μέχρι την πλήρη ανάπτυξη της φυλλικής μάζας/πλήρη ωρίμανση. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες.</p>	<p>4</p>

Κρόκος, Κύμινο, Λεβάντα, Μάραθος, Μαντζουράνα, Μελισσόχορτο, Μέντα, Μαϊντανός, Άνιθος, Αρώνια, Χαμομήλι, Φασκόμηλο, Ύσσωπος, Σάλβια, Τσάι βουνού, Τριανταφυλλιά (για αρωματοποιία).						
--	--	--	--	--	--	--

Παρατηρήσεις:**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

- (1) Συνολικά το μέγιστο των εφαρμογών δεν είναι παραπάνω από οκτώ
- (2) Συνολικά το μέγιστο των εφαρμογών δεν είναι παραπάνω από τέσσερις
- (3) Επειδή το σκεύασμα μπορεί να αφήσει ένα λευκό επίχρισμα πάνω στο φυτό συνιστούμε να μη χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά το μέγιστο προτεινόμενο βλαστικό στάδιο.
- (4) Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις μικρής σημασίας χρήσεις από την εφαρμογή του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο **σχετικό Παράρτημα II**

13**Προστασία των καταναλωτών****13.1 Δεν ορίζονται MRLs για τον *Bacillus subtilis***

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
-----------------	--------

<p>Αμπέλι, Μηλιά, Αχλαδιά, Φράουλα, Μαρούλι, Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα Ροδακινιά, Βερικοκιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά, Νεκταρινιά, Ροδιά, Ακτινιδιά, Αγκινάρα, Κρεμμύδι χλωρό, Φασόλι ξερό, , , Μπάμια, Μπρόκολο, Στέβια</p> <p>ΜΥΡΤΙΛΛΟ, ΣΜΕΟΥΡΟ, ΣΥΚΙΑ, ΑΒΟΚΑΝΤΟ, ΚΟΛΟΚΥΘΙ (ποικ. Melopepo) ΣΠΑΝΑΚΙ (Υ&Θ), ΑΝΤΙΔΙ(Υ&Θ), ΣΤΑΜΝΑΓΚΑΘΙ (Υ&Θ), ΠΡΑΣΟ, ΡΟΚΑ (Υ&Θ), ΑΡΑΚΑΣ, ΦΑΚΗ, ΚΟΥΚΙΑ, ΡΕΒΙΘΙ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ (Υ&Θ): (ΡΙΓΑΝΗ, ΣΕΛΙΝΟ, ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ, ΔΥΟΣΜΟΣ, ΓΙΑΣΕΜΙ, ΓΛΥΚΑΝΙΣΟΣ, ΔΑΦΝΗ, ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ, ΔΙΚΤΑΜΟ, ΘΥΜΑΡΙ, ΚΑΠΠΑΡΗ, ΚΟΡΙΑΝΔΡΟΣ, ΚΡΟΚΟΣ, ΚΥΜΙΝΟ, ΛΕΒΑΝΤΑ, ΜΑΡΑΘΟΣ, ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΑ, ΜΕΛΙΣΣΟΧΟΡΤΟ, ΜΕΝΤΑ, ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ, ΆΝΙΘΟΣ, ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ (Υ μόνο), ΑΡΩΝΙΑ, ΧΑΜΟΜΗΛΙ, ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ, ΎΣΣΩΠΟΣ, ΣΑΛΒΙΑ, ΤΣΑΙ ΒΟΥΝΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΓΙΑ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ).)</p>	3
--	---

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό . πρωτ. **2161/23744/12-9 – 2013** Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60382 οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) **SERENADE MAX WP** όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Η Προϊστάμενη της Γενικής Διεύθυνσης

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ