



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 20/07/2018  
Αριθ. πρωτ: 7769/103090**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Νίκος Παπανικολάου  
Τηλέφωνο: 210 928 7211  
e-mail: [npapanikolaou@minagric.gr](mailto:npapanikolaou@minagric.gr)**

**Προς: LAINCO S.A.  
Pol. Ind. Can Jordi, Avda. Bizet, 8-12  
08191 Rubi, Barcelona, Ισπανία  
(δια του υπευθύνου επικοινωνίας  
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.  
«Agribiz»  
Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα)  
e-mail: [a.toutoutzidakis@agribiz.gr](mailto:a.toutoutzidakis@agribiz.gr)**

**ΘΕΜΑ: « Διεύρυνση άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) PLANT OLEO (paraffin oil 79% β/ο)σε χρήσεις ήσσονος σημασίας»**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
4. Τη με αριθ. 10088/115732/26.9.13 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β' /2587) "διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας".
5. Την με αριθ. 14.605/28-3-2017 άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος LAINCOIL, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Την με αριθ. 1606/16641/14.02.17 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Υπ. Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
7. Την με αριθ. πρωτ. 2925/41342/16-03-2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Α. Τροποποιούμε τη με αριθ. 14667 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) PLANT OLEO, η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 2925/41342/25-06-2018 Απόφασή μας, ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε χρήσεις ήσσονος σημασίας). Συγκεκριμένα, το σημείο 5 διαμορφώνεται ως ακολούθως:

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/ στρ.)	κ.εκ. / στρ		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Γκρέϊπ φρούτ CIDPA, Λεμονιά CIDLI, μανταρινιά (Κλημεντίνες) CIDRE, Πορτοκαλιά CIDSI, Φράπα CIDGR.	Κόκκινη ψώρα ( <i>Aonidiella aurantii</i> - AONDAU) Άσπρη ψώρα ( <i>Aspidiotus nerii</i> - ASPDNE) Παρλατόρια/Μαύρη ψώρα ( <i>Parlatoria pergandei</i> - PARLPE) Μυτιλόμορφη ψώρα ( <i>Lepidosaphes beckii</i> - LEPSBE) Κίτρινος τετράνυχος ( <i>Tetranychus urticae</i> - TETRUR) κ.α. ακάρεα ( <i>Eutetranychus banksi</i> - EUTEBA, <i>Panonychus citri</i> - METTCI)	1000 - 1500	100-200	1000 - 3000	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών.	1
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Μηλιά MABSD, Αχλαδιά PYUCO, Κυδωνιά CYDOB, Μουσμουλιά MSPGE, Αχλαδόμηλα PYUPC	Ψώρα Σαν-Ζοζέ ( <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> - QUADPE) <b>Βαμβακάδα*</b> ( <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> - PSEAPE) <b>Ψευδόκοκκος*</b> ( <i>Planococcus citri</i> PSECCI) <b>Ψώρες*</b> ( <i>Eriococcus lagerstroemiae</i> ERIOILA) <b>Ματόψειρα*</b> ( <i>Eriosoma lanigerum</i> ERISLA)	750 - 1000	50-150	375- 1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	1
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Βερικοκιά PRNAR Κερασιά PRNAV Ροδακινιά PRNPS	Ψώρα Σαν-Ζοζέ ( <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> - QUADPE) Βαμβακάδα ( <i>Pseudalacaspis pentagona</i> -	750 - 1000	50-150	375- 1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	1

Νεκταρινιά PRNPS Δαμασκηνιά PRNDO	PSEAPE) Κίτρινος τετράνυχος* ( <i>Tetranychus urticae</i> - TETRUR)					
Αμυγδαλιά* PRNDU	Ψώρα Σαν Ζοζέ ( <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> - QUADPE) Βαμβακάδα ή Διάσπις ( <i>Pseudalacaspis pentagona</i> - PSEAPE) ( <i>Planococcus /Pseudococcus citri</i> -PSECCI) ( <i>Diaspis</i> -DIASSP) Λεκάνιο ( <i>Saissetia oleae</i> - SAISOL) Παρλατόρια ( <i>Parlatoria oleae</i> - PARLOL) Μυτιλόμορφη ψώρα ( <i>Lepidosaphes ulmi</i> -LEPSUL) Κηροπλάστης ( <i>Ceroplastes rusci</i> -CERPRU) Ψώρες ( <i>Sphaerolecanium prunastri</i> - LECAPN) ( <i>Eulecanium persicae</i> -LECAPE) Κίτρινος τετράνυχος ( <i>Tetranychus urticae</i> -TETRUR) Κόκκινος Τετράνυχος ( <i>Metatetranychus ulmi</i> -METTUL) Παραμορφωτικ ό ακάρι ( <i>Aceria sheldoni</i> - ACEISH) Ακάρεα ( <i>Aculus pelekassi</i> - ACULPE) ( <i>Bryobia rubrioculus</i> - BRYORU)	750 - 1000	50 – 150	375 – 1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	1
Φουντουκιά* CYLAV	Βαμβακάδα ( <i>Diaspis</i> -DIASSP) Κίτρινος Τετράνυχος ( <i>Tetranychus urticae</i> -TETRUR)	750 – 1000	50 – 150	375 – 1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την	1

	Κόκκινος Τετράνυχος ( <i>Metatetranychus ulmi</i> - METTUL) Ακάρεα ( <i>Bryobia praetiosa</i> -BRYOPR)				άνθηση	
Φιστικιά* ΡΙΑΒΕ	Κίτρινος Τετράνυχος ( <i>Tetranychus urticae</i> -TETRUR) Λεκάνιο ( <i>Saissetia oleae</i> -SAISOL) Ψώρες ( <i>Parthenolecanium pruinatum</i> -LECAPI) ( <i>Parthenolecanium corni</i> -LECACO) ( <i>Coccus hesperidum</i> -COCCHE)	750 – 1000	50 – 150	375 – 1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	1
Ελιά* ΟΛΒΕΥ	Παράτορρα ( <i>Parlatoria oleae</i> -PARLOL) Λεκάνιο ( <i>Saissetia oleae</i> -SAISOL) Πολλίνια ( <i>Pollinia pollinaria</i> -POLNPO) Άσπρη ψώρα ( <i>Aspidiotus nerii</i> -ASPDNE) Μυτιλόμορφη ψώρα ( <i>Lepidosaphes ulmi</i> -LEPSUL) Ψώρες ( <i>Leucaspis riccae</i> -LEUARI) ( <i>Chrysomphalus dictyospermi</i> -CHRYDI) Ακάρεα ( <i>Eriophyes vitis</i> -ERPHVI) ( <i>Tegolophus hassani</i> -TEGLSP) ( <i>Oxycenus maxwelli</i> -OXYNMA) ( <i>Eotetranychus carpini</i> -EOTECA)	750 – 1000	50 – 150	375 – 1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	1
Αμπέλι* VITVI	Ερίνωση ( <i>Eriophyes vitis</i> -ERPHVI) Κίτρινος	750 – 1000	50 – 150	375 – 1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της	1

	Τετράνυχος ( <i>Tetranychus urticae</i> -TETRUR)				προβολής, πριν την άνθηση	
Ροδιά* PUNGR	Τετράνυχος ( <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR) Ακάρεια ( <i>Eriophyes grannati</i> ACEIGA)	750 – 1000	50 – 150	375 – 1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	1
Συκιά* FIUCA	Κίτρινος Τετράνυχος ( <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR) Κόκκινος Τετράνυχος ( <i>Metatetranychus ulmi</i> METTUL) Κηροπλάστης ( <i>Ceroplastes rusci</i> CERPRU) Ψευδόκοκκος ( <i>Planococcus ficus</i> PLANFI)	750 – 1000	50 – 150	375 – 1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	1
Ακτινιδιά* ATIDE	Κίτρινος Τετράνυχος ( <i>Tetranychus urticae</i> - TETRUR) Κόκκινος Τετράνυχος ( <i>Metatetranychus ulmi</i> -METTUL) Ψώρα Σαν Ζοζέ ( <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> - QUADPE) Βαμβακάδα ή Διάσπης ( <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> - PSEAPE)	750 – 1000	50 – 150	375 – 1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	1

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :**

1. Το εύρος των δόσεων και ο όγκος ψεκαστικού υγρού είναι ανάλογα με το ύψος των φυτών και την ένταση της προσβολής.
2. Κατά τη χρήση του PLANT OLEO τα δένδρα πρέπει να είναι επαρκώς ποτισμένα. Ποτίζουμε μία εβδομάδα πριν από τον ψεκασμό.
3. Αποφύγετε τον ψεκασμό όταν τα φυτά είναι μισομαραμένα, σε περιόδους έντονης ξηρασίας ή όταν υπάρχει παγετός.
4. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32°C, γιατί μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα φυτοτοξικότητας.
5. Να μη γίνεται εφαρμογή του PLANT OLEO επί 40 ημέρες, μετά την εφαρμογή θείου ή θειασβεστίου ή σκευασμάτων με δ.ο. captan ή folpet.

\* Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Φιστικιά, Ελιά, Αμπέλι, Ροδιά, Συκιά και Ακτινιδιά καθώς και για την αποτελεσματικότητα κατά των εχθρών ή σσονος σημασίας από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

**Β.** Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 2925/41342/25-06-2018 Απόφασή μας.

**Ο Προϊστάμενος  
της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ**