



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 20 - 07 - 2018
Αριθ. πρωτ: 7771/103096

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Π. Θεοδωρήs
Νίκος Παπανικολάου
Τηλέφωνο: 210 928 72 25
210 928 72 30
e-mail: ptheodoris@minagric.gr
npapanikolaou@minagric.gr

Προς: Industrial Química Key, S.A.

Δια της: Τουτουζιδάκης Αντόνιος και
ΣΙΑ Ε.Ε. - Agribiz

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αριθμό 14636 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **INSECTOIL KEY** (δ.ο. Paraffin oil, CAS 8042-47-5) ως προς το 'φάσμα δράσης' για χρήσεις ήσσονος σημασίας"

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
3. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 (ΦΕΚ Β'/2587) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας»
5. Τη με αριθ. 12140/117318/08.02.2018 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 14636 άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν INSECTOIL KEY.
6. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".

7. Τη υπ' αριθμ. 12140 / 117318 / 07.11.2017 αίτηση της **Industrial Química Key, S.A.** διά της 'Τουτουζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. - Agribiz'

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α Τροποποιούμε την με αριθμό έγκρισης 14636 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος INSECTOIL KEY (δ.ο. Paraffin oil, CAS 8042-47-5) η οποία χορηγήθηκε με την με αρ. πρωτ. 12140/117318/08.02.2018 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς: 'το φάσμα δράσης'

Συγκεκριμένα:

A. Το σημεία 5 διαμορφώνεται ως εξής

5 Φάσμα δράσης		Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/ στρ.)	κ.εκ. / στρ		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Γκρεϊπ φρούτ CIDPA, Λεμονιά CIDLI, μανταρινιά (Κλημεντίνες) CIDRE, Πορτοκαλιά CIDSI, Φράπα CIDGR.	Κόκκινη ψώρα (<i>Aonidiella aurantii</i> - AONDAU) Άσπρη ψώρα (<i>Aspidiotus nerii</i> - ASPDNE) Παρλατόρια/Μαύρη ψώρα (<i>Parlatoria pergandei</i> - PARLPE) Μυτιλόμορφη ψώρα (<i>Lepidosaphes beckii</i> - LEPSBE) Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> - TETRUR) Ακάρια <i>Eutetranychus banksi</i> - EUTEBA, <i>Panonychus citri</i> - METTCI	1000 - 1500	100-200	1000 - 3000	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών.	1
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Μηλιά MABSD, Αχλαδιά PYUCO, Κυδωνιά CYDOB, Μουσμουλιά MSPGE, Αχλαδόμηλα PYUPC	Ψώρα Σαν-Ζοζέ (<i>Quadraspidotus perniciosus</i> - QUADPE) Βαμβακάδα* (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i> - PSEAPE) Ψευδόκοκκος* (<i>Planococcus citri</i> PSECCI) Ψώρες* (<i>Eriococcus</i>	750 - 1000	50-150	375- 1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	1

	<i>lagerstroemiae</i> ERIOLA) Ματόψειρα* (<i>Eriosoma</i> <i>lanigerum</i> ERISLA)					
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Βερικοκιά PRNAR Κερασιά PRNAV Ροδακινιά PRNPS Νεκταρινιά PRNPS Δαμασκηνιά PRNDO	Ψώρα Σαν-Ζοζέ (<i>Quadraspidiotus</i> <i>perniciosus</i> - QUADPE) Βαμβακάδα (<i>Pseudalacaspis</i> <i>pentagona</i> - PSEAPE). Κίτρινος τετράνυχος* (<i>Tetranychus</i> <i>urticae</i> - TETRUR)	750 - 1000	50-150	375- 1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	1
Αμυγδαλιά* PRNDU	Ψώρα Σαν Ζοζέ (<i>Quadraspidiotus</i> <i>perniciosus</i> - QUADPE) Βαμβακάδα ή Διάσπης (<i>Pseudalacaspis</i> <i>pentagona</i> - PSEAPE) (<i>Planococcus</i> <i>/Pseudococcus</i> <i>citri</i> -PSECCI) (<i>Diaspis</i> -DIASSP) Λεκάνιο (<i>Saissetia oleae</i> - SAISOL) Παρλατόρια (<i>Parlatoria oleae</i> - PARLOL) Μυτιλόμορφη ψώρα (<i>Lepidosaphes</i> <i>ulmi</i> -LEPSUL) Κηροπλάστης (<i>Ceroplastes</i> <i>rusci</i> -CERPRU) Ψώρες (<i>Sphaerolecanium</i> <i>prunastri</i> - LECAPN) (<i>Eulecanium</i> <i>persicae</i> -LECAPE) Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus</i> <i>urticae</i> -TETRUR) Κόκκινος Τετράνυχος (<i>Metatetranychus</i>	750 - 1000	50 – 150	375 – 1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	1

	<i>ulmi</i> -METTUL) Παραμορφωτικό ακάρι (<i>Aceria sheldoni</i> -ACEISH) Ακάρεα (<i>Aculus pelekassi</i> -ACULPE) (<i>Bryobia rubrioculus</i> -BRYORU)					
Φουντουκιά* CYLAV	Βαμβακάδα (<i>Diaspis</i> -DIASSP) Κίτρινος Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> -TETRUR) Κόκκινος Τετράνυχος (<i>Metatetranychus ulmi</i> -METTUL) Ακάρεα (<i>Bryobia praetiosa</i> -BRYOPR)	750 – 1000	50 – 150	375 – 1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	1
Φιστικιά* PIAVE	Κίτρινος Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> -TETRUR) Λεκάνιο (<i>Saissetia oleae</i> -SAISOL) Ψώρες (<i>Parthenolecanium pruinatum</i> -LECAPI) (<i>Parthenolecanium corni</i> -LECACO) (<i>Coccus hesperidum</i> -COCCH)	750 – 1000	50 – 150	375 – 1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	1
Ελιά* OLVEU	Παρλατόρια (<i>Parlatoria oleae</i> -PARLOL) Λεκάνιο (<i>Saissetia oleae</i> -SAISOL) Πολλίνια (<i>Pollinia pollinaria</i> -POLNPO) Άσπρη ψώρα (<i>Aspidiotus nerii</i> -ASPDNE) Μυτιλόμορφη ψώρα (<i>Lepidosaphes</i>	750 – 1000	50 – 150	375 – 1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	1

	<ulmi-lepsul) </ulmi-lepsul) Ψώρες <i>(Leucaspis riccae-</i> LEUARI) <i>(Chrysomphalus</i> <i>dictyospermi-</i> CHRYDI) Ακάρεα <i>(Eriophyes vitis-</i> ERPHVI) <i>(Tegolophus</i> <i>hassani-TEGLSP)</i> <i>(Oxycenus</i> <i>maxwelli-</i> OXYNMA) <i>(Eotetranychus</i> <i>carpini-EOTECA)</i>					
Αμπέλι* VITVI	Ερίνωση <i>(Eriophyes vitis-</i> ERPHVI) Κίτρινος Τετράνυχος <i>(Tetranychus</i> <i>urticae-TETRUR)</i>	750 – 1000	50 – 150	375 – 1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	1
Ροδιά* PUNGR	Τετράνυχος <i>(Tetranychus</i> <i>urticae</i> TETRUR) Ακάρεα <i>(Eriophyes</i> <i>grannati</i> ACEIGA)	750 – 1000	50 – 150	375 – 1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	1
Συκιά* FIUCA	Κίτρινος Τετράνυχος <i>(Tetranychus</i> <i>urticae</i> TETRUR) Κόκκινος Τετράνυχος <i>(Metatetranychus</i> <i>ulmi METTUL)</i> Κηροπλάστης <i>(Ceroplastes rusci</i> CERPRU) Ψευδόκοκκος <i>(Planococcus ficus</i> PLANFI)	750 – 1000	50 – 150	375 – 1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	1
Ακτινιδιά* ATIDE	Κίτρινος Τετράνυχος <i>(Tetranychus</i> <i>urticae-TETRUR)</i> Κόκκινος Τετράνυχος <i>(Metatetranychus</i> <i>ulmi-METTUL)</i> Ψώρα Σαν Ζοζέ <i>(Quadraspidotus</i>	750 – 1000	50 – 150	375 – 1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	1

	<i>perniciosus-</i> QUADPE) Βαμβακάδα ή Διάσπις <i>(Pseudaulacaspis</i> <i>pentagona-</i> PSEAPE)					
--	---	--	--	--	--	--

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

1. Το εύρος των δόσεων και ο όγκος ψεκαστικού υγρού είναι ανάλογα με το ύψος των φυτών και την ένταση της προσβολής.
 2. Κατά τη χρήση του INSECTOIL KEY τα δένδρα πρέπει να είναι επαρκώς ποτισμένα. Ποτίζουμε μία εβδομάδα πριν από τον ψεκασμό.
 3. Αποφύγετε τον ψεκασμό όταν τα φυτά είναι μισομαραμένα, σε περιόδους έντονης ξηρασίας ή όταν υπάρχει παγετός.
 4. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32⁰C, γιατί μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα φυτοτοξικότητας.
 5. Να μη γίνεται εφαρμογή του INSECTOIL KEY επί 40 ημέρες, μετά την εφαρμογή θείου ή θειασβεστίου ή σκευασμάτων με δ.ο. captan ή folpet.
- * «Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Φιστικιά, Ελιά, Αμπέλι, Ροδιά, Συκιά και Ακτινιδιά καθώς και για την αποτελεσματικότητα κατά των εχθρών ήσσονος σημασίας από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 12140/117318/08.02.2018 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14636 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν INSECTOIL KEY (δ.ο. Paraffin oil, CAS 8042-47-5).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ