



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΠ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 14-06-2017
Αριθ. πρωτ: 5520/54676**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΚΑΛΛΙΘΕΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Π. Θεοδωρής
Τηλέφωνο: 210 928 7225
e-mail: ptheodoris@minagric.gr**

Προς: LAINCO S.A.

**Δια: ‘Τουτουζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.’
Agribiz**

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 14605 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος LAINCOIL (δ.ο. Paraffin oil, CAS 8042-47-5) ως προς το ‘φάσμα δράσης’ για χρήσεις ήσσονος σημασίας»

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
3. Το Νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 (ΦΕΚ Β΄/2587) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας»
5. Τη με αριθ. 1756/17293/28.03.2017 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 14605 άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν LAINCOIL.
6. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β΄/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και

Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".

7. Τη υπ' αριθμ. 5520/54676/19-05-2017 αίτηση της εταιρείας LAINCO S.A. δια της 'Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.'.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- A. Τροποποιούμε την με αριθμό έγκρισης **14605** οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **LAINCOIL (δ.ο. Paraffin oil, CAS 8042-47-5)** η οποία χορηγήθηκε με την με αρ. πρωτ. 1756/17293/28.03.2017 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς: *'το φάσμα δράσης'*

Συγκεκριμένα:

A. Το σημεία 5 διαμορφώνεται ως εξής

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/ στρ.)	κ.εκ. / στρ		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙ ΔΗ Γκρεΐπ φρούτ CIDPA, Λεμονιά CIDLI, μανταρινιά (Κλημεντίνες) CIDRE, Πορτοκαλιά CIDSΙ, Φράπα CIDGR.	Κόκκινη ψώρα (<i>Aonidiella aurantii</i> - AONDAU) Άσπρη ψώρα (<i>Aspidiotus nerii</i> - ASPDNE) Παρλατόρια/Μαύρη ψώρα (<i>Parlatoria pergandei</i> - PARLPE) Μυτιλόμορφη ψώρα (<i>Lepidosaphes beckii</i> - LEPSBE) Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> - TETRUR) Ακάρεα (<i>Eutetranychus banksi</i> - EUTEBA, <i>Panonychus citri</i> - METTCI)	1000 - 1500	100-200	1000 - 3000	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών.	1

ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Μηλιά MABSD, Αχλαδιά ΡΥΥCO, Κυδωνιά CYDOB, Μουσμουλιά MSPGE, Αχλαδόμηλα ΡΥΥPC	Ψώρα Σαν-Ζοζέ <i>(Quadraspidiotus perniciosus-QUADPE)</i> Βαμβακάδα* <i>(Pseudaulacaspis pentagona-PSEAPE)</i> Ψευδόκοκκος* <i>(Planococcus citri PSECCI)</i> Ψώρες* <i>(Eriococcus lagerstroemiae ERIOLA)</i> Ματόψειρα* <i>(Eriosoma lanigerum ERISLA)</i>	750 - 1000	50-150	375-1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση	1
ΠΥΡΗΝΟΚΑ ΡΠΑ Βερικοκιά PRNAR Κερασιά PRNAV Ροδακινιά PRNPS Νεκταρινιά PRNPS Δαμασκηλιά PRNDO	Ψώρα Σαν-Ζοζέ <i>(Quadraspidiotus perniciosus-QUADPE)</i> Βαμβακάδα <i>(Pseudalacaspis pentagona-PSEAPE).</i> Κίτρινος τετράνυχος* <i>(Tetranychus urticae- TETRUR)</i>	750 - 1000	50-150	375-1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση	1
Αμυγδαλιά* PRNDU	Ψώρα Σαν Ζοζέ <i>(Quadraspidiotus perniciosus-QUADPE)</i> Βαμβακάδα ή Διάσπης <i>(Pseudalacaspis pentagona-PSEAPE)</i> <i>(Planococcus /Pseudococcus citri-PSECCI)</i> (Diaspis-DIASSP) Λεκάνιο	750 - 1000	50 – 150	375 – 1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση	1

	<p>(<i>Saissetia oleae</i>-SAISOL) Παρλατόρια (<i>Parlatoria oleae</i>-PARLOL) Μυτιλόμορφη ψώρα (<i>Lepidosaphes ulmi</i>-LEPSUL) Κηροπλάστης (<i>Ceroplastes rusci</i>-CERPRU) Ψώρες (<i>Sphaerolecanium prunastri</i>-LECAPN) (<i>Eulecanium persicae</i>-LECAPE) Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>-TETRUR) Κόκκινος Τετράνυχος (<i>Metatetranychus ulmi</i>-METTUL) Παραμορφωτικό ακάρι (<i>Aceria sheldoni</i>-ACEISH) Ακάρεια (<i>Aculus pelekassi</i>-ACULPE) (<i>Bryobia rubrioculus</i>-BRYORU)</p>					
Φουντούκια * CYLAV	Βαμβακάδα (<i>Diaspis</i> -DIASSP) Κίτρινος Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> -TETRUR) Κόκκινος Τετράνυχος (<i>Metatetranychus ulmi</i> -METTUL)	750 – 1000	50 – 150	375 – 1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση	1

	Ακάρεα (<i>Bryobia praetiosa</i> - BRYOPR)					
Φιστικιά* ΡΙΑΒΕ	Κίτρινος Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> -TETRUR) Λεκάνιο (<i>Saissetia oleae</i> - SAISOL) Ψώρες (<i>Parthenolecanium pruinatum</i> - LECAPI) (<i>Parthenolecanium corni</i> - LECACO) (<i>Coccus hesperidum</i> - COCCHE)	750 – 1000	50 – 150	375 – 1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση	1
Ελιά* ΟΛΒΕΥ	Παρλατόρια (<i>Parlatoria oleae</i> - PARLOL) Λεκάνιο (<i>Saissetia oleae</i> - SAISOL) Πολλίνια (<i>Pollinia pollini</i> - POLNPO) Άσπρη ψώρα (<i>Aspidiotus nerii</i> - ASPDNE) Μυτιλόμορφη ψώρα (<i>Lepidosaphes ulmi</i> -LEPSUL) Ψώρες (<i>Leucaspis riccae</i> - LEUARI) (<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> - CHRYDI) Ακάρεα (<i>Eriophyes vitis</i> - ERPHVI)	750 – 1000	50 – 150	375 – 1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση	1

	(<i>Tegolophus hassani</i> -TEGLSP) (<i>Oxycenus maxwelli</i> -OXYNMA) (<i>Eotetranychus carpini</i> -EOTECA)					
Αμπέλι* VITVI	Ψευδόκοκκος ή Βαμβακάδα (<i>Pseudococcus sp.</i> -PSECSP) (<i>Planococcus sp.</i> -PLANSP) Ερίωση (<i>Eriophyes vitis</i> -ERPHVI) Κίτρινος Τετράνουχος (<i>Tetranychus urticae</i> -TETRUR)	750 – 1000	50 – 150	375 – 1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση	1
Ροδιά* PUNGR	Τετράνουχος (<i>Tetranychus urticae</i> TETRUR) Ακάρεα (<i>Eriophyes grannati</i> ACEIGA)	750 – 1000	50 – 150	375 – 1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση	1
Συκιά* FIUCA	Κίτρινος Τετράνουχος (<i>Tetranychus urticae</i> TETRUR) Κόκκινος Τετράνουχος (<i>Metatetranychus ulmi</i> METTUL) Κηροπλάστης (<i>Ceroplastes rusci</i> CERPRU) Ψευδόκοκκος (<i>Planococcus ficus</i> PLANFI)	750 – 1000	50 – 150	375 – 1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση	1
Ακτινιδιά* ATIDE	Κίτρινος Τετράνουχος (<i>Tetranychus</i>	750 – 1000	50 – 150	375 – 1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση	1

	<i>urticae</i> -TETRUR) Κόκκινος Τετράνυχος <i>(Metatetranychus ulmi</i> -METTUL) Ψώρα Σαν Ζοζέ <i>(Quadraspidiotus perniciosus</i> - QUADPE) Βαμβακάδα ή Διάσπιν <i>(Pseudaulacaspis pentagona</i> - PSEAPE)				της προσβολής, πριν την άνθηση	
--	--	--	--	--	---	--

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

1. Το εύρος των δόσεων και ο όγκος ψεκαστικού υγρού είναι ανάλογα με το ύψος των φυτών και την ένταση της προσβολής.
2. Κατά τη χρήση του LANCOIL τα δένδρα πρέπει να είναι επαρκώς ποτισμένα. Ποτίζουμε μία εβδομάδα πριν από τον ψεκασμό.
3. Αποφύγετε τον ψεκασμό όταν τα φυτά είναι μισομαραμένα, σε περιόδους έντονης ξηρασίας ή όταν υπάρχει παγετός.
4. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32°C, γιατί μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα φυτοτοξικότητας.
5. Να μη γίνεται εφαρμογή του LAINCOIL επί 40 ημέρες, μετά την εφαρμογή θείου ή θειασβεστίου ή σκευασμάτων με δ.ο. captan ή folpet.

* «Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Φιστικιά, Ελιά, Αμπέλι, Ροδιά, Συκιά και Ακτινιδιά καθώς και για την αποτελεσματικότητα κατά των εχθρών ή σσονος σημασίας από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. **1756/17293/28.03.2017** απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό **14605** οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **LAINCOIL (δ.ο. Paraffin oil, CAS 8042-47-5)**.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ