

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 13 - 07 - 2017
Αριθ. πρωτ: 2846/29027

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου
Ν. Αβραμίδης
Τηλέφωνο: 210 92 87 161
e-mail: chpanagoroulou@minagric.gr

Προς: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
Λ. Μεσογείων 449
153 43 Αγία Παρασκευή
E-mail: dimitris.theodosiou@basf.gr

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) DURAX 455 CS (δ.ο. Pendimethalin 45,5% β/ο).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

6. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 950/2016 της 15ης Ιουνίου 2016 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης της δραστικής ουσίας **pendimethalin**.
7. Την υπ' αριθ. 180275/4-1-2010 Απόφαση μας με την οποία χορηγήθηκε η με αρ. 7930 οριστική έγκριση στο προϊόν **STOMP AQUA 455 CS**, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
9. Την με αρ. πρωτ. 2846/29027/14-03-2017 αίτηση της εταιρείας **BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **DURAX 455 CS** της εταιρείας **BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.** με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντοςΑριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

70223
13-07-2017
31-07-2019

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
- 1.2.β Μορφή:

DURAX 455 CS
Εναιώρημα μικροκαψυλίων (CS)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

1.3 Δραστική ουσία

Δραστική ουσία	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Pendimethalin
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	90% (β/β) min
Χημική ομάδα	δινιτροανιλίνες
Παρασκευαστής	BASF Agro B.V., Arnhem (NL) - Zuerich Branch Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, Ελβετία
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): A) BASF Corporation. Hannibal Plant 3150 Highway JJ Hannibal (Palmyra), MO 63461, Η.Π.Α. B) Finchimica S.p.A., Via Lazio 13, 20025 Manerbio (BS), Ιταλία.
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Pendimethalin όπως προσδιορίζονται στο Τμήμα J της αίτησης με αρ. πρωτ. 127450/3.10.2005 για το σκεύασμα STOMP AQUA 455 CS και παραμένει στα αρχεία της αρμόδιας αρχής (ΣΕΑ).

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι.

Τηλ.: 210-6860100

Fax: 210-6860200

E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι.

Τηλ.: 210-6860100

Fax: 210-6860200

E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι.

Τηλ.: 210-6860100

Fax: 210-6860200

E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

BASF Agro B.V.,
Arnhem (NL) - Zuerich Branch Im Tiergarten 7,
8055 Zurich,
Ελβετία

δ) Εργοστάσιο(α) παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων (πλήρης διεύθυνση):

1. BASF Agri- production SAS

Rue Jacquard
Z.I. Lyon Nord
69727 Genay Cedex
B.P. 73, Γαλλία

2. BASF Corporation,

Agricultural Products Division
3150 Highway JJ
Palmyra, MO 63461
Hannibal, MO63401,
Η.Π.Α.

3. BASF Agri-Production S.A.S.

Route du Vieux Chemin de Loon
Site Industriel Leurette
59820 Gravelines
Γαλλία

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων (πλήρης διεύθυνση):

1. BASF Agri- production SAS

Rue jacquard
Z.I. Lyon Nord
69727 Genay Cedex
B.P. 73, Γαλλία

2. BASF Corporation,

Agricultural Products Division
3150 Highway JJ
Palmyra, MO 63461
Hannibal, MO63401,
Η.Π.Α.

3. BASF Agri-Production S.A.S.

Route du Vieux Chemin de Loon
Site Industriel Leurette
59820 Gravelines
Γαλλία

4. K+N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΒΙ.ΠΕ.Θ., Σίνδος – Θεσ/νίκη

5. Schirm GmbH Standort Schönebeck

Geschwister-Scholl-Strasse 127
39218 Schoenebeck (Elbe)
Γερμανία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Pendimethalin: 45.5 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 57 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στο Τμήμα J της αίτησης με αρ. πρωτ. 2935/29835/15.03.2017 για το σκεύασμα STOMP AQUA 455 CS. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της αρμόδιας αρχής (ΣΕΑ).

2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλες	100, 300, 350, 500, 600, 700, 800 κ. εκ., 1, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 9, 10, 18, 20 λίτρα	HDPE

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Εφαρμόζεται ανάλογα με την καλλιέργεια, στο λήθαργο, προσπαρτικά με ενσωμάτωση, με ενσωμάτωση πριν τη μεταφύτευση/φύτευση, προφυτρωτικά στην επιφάνεια του εδάφους ή νωρίς μεταφυτρωτικά.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού. Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Συνδυαστικότητα: ---**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατυφύλλων και αγρωστωδών ζιζανίων. Στο βιοχημικό επίπεδο επηρεάζει τη λειτουργία της μίτωσης με παρεμπόδιση του σχηματισμού των μικροσωληνίσκων της μιτωτικής ατράκτου.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

5 5.1 Φάσμα δράσης

Καλλιέργεια	Στόχοι	Κ. εκ. Σκ./στρ.	Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ.	Χρόνος και Τρόπος Εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών /καλλιεργητική περίοδο
Εσπεριδοειδή Πορτοκαλιά (CICSI), Λεμονιά (CIDLI), Μανταρινιά (CIDRE), Γκρέιπ-φρουτ (CIDPA), Φράπα (CIDGR)	Ετήσια Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα ζιζάνια *	250-300	20-60	Κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρωτικά των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης την άνοιξη ή το φθινόπωρο χωρίς να βρέχονται τα πράσινα μέρη των δένδρων.	1
Μηλοειδή: Μηλιά (MABSD), Αχλαδιά (PYUCO)	Ετήσια Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα ζιζάνια *	250-300	20-60	Κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρωτικά των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης το χειμώνα (πριν την έναρξη της βλάστησης).	1
Πυρηνόκαρπα: Ροδακινιά (PRNPS), Νεκταρινιά (PRNPN), Βερικοκιά (PRNAR)	Ετήσια Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα ζιζάνια *	250-300	20-60	Κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρωτικά των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης το χειμώνα (πριν την έναρξη της βλάστησης).	1

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αμπέλι (VITVI)	Ετήσια Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα ζιζάνια *	250-300	20-60	Κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρωτικά των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης το χειμώνα (πριν την έναρξη της βλάστησης).	1
Φράουλα (FRAAN)	Ετήσια Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα ζιζάνια *	250-300	20-60	α) πριν την εγκατάσταση υπαίθριας καλλιέργειας με ενσωμάτωση ή β) κατά το λήθαργο σε εγκατεστημένη φυτεία.	1
Καρότο (DAUCS)	Ετήσια Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα ζιζάνια *	200-250	20-60	Προφυτρωτικά της Καλλιέργειας	1
Κρεμμύδι (ALLCE)	Ετήσια Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα ζιζάνια *	250-300	20-60	Νωρίς μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας (στο στάδιο του μαστιγίου)	1
Σκόρδο (ALLSA)	Ετήσια Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα ζιζάνια *	250-300	20-60	Νωρίς μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας (στο στάδιο του μαστιγίου)	1
Τομάτα (LYPES)	Ετήσια Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα ζιζάνια *	250-300	20-60	Πριν τη μεταφύτευση με ενσωμάτωση.	1
Λάχανο (BRSOX), Μπρόκολο (BRSOΚ), Κουνουπίδι (BRSOB)	Ετήσια Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα ζιζάνια *	250-300	20-60	Πριν τη μεταφύτευση με ενσωμάτωση.	1

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ψυχανθή: Μπιζέλι (PIBSX)	Ετήσια Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα ζιζάνια *	250-300	20-60	Προφυτρωτικά της Καλλιέργειας.	1
Όσπρια: Μπιζέλι (PIBSX), Κουκιά (VICFX)	Ετήσια Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα ζιζάνια *	200-250	20-60	Προσπαρτικά με ενσωμάτωση ή προφυτρωτικά της καλλιέργειας	1
Μαρούλι (LACSA),	Ετήσια Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα ζιζάνια *	250-300	20-60	Πριν τη μεταφύτευση με ενσωμάτωση.	1
Αγκινάρα (CYUCA)	Ετήσια Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα ζιζάνια *	200-250	20-60	Πριν τη μεταφύτευση με ενσωμάτωση ή σε εγκατεστημένη φυτεία κατά την περίοδο του λήθαργου, πριν τη νέα ανάπτυξη, σε γυμνό έδαφος πριν την εμφάνιση ζιζανίων.	1
Βαμβάκι (GOSHI)	Ετήσια Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα ζιζάνια *	360-430	20-60	Προσπαρτικά με ενσωμάτωση ή προφυτρωτικά της καλλιέργειας	1
Ηλίανθος (HELAN), Σόγια (GLXMA),	Ετήσια Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα ζιζάνια *	250-300	20-60	Προφυτρωτικά της καλλιέργειας	1
Πατάτα (SOLTU)	Ετήσια Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα ζιζάνια *	250-300	20-60	Προφυτρωτικά της καλλιέργειας	1

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Καπνός (ΝΙΟΤΑ)	Ετήσια Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα ζιζάνια *	250-300	20-60	Πριν τη μεταφύτευση με ενσωμάτωση.	1
Σιτάρι (TRZAX), Κριθάρι (HORVX), Σίκαλη (SECCE), Τριτικάλε (TTLSS)	Ετήσια Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα ζιζάνια *	250-300	20-60	Προφυτρωτικά της Καλλιέργειας.	1
Αραβόσιτος (ZEAMX)	Ετήσια Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα ζιζάνια *	250-300	20-60	Προφυτρωτικά της Καλλιέργειας	1
Καλλωπιστικά: - φυτώρια - δέντρα	Ετήσια Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα ζιζάνια *	200-300	20-60	Κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρωτικά των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης μετά τη μεταφύτευση, σε καλά εγκατεστημένες φυτείες.	1

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

*** Ετήσια Αγρωστώδη Ζιζάνια:****Ευαίσθητα ζιζάνια:**

Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*- ECHCG), Πράσινη Σετάρια (*Setaria viridis*- SETVI), Σπονδυλωτή Σετάρια (*Setaria verticillata*- SETVE), Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis*- DIGSA).

Μετρίως ευαίσθητα:

Αγριοβρώμη (*Avena sterilis*- AVEST).

Ετήσια Πλατύφυλλα ζιζάνια:**Ευαίσθητα ζιζάνια:**

Πλαγιαστό Βλήτο (*Amaranthus blitoides*-AMABL), Τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus*-AMARE), Αναγαλλίς (*Anagallis arvensis*- ANGAR), Λουβουδιά (*Chenopodium album*-CHEAL), Κοινό ηλιοτρόπιο (*Heliotropium europaeum*-HEOEU), Πολυκόμπι (*Polygonum aviculare*-POLAV), Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria*-POLPE), Αναρριχώμενο πολύγωνο (*Bilderdykia convolvulus*-POLCO), Γλυστρίδα (*Portulaca oleracea*-POROL), Παπαρούνα (*Papaver rhoeas*-PAPRH), Κουφάγκαθο (*Silybum marianum*-SLYMA), Στελλάρια (*Stellaria media*-STEME), Άγριο σινάπι (*Sinapis arvensis*- SINAR), Στύφνος (*Solanum nigrum*-SOLNI), Ζωχός (*Sonchus oleraceus*- SONOL), Τριβόλι (*Tribulus terrestris*-TRBTE), Βερόνικα (*Veronica hederifolia*-VERHE, *V. Persica*-VERPE), Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris*-SENVU).

Μετρίως ευαίσθητα:

Αγριοπαμπακιά (*Abutilon theophrasti* - ABUTH), Καπνόχορτο (*Fumaria officinalis*- FUMOF), Κολλητσιίδα (*Galium* spp.- GALSS), Ρανούγκουλος (*Ranunculus* spp.- RANSS), Ραπανίδα (*Raphanus raphanistrum*- RAPRA).

Παρατηρήσεις:

- Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων που προέρχονται από αμπελώνες στους οποίους έχει γίνει χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος DURAX 455 CS.

1) Η δράση του DURAX 455 CS στις μετασπαρτικές εφαρμογές επηρεάζεται σημαντικά από την εδαφική υγρασία. Συνιστάται στις περιπτώσεις αυτές πότισμα 24-48 ώρες μετά την εφαρμογή για την ενσωμάτωση – «ενεργοποίηση» του ζιζανιοκτόνου στο έδαφος.

2) Στο βαμβάκι για την καλύτερη αντιμετώπιση του στύφνου (*Solanum nigrum*), μετά την προσπαρτική εφαρμογή με ενσωμάτωση, συνιστάται να ακολουθήσει εφαρμογή μετασπαρτικά, προφυτρωτικά της καλλιέργειας με ένα ζιζανιοκτόνο που περιέχει την δραστική ουσία fluometuron στη δόση 250 κ. εκ/στρέμμα (σκεύασμα 50% περιεκτικότητας σε δρών συστατικό) ή 125 γρ δραστική ουσία/στρέμμα.

3) Οι μικρότερες δόσεις αναφέρονται σε ελαφριά εδάφη - χαμηλής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία και μικρούς πληθυσμούς ζιζανίων, ενώ οι μεγαλύτερες σε μέσης σύστασης ή βαριά εδάφη – μέσης έως υψηλής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία ή/και μεγαλύτερους πληθυσμούς ζιζανίων. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιηθούν οι μέγιστες δόσεις, και ανάλογα με τη σύσταση/γονιμότητα του εδάφους, είναι δυνατό να παρατηρηθεί παροδική καθυστέρηση ανάπτυξης των φυτών, ειδικά σε συνθήκες υψηλής εδαφικής υγρασίας ή/και χαμηλών θερμοκρασιών.

4) Το DURAX 455 CS καταπολεμά τα ζιζάνια που φυτρώνουν ή βρίσκονται σε πολύ νεαρό στάδιο (φύτρωμα-κοτυληδόνας). Εφόσον υπάρχουν φυτρωμένα ζιζάνια θα πρέπει προηγουμένως να καταστραφούν με σκάλισμα ή βοτάνισμα ή με κατάλληλο μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο.

5) Παραδείγματα καλλωπιστικών φυτών που μπορεί να εφαρμοστεί: Τούγια (*Thuja occidentalis*), είδη *Prunus* sp., Κουπρεσοκύπαρις (*Cypressocyparis leylandii*), Βιβούρνο (*Viburnum* sp.), Κράταιγος (*Crataegus* sp.), Ήμερο πουρνάρι (*Ilex* sp.), Πασχαλιά (*Syringa vulgaris*), Μανόλια (*Magnolia*

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

grandiflora), Δρυς (*Quercus* sp.), Φοίνικας (*Phoenix* sp.), Πεύκο (*Pinus* sp.), Λεύκα (*Populus alba*), Πλάτανος (*Platanus occidentalis*), Ιτιά κλαίουσα (*Salix babylonica*), Καρυδιά (*Juglans nigra*), Ροδόδεντρο (*Rhododendron* sp.), Πυξός (*Buxus* sp.), Καμέλια (*Camelia japonica*), Γαρδένια (*Gardenia jasminoides*), Κυδωνίαστρο (*Cotoneaster* sp.), Κυπαρίσσι (*Cupressus sempervirens*), Ευώνυμο (*Euonymus japonicus*), Πυράκανθος (*Pyracantha coccinea*), Φορσύθια (*Forsythia intermedia*), Ιβίσκος (*Hibiscus syriacus*), Άρκευθος (*Juniperus* sp.), Λεβάντα (*Lavandula angustifolia*), Αγγελική (*Pittosporum tobira*), Μυρτιά (*Myrtus communis*), Πικροδάφνη (*Nerium oleander*), Χαμαίροπας (*Chamaerops* sp.), Φωτίνια (*Photinia* sp.), Λιγούστρο (*Ligustrum* sp.), Δάφνη Απόλλωνος (*Laurus nobilis*), Γιούκα (*Yucca* sp.), Κισσός (*Hedera helix*), Πελαργόνιο (*Pelargonium* sp.), Γιασεμί (*Jasminum* sp.), Μυόπορο (*Myoporum parviflorum*), Σπαράγγι (*Asparagus officinalis*), Φρέζια (*Freesia* sp.), Λίλιουμ (*Lilium* sp.), Παιώνια (*Paeonia* sp.), Γλυτσίνα (*Wisteria* sp.), *Ammophila* sp.

6) Το DURAX 455 CS είναι ασφαλές κατά την εφαρμογή του γύρω και κάτω από πολλά είδη καλλωπιστικών (φυτά, θάμνοι, δέντρα). Ωστόσο δεν έχει διερευνηθεί η εκλεκτικότητα του σε όλες τις ποικιλίες και τα υβρίδια. Ανεπιθύμητες επιπτώσεις, όπως η φυτοτοξικότητα, μπορεί να προκύψει εξαιτίας διαφόρων περιβαλλοντικών συνθηκών, συνθηκών ανάπτυξης ή από τον τρόπο εφαρμογής του ζιζανιοκτόνου. Επομένως, συστήνεται, πριν τη γενικευμένη χρήση του, η δοκιμή σε ένα μικρό αριθμό φυτών και η εξέτασή τους 1-2 μήνες μετά για πιθανή φυτοτοξικότητα.

7) Μην κάνετε καθολικούς ψεκασμούς σε φυτώρια ή σε φυτά προς μεταφύτευση. Μην εφαρμόζετε το DURAX 455 CS σε καλλωπιστικά φυτά που έχουν εμβολιαστεί ή είναι σε έντονη βλαστητική ανάπτυξη ή κατά την ανθοφορία.

Μην εφαρμόζετε το DURAX 455 CS σε φυτά κατά την έναρξη της ανθοφορίας ή την πρώτη βλαστητική ανάπτυξη. Μην επιτρέψετε τα σταγονίδια του ψεκαστικού υγρού να πέσουν πάνω στο φύλλωμα, τους οφθαλμούς ή τα άνθη. Φροντίστε ώστε το έδαφος να μην έχει σκασίματα ή ρωγμές που ενδεχόμενα θα επιτρέψουν την επαφή του DURAX 455 CS με το ριζικό σύστημα των καλλωπιστικών φυτών.

Όταν το ριζικό σύστημα έχει εγκατασταθεί καλά, κάνετε την εφαρμογή του DURAX 455 CS πριν τον εμβολιασμό ή την άνθιση των φυτών.


Σε περίπτωση που κάποια είδη καλλωπιστικών παρουσιάζουν φυτοτοξικότητα, μην τα φυτέψετε σε έδαφος στο οποίο έχει εφαρμοστεί DURAX 455 CS κατά την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο. Για φυτά που μεταφυτεύονται γυμνόριζα, μην εφαρμόζετε το DURAX 455 CS πριν περάσουν 2-4 εβδομάδες από τη μεταφύτευση στην οριστική τους θέση.

8) Μην εφαρμόζετε το DURAX 455 CS σε θερμοκήπια ή άλλες κλειστές κατασκευές.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

--

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

<p>7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:</p> <ul style="list-style-type: none"> - σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα 	<p>1) Σόγια, βαμβάκι, μπιζέλι, σκόρδο, ηλίανθος και μεταφυτευόμενες καλλιέργειες μπορούν να σπαρούν/φυτευτούν οποτεδήποτε μετά την εφαρμογή του DURAX 455 CS αφού προηγηθεί βαθιά άροση (15-20 εκ).</p> <p>2) Πατάτα μπορεί να φυτευτεί 3 μήνες μετά την εφαρμογή του DURAX 455 CS αφού προηγηθεί βαθιά άροση (15-20 εκ).</p>
<p>8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.</p>	<p>Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.</p>
<p>9 Εικονογράμματα κινδύνου:</p>	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; flex-grow: 1;"> <p>ΠΡΟΣΟΧΗ</p> </div> </div>
<p>10 Δηλώσεις επικινδυνότητας</p>	<p>H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</p>

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

11Δηλώσεις
προφύλαξης**Περιέχει pendimethalin. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.****P102:** Μακριά από παιδιά.**P270:** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.**P405:** Φυλάσσεται κλειδωμένο.**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια.**P391:** Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.**SPe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα.**SPe3:** Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από την μη γεωργική γη.**EUH401:** «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»**12**Πρώτες βοήθειες -
Αντίδοτο**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:****Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή.**Σε περίπτωση εισπνοής:** Απομακρύνετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Κρατήστε τον παθόντα ζεστό και σε ηρεμία. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.**Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και κατόπιν πιείτε άφθονο νερό, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Μην προκαλέσετε εμετό γιατί υπάρχει κίνδυνος εισρόφησης εκτός εάν υπάρχει συμβουλή γιατρού. Ποτέ μην προκαλείτε εμετό ή χορηγείτε τίποτα από στόματος αν ο ασθενής είναι αναίσθητος ή έχει σπασμούς.**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Χορηγήστε κορτικοστεροειδή δια εισπνοής για να αποφευχθεί πνευμονικό οίδημα.**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777**

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

13 Προστασία των καταναλωτών

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Όλες οι καλλιέργειες	Δεν ορίζεται λόγω πολύ ενωρίς χρόνου εφαρμογής.

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τρία (3) χρόνια τουλάχιστον, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο [Παράρτημα ΙΙΙ](#) του προϊόντος αναφοράς STOMP AQUA 455 CS καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

B**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ**