

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 29.03.2017
Αριθ. πρωτ: 11360/125032

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Δ. Πιταροκίλη
Τηλέφωνο: 210 92 87 254
e-mail: dpitarokili@minagric.gr

Προς: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
Παραδείσου 2 & Κηφισίας,
151 25 Μαρούσι

ΘΕΜΑ: “Τροποποίηση της με αριθ. 60587 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **INSIGNIA 20 WG** (pyraclostrobin 20% β/β) ως προς το φάσμα δράσης (χρήσεις ήσσονος σημασίας), τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις”.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 51 και 45 αυτού.
2. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 452/2016 της Επιτροπής της 29 Μαρτίου 2016, με τον οποίο ορίστηκαν νέα μέγιστα όρια υπολειμμάτων (MRLs) για τη δραστική ουσία pyraclostrobin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
3. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 (ΦΕΚ Β'/2587) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
5. ρΤο με αρ. πρωτ. ΕΜΠ 1839/20.12.2016 έγγραφο του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου με το συνημμένο σ' αυτό Υπηρεσιακό Σημείωμα Αξιολόγησης στοιχείων υπολειμμάτων.
6. Την αξιολόγηση της Ιταλίας καθώς και την άδεια διάθεσης στην αγορά του όμοιου σκευάσματος CABRIO WG στην Ιταλία (αριθμ. έγκρισης: 16038/16.08.2016).
7. Την από 08.03.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥπαΑΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

8. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14.02.2017 (ΦΕΚ 629/Β'/01.03.2017) Απόφαση με θέμα " Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ".
9. Τις από 11.08.2015 και 09.11.2016 αιτήσεις της εταιρείας BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε..

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. **60587** οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **INSIGNIA 20 WG (pyraclostrobin 20% β/β)** που χορηγήθηκε με την αριθ. 38/504/03.01.2017 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως προς το φάσμα δράσης (χρήσεις ήσσονος σημασίας), τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις.

Συγκεκριμένα τα σημεία 5, 11 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

| | |
|----------|-------------------------|
| 5 | 5.1 Φάσμα δράσης |
|----------|-------------------------|

| Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος | Δόσεις σκευάσματος | | | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο |
|---|--|--------------------|----------------------------|-----------------------------|--|--|
| | | Γραμ./στρ. | Γραμ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού | Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα/στρ. | | |
| Ελιά (επιτραπέζια) | Κυκλοκόνιο (<i>Spilocaea oleagina</i>), Γλοιοσπόριο (<i>Colletotrichum spp.</i>) | 50 | 33,33-50 | 100-150 | Σε ανοιξιάτικες εφαρμογές, κάνετε 1-2 εφαρμογές, μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το 10% του τελικού τους μεγέθους. Σε φθινοπωρινές εφαρμογές: κάνετε 1 εφαρμογή μετά τη συγκομιδή. | 3 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 21 ημέρες |
| Πορτοκαλιά | Αλτερνάρια (<i>Alternaria spp.</i>) | 112,5 | 37,5-75 | 150-300 | 4 εφαρμογές, από την αρχή της έντονης βλάστησης μέχρι και την αρχή της ωρίμανσης των καρπών. | 4 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 14 ημέρες |
| Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά) (παθογόνο) | Κλαδοσπορίωση (<i>Cladosporium carophilum</i>) | 25 | 16.5-25 | 100-150 | 2 εφαρμογές, από την έναρξη ανάπτυξης των καρπών έως την αρχή της ωρίμανσης των καρπών | 2 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 14 ημέρες |

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

| | | | | | | |
|--|--|----|-------|---------|---|---------------------------------------|
| ήσσονος σημασίας) | | | | | | |
| Λωτός (ήσσονος σημασίας) | Μυκοσφαιρέλα (<i>Mycosphaerella nawae</i>) | 50 | 25-50 | 100-200 | 2 εφαρμογές, από την εμφάνιση των φύλλων έως το τέλος της άνθησης | 2 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 15 ημέρες |
| Παρατηρήσεις: 1) ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μεγάλη δόση στο εκατόλιτρο να εφαρμόζεται με το χαμηλό όγκο ψεκαστικού υγρού και αντίστροφα. Πρέπει πάντα να τηρείτε και να μην υπερβαίνετε τη μέγιστη δόση ανά στρέμμα. 2) «Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες Ροδακινιάς, Νεκταρινιάς, Βερικοκιάς, Κερασιάς, Δαμασκηνιάς και Λωτού από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις σε παθογόνα μικρής σημασίας, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος». | | | | | | |

| Οι ακόλουθες χρήσεις θα χορηγηθούν μετά τον καθορισμό κατάλληλων κοινοτικών Ανωτάτων Ορίων Υπολειμμάτων σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ | | | | | | |
|---|---|--------------------|----------------------------|-----------------------------|---|--|
| Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος | Δόσεις σκευάσματος | | | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο |
| | | Γραμ./στρ. | Γραμ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού | Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα/στρ. | | |
| Ελιά (ελαιοποιήσιμη) | Κυκλοκόνιο (<i>Spilocaea oleagina</i>), Γλοιοσπόριο (<i>Colletotrichum</i> spp.) | 50 | 33,33-50 | 100-150 | Σε ανοιξιάτικες εφαρμογές, κάνετε 1-2 εφαρμογές μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το 10% του τελικού τους μεγέθους. Σε φθινοπωρινές εφαρμογές (στις ελαιοποιήσιμες ποικιλίες) κάνετε 1 εφαρμογή μέχρι την ωρίμανση των καρπών | 3 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 21 ημέρες Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Ελιά (ελαιοποιήσιμη): 28 ημέρες |
| Εσπεριδοειδή (Μανταρινιά) | Αλτερνάρια (<i>Alternaria</i> spp.) | 112,5 | 37,5-75 | 150-300 | Κάνετε 4 εφαρμογές, από την αρχή της έντονης βλάστησης μέχρι και την αρχή της ωρίμανσης των καρπών. | 4 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 14 ημέρες Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Μανταρινιά: 7 ημέρες |

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

11

Δηλώσεις
προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P261a: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια.

P403+P233: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης να διατηρείται ερμητικά κλειστός.

Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την συντήρηση του ψεκαστικού μηχανήματος. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

SP1: Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. [Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.]

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για την καλλιέργεια της ελιάς και του λωτού και 15 μέτρων για την καλλιέργεια της πορτοκαλιάς και των πυρηνοκάρπων.

ΕΥΗ 401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

13

Προστασία των καταναλωτών

13.1 Για τις καλλιέργειες έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή της ΕΕ κοινοτικά Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) με την αιτούμενη Ο.Γ.Π. (Ορθή Γεωργική Πρακτική). Έχουν καθοριστεί οριστικά Ευρωπαϊκά MRLs στο Παράρτημα II του Κανονισμού 396/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

| Φυτικά προϊόντα | Ημέρες |
|---|--------|
| Ελιά (επιτραπέζια) | 28 |
| Πορτοκαλιά | 7 |
| Λωτός | 100 |
| Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Κερασιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά | 14 |

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

- II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. 38/504/03.01.2017 Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό **60587** οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **INSIGNIA 20 WG** (pyraclostrobin 20% β/β).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ,

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ