

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 02 - 10 - 2017  
Αριθ. πρωτ: 6601/64442

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Άννα Παπαμιχαήλ  
Τηλέφωνο: 210 92 87 237  
e-mail: [apapamichail@minagric.gr](mailto:apapamichail@minagric.gr)

Προς: ISK Biosciences Europe SA  
Δια μέσου της  
Τουτουζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ  
Ε.Ε. «Agribiz»  
Ξενίας 1,  
11527 – Αθήνα  
E-mail: [a.toutoutzidakis@agribiz.gr](mailto:a.toutoutzidakis@agribiz.gr)

**ΘΕΜΑ:** Τροποποίηση της με αριθ. 70.161 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) **ΚΑΤΑΝΑ** (δ.ο. flazasulfuron) ως προς την ημερομηνία λήξης, τις συσκευασίες, τις οδηγίες χρήσης και το φάσμα δράσης του σκευάσματος.

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ**  
**ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο έχει συμπεριληφθεί και η δραστική ουσία flazasulfuron.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

7. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 823/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με την παρέκκλιση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τις ημερομηνίες λήξης της έγκρισης της δραστικής ουσίας flazasulfuron.
8. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
9. Την υπ' αρ. πρωτ. 10697/122535 π.ε./27-5-2016 Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την χορήγηση οριστικής της με αριθμό 70.161 άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) ΚΑΤΑΝΑ.
10. Τις υπ' αρ. 788/9209/22-01-2016, 12417/135482/02-12-2016 και 6601/64442/14-06-2017 αιτήσεις της εταιρείας, δια μέσω του υπεύθυνου επικοινωνίας.
11. Τις υπ' αρ. 11237/123435/4-11-2016 και 828/9387/26-01-2017 αξιολογήσεις του Μ.Φ.Ι. σχετικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. 70.161 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **(ζιζανιοκτόνο) ΚΑΤΑΝΑ** (δ.ο. **flazasulfuron**), που χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. **10697/122535 π.ε./27-5-2016** Απόφασή μας (ΑΔΑ: ΩΤΡΣΒ-ΘΜΔ), ως προς **την ημερομηνία λήξης, τις συσκευασίες, τις οδηγίες χρήσεις και το φάσμα δράσης του σκευάσματος.**

Συγκεκριμένα, τα σημεία **1.1.β, 2, 3 και 5** διαμορφώνονται ως εξής:

**1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος****1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

|                   |
|-------------------|
| <b>70.161</b>     |
| <b>27.05.2016</b> |
| <b>31.01.2019</b> |

**2 Συσκευασίες**

| A/A | Είδος                      | Μέγεθος   | Υλικό                           |
|-----|----------------------------|---|---------------------------------|
| 1.  | Φιάλη ή Δοχείο             | <b>6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 240, 250, 300, 400, 500, 600, 800</b> γραμ. ,<br>1 κιλού, <b>(1,2) κιλών, (1,6) κιλών, (1,8) κιλών, 2 κιλών, (2,4) κιλών, 3 κιλών, 4 κιλών, 5 κιλών</b> | HDPE ή COEX                     |
| 2.  | Φιάλη μέσα σε κουτί        | <b>6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 240, 250, 300</b> γραμ.   | HDPE ή COEX<br>Κουτί χάρτινο    |
| 3.  | Κουτί με εσωτερικό σακίδιο | <b>6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 240, 250, 300, 400, 500, 600, 800</b> γραμ. ,<br>1 κιλού, <b>(1,2) κιλών, (1,6) κιλών, (1,8) κιλών, 2 κιλών, (2,4) κιλών, 3 κιλών 4 κιλών, 5 κιλών</b>  | Πολυαιθυλενίου<br>Κουτί χάρτινο |
| 4.  | Σακίδια                    | <b>6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 240, 250, 300, 400, 500, 600, 800</b> γραμ. ,<br>1 κιλού, <b>(1,2) κιλών, (1,6) κιλών, (1,8) κιλών, 2 κιλών, (2,4) κιλών, 3 κιλών, 4 κιλών, 5 κιλών</b> | Πολυαιθυλενίου /<br>Αλουμίνιου  |
| 5.  | Σάκος                      | <b>6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60,</b>  | Χάρτινος σάκος με               |

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
|  | 80, 100, <b>120, 160, 180</b> , 200, <b>240, 250</b> , 300, 400, 500, <b>600, 800</b> γραμ. ,<br>1 κιλού, <b>(1,2) κιλών, (1,6) κιλών, (1,8) κιλών,</b><br>2 κιλών, <b>(2,4) κιλών, 3 κιλών,</b> 4 κιλών, <b>5 κιλών</b> | εσωτερική επένδυση PE |
|--|--|-----------------------|

**3** Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:** Κατευθυνόμενος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων, χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα, τους τρυφερούς βλαστούς, τα άνθη, τις παραφυάδες και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος των καλλιεργειών. Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI).

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού. Εφαρμόστε αμέσως μετά την προετοιμασία του ψεκαστικού υγρού.

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

**Συνδυαστικότητα:** Συνδυάζεται με τα σκευάσματα Roundup Gold 36 SL, Roundup Ultra 48 SL, Rodeo TF και Glialka TF σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα. Προσθέστε πρώτα το ΚΑΤΑΝΑ στο ψεκαστικό υγρό και μετά το άλλο σκεύασμα.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή με σκίσιμο (κουτιά, σακίδια), για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

## 5 5.1 Φάσμα δράσης

| Πεδίο Εφαρμογής   | Στόχος  | Δόσεις σκευάσματος  |                            |                                      | Χρόνος εφαρμογής  | Μέγ. αριθμός εφαρμ/ ανά καλλ. περίοδο |
|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|
|   |   | Γραμ./ στρ. (1)   | Γραμ /100 λίτρα ψεκ. υγρού | Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα (1) |   |                                       |
| <b>Εσπεριδοειδή</b><br>Πορτοκαλιά,<br>Μανταρινιά,<br>Λεμονιά, Γκρέιπ<br>Φρουτ, Κίτρα,<br>κ.α.<br>(από το 4 <sup>ο</sup> έτος<br>της φύτευσής<br>τους) | Ετήσια<br>αγρωστώδη<br>και<br>πλατύφυλλα<br>ζιζάνια<br>Πολυετή<br>ζιζάνια   | 20 μεγ.   | 50 – 100                   | 20 – 40                              | Κατευθυνόμενος<br>ψεκασμός στην<br>γραμμή φύτευσης,<br>προφυτρωτικά ή<br>νωρίς<br>μεταφυτρωτικά των<br>ζιζανίων | 1                                     |
|   | Πλατύφυλλα<br>ζιζάνια<br><br><i>Portulaca<br/>oleracea</i><br>(Αντράκλα)<br><i>Amaranthus<br/>retroflexus</i><br>(τραχύ<br>Βλήτο)   | 6 - 8<br>σε συνδυασμό με<br>Roundup Gold 36<br>SL, Rodeo TF ή<br>Glialka TF<br>σε δόση 240<br><br>6 - 8<br>σε συνδυασμό με<br>Roundup Ultra<br>σε δόση 180                      | --                         |                                      | Κατευθυνόμενος<br>ψεκασμός των<br>ζιζανίων όταν τα<br>ζιζάνια βρίσκονται σε<br>ανάπτυξη                         |                                       |
| <b>Ελιά</b><br>(από το 4 <sup>ο</sup> έτος<br>της φύτευσής<br>τους)   | Ετήσια<br>Αγρωστώδη<br>και<br>πλατύφυλλα<br>ζιζάνια<br>Πολυετή<br>ζιζάνια   | 20 μεγ.   | 50 – 100                   | 20 – 40                              | Κατευθυνόμενος<br>ψεκασμός στην<br>γραμμή φύτευσης,<br>προφυτρωτικά ή<br>νωρίς<br>μεταφυτρωτικά των<br>ζιζανίων | 1                                     |
|   | Πλατύφυλλα<br>ζιζάνια<br><br><i>Calendula<br/>arvensis</i><br>(Καλέντουλα)<br><i>Erodium<br/>malacoides</i><br>(βελονίδα<br>μαλακοειδής)<br><i>Malva<br/>neglecta</i><br>(Μολόχα)<br><i>Borrago<br/>officinalis</i><br><i>Mercurialis<br/>annua</i><br>(Σκαρολάχαν<br>ο)<br><i>Oxalis cernua</i><br>(Οξαλίδα) | 6 - 8<br>σε συνδυασμό με<br>Roundup Gold 36<br>SL, Rodeo TF ή<br>Glialka TF σε<br>δόση<br>179.4 -240<br><br>6 - 8<br>σε συνδυασμό με<br>Roundup Ultra<br>σε δόση<br>134.5 - 180 | --                         |                                      | Κατευθυνόμενος<br>ψεκασμός των<br>ζιζανίων όταν τα<br>ζιζάνια βρίσκονται σε<br>ανάπτυξη                         |                                       |

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

|   |  |   |          |         |   |   |
|---|--|---|----------|---------|---|---|
|   | Πλατύφυλλα<br>ζιζάνια<br><br><i>Calendula<br/>         arvensis</i><br>(Καλέντουλα)<br><i>Diploaxis<br/>         virgata</i><br><i>Erodium<br/>         malacoides</i><br>(βελονίδα<br>μαλακοειδής)<br><i>Urtica dioica</i><br>(Πολυετές<br>τσουκνίδα)<br><i>Stellaria<br/>         media</i><br>(Στελλάρια)<br><i>Lamium<br/>         amplexicaule</i><br>(δωδεκάνθι)<br><i>Malva<br/>         neglecta</i><br>(Μολόχα)<br><i>Senecio<br/>         vulgaris</i><br>(Μαρτιάκος)<br><i>Malva<br/>         sylvestris</i><br>(κοινή<br>μολόχα) | 6 - 8<br>σε συνδυασμό με<br>Roundup Gold 36<br>SL, Rodeo TF ή<br>Glialka TF σε<br>δόση 200 – 264.4<br><br>6 - 8<br>σε συνδυασμό με<br>Roundup Ultra<br>σε δόση<br>150 – 198.3 |          |         | Κατευθυνόμενος<br>ψεκασμός των<br>ζιζανίων όταν τα<br>ζιζάνια βρίσκονται σε<br>ανάπτυξη                         |   |
| <b>Αμπέλι</b><br>(από το 4 <sup>ο</sup> έτος<br>της φύτευσής<br>τους) | Ετήσια<br>Αγρωστώδη<br>και<br>πλατύφυλλα<br>ζιζάνια<br>Πολυετή<br>ζιζάνια  | 20 μεγ.   | 50 – 100 | 20 – 40 | Κατευθυνόμενος<br>ψεκασμός στην<br>γραμμή φύτευσης,<br>προφυτρωτικά ή<br>νωρίς<br>μεταφυτρωτικά των<br>ζιζανίων | 1 |
|   | Πλατύφυλλα<br>ζιζάνια<br><br><i>Veronica<br/>         persica</i><br>(Βερόνικα)<br><i>Sonchus<br/>         arvensis</i><br>(πολυετής<br>ζωχός)   | 6<br>σε συνδυασμό με<br>Roundup Gold 36<br>SL, Rodeo TF ή<br>Glialka TF<br>σε δόση 200<br><br>6<br>σε συνδυασμό με<br>Roundup Ultra<br>σε δόση 150                            | --       |         |   |   |

**Παρατηρήσεις:**

1. Η ποσότητα σκευάσματος και ψεκαστικού υγρού που εφαρμόζονται στη γραμμή φύτευσης, θα πρέπει να υπολογίζεται βάση της πραγματικής επιφάνειας που θα ψεκαστεί. Για παράδειγμα σε αμπελώνα με απόσταση γραμμών φύτευσης 3 μέτρα, θα ψεκαστεί το 1/3 περίπου της συνολικής επιφάνειας του αμπελώνα. Ανάλογα υπολογίζεται και η ποσότητα του glyphosate .
2. Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα στο ΚΑΤΑΝΑ μέχρι το στάδιο των 2 – 4 φύλλων ή έως τα 10 εκ. ύψος.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

3. Τα αποτελέσματα παρατηρούνται 5 – 10 ημέρες μετά τον ψεκασμό, ανάλογα με τη θερμοκρασία.
4. Ο συνδυασμός του με glyphosate, δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιούνται χαμηλότερες δόσεις του ΚΑΤΑΝΑ (6 έως 8 γραμ./στρ), σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ανάγκη για υπολειμματική διάρκεια δράσης του ζιζανιοκτόνου.
5. Για να επιτευχθεί μεγαλύτερη διάρκεια δράσης, να αποφεύγονται οργώματα ή φρεζαρίσματα ένα μήνα πριν και 2 εβδομάδες μετά την εφαρμογή και να χρησιμοποιείτε τη μεγαλύτερη δόση/αναλογία ΚΑΤΑΝΑ.
6. Ο συνδυασμός του με glyphosate, είναι ιδιαίτερα σημαντικός στις φθινοπωρινές εφαρμογές στην ελιά (σε φυτρωμένα ζιζάνια μετά τις βροχές), γεγονός που διευκολύνει τη συγκομιδή αφήνοντας το χώμα γύρω από τα δέντρα, καθαρό από ζιζάνια.
7. Για τα πλατύφυλλα ζιζάνια *Malva* spp (μολόχα), *Portulaca oleraceae* (αντράκλα) και *Urtica* spp. (τσουκνίδα) η δόση του glyphosate στο μίγμα βυτίου, μπορεί να αυξηθεί σε 144 γρ. δ.ο/στρέμμα ψεκαζόμενης έκτασης, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης τους.
8. Μην ψεκάσετε εάν αναμένεται βροχή μέσα σε 6 ώρες.
9. Μην ψεκάσετε όταν φυσάει.
10. Να μην εφαρμόζεται σε αμπέλια που βρίσκονται σε κακή κατάσταση λόγω προσβολής ασθενειών.
11. Να μην εφαρμόζεται σε ελαφριά εδάφη
12. Να μην ψεκάσετε τα πράσινα τμήματα των καλλιεργειών (οφθαλμούς που έχουν ανοίξει, φύλλα, τσαμπιά, βλαστούς, κλπ.), άμεσα ή έμμεσα.

**Καταπολεμούμενα Ζιζάνια****Ευαίσθητα ζιζάνια**

*Bromus sterilis* (αγριοβρώμη) \*  
*Digitaria sanguinalis* (αιματόχορτο)  
*Lolium multiflorum*. (Ηρα) \*  
*Setaria verticillata*, *S. viridis* (Σετάρια)  
*Amaranthus retroflexus* (Βλήτο) \*  
*Capsella bursa-pastoris* (Καψέλλα) \*  
*Chenopodium album* (Λουβουδιά)  
*Conyza canadensis* \* (Κόνυζα)  
*Crepis sancta* \* (Πικραλίδα)  
*Daucus carota* (Αγριοκαρώτο)  
*Epilobium tetragonum* (Επιλόβιο)  
*Erodium cicutarium* (Βελονίδα)  
*Geranium dissectum*, *G. rotundifolium*, *G. mole* \*\* (Γεράνι)  
*Malva* sp \*\* (Μολόχα)  
*Picris echioides* \* (Πικρίς)  
*Mercurialis annua* (Σκαρολάχανο)  
*Senecio vulgaris* (Μαρτιάκος)  
*Stellaria media* (Στελλάρια)  
*Taraxacum officinalis* (Αγριοράδιχο)

**Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια**

*Roa annua* (Ποα ετήσια) \*  
*Lactuca serriola* \* (Αγριομάρουλο)  
*Sonchus asper*, *S. oleraceus* (Ζωχοί)

\*Καταπολεμούνται καλύτερα προφυτρωτικά

\*\* Καταπολεμούνται καλύτερα μεταφυτρωτικά

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο [Παράρτημα ΙΙ](#).

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 70.161 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) ΚΑΤΑΝΑ (δ.ο. flazasulfuron), η οποία χορηγήθηκε με την υπ' αριθμό 10697/122535π.ε./27-5-2016 Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ**