



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 27-11-2017  
Αριθ. πρωτ: 10471/101551**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΚΑΛΛΙΘΕΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Π. Θεοδωρής  
Τηλέφωνο: 210 928 7225  
e-mail: [ptheodoris@minagric.gr](mailto:ptheodoris@minagric.gr)**

**Προς: W. NEUDORFF GmbH KG**

**Δια: 'Τουτουζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.'  
Agribiz**

**ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 14483 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος PROMANAL NEU (δ.ο. Paraffin oil, CAS 8042-47-5) ως προς τον 'υπεύθυνο επικοινωνίας', το 'φάσμα δράσης' και τη 'τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή' για χρήσεις ήσσονος σημασίας»**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
3. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 (ΦΕΚ Β'/2587) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας»
5. Τη με αριθ. 7852/85220 /01.07.2014 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 14483 άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν PROMANAL NEU.
6. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και

Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".

7. Τη υπ' αριθμ. 10471/101551/28-09-2017 αίτηση της εταιρείας W. NEUDORFF GmbH KG δια της 'Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.'.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- A.** Τροποποιούμε την με αριθμό έγκρισης **14483** οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **PROMANAL NEU (δ.ο. Paraffin oil, CAS 8042-47-5)** η οποία χορηγήθηκε με την με αρ. πρωτ. 7852/85220 /01.07.2014 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς τον 'υπεύθυνο επικοινωνίας', το 'φάσμα δράσης' και τη 'τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή'

Συγκεκριμένα:

A. Τα σημεία 1.4.α), 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

#### W. NEUDORFF GmbH KG

An der Muhle 3  
T.K : D-31860 Emmerthal - Γερμανία  
Contact person: Mrs. Martina Utenwiehe  
Τηλ.: +49 (0) 5155 624 127  
Fax: +49 (0) 5155 624 139  
Email: [m.utenwiehe@neudorff.de](mailto:m.utenwiehe@neudorff.de)

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

#### Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.

#### «Agribiz»

Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα

Τηλ.: 210 7471000

Φαξ: 210 7471009

E-mail: [a.toutoutzidakis@agribiz.gr](mailto:a.toutoutzidakis@agribiz.gr)

#### 5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο εφαρμογής	Στόχοι	Δόσεις			Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο. Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		κ.εκ. σκευάσματος /100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/ στρ.)	κ.εκ. σκεύασμα τος / στρ		
<b>ΕΣΠΕΡΙΔ ΟΕΙΔΗ</b> Λεμονιά CIDLI, Μανταρινιά (Κλημεντίνες) CIDRE,	<b>Κοκκοειδή Κόκκινη ψώρα και άλλες ψώρες</b> ( <i>Aonidiella aurantii</i> - AONDAU)	1000 - 2000	50-150	500-3000	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής και πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών.	2 / > 60

Πορτοκαλιά CIDSΙ						
<b>Αμυγδαλιά</b> <b>PRNDU</b>	<b>Κοκκοειδή Ψώρα Σαν Ζοζέ</b> ( <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> -QUADPE) <b>Βαμβακάδα ή Διάσπης</b> ( <i>Pseudalacaspis pentagona</i> -PSEAPE) ( <i>Planococcus / Pseudococcus</i> sp-PSECSP) <b>Μυτιλόμορφη ψώρα</b> ( <i>Lepidosaphes ulmi</i> -LEPSUL) <b>Κόκκινη ψώρα</b> ( <i>Aonidiella aurantii</i> -AONDAU) <b>Κ.α. ψώρες</b> ( <i>Sphaerolecanium prunastri</i> -LECAPN) ( <i>Eulecanium persicae</i> -LECAPE) ( <i>Melanaspis inopinata</i> -MELAIN) <b>Κίτρινος τετράνυχος</b> ( <i>Tetranychus urticae</i> -TETRUR)	1000	45-120	450 – 1200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής από την ροζ κορυφή και μετά την συγκομιδή.	2/7
Μηλιά MABSD	<b>Τετράνυχοι</b> ( <i>Panonychus ulmi</i> -METTUL)	1000	45-120	450 – 1200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής έως το δέσιμο των καρπών και μετά την συγκομιδή.	2/6 - 7
Μηλιά	<b>Αφίδες</b>	1000	45-120	450 – 1200	Εφαρμογές με την	

MABSD, Αχλαδιά PYUCO	( <i>Aphis pomi</i> - APHIPO, <i>Dysaphis plantaginea</i> - DYSAPL)				εμφάνιση της προσβολής από την πράσινη κορυφή και μετά την συγκομιδή.	
Μηλιά MABSD, Αχλαδιά PYUCO	<b>Ψύλλα</b> ( <i>Cacopsylla pyri</i> - PSYLPI)	1000	45-120	450 – 1200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής από την αρχή της βλάστησης έως μικρούς καρπούς	
Βερικοκι ά PRNAR Κερασιά PRNAV Ροδακινι ά PRNPS Νεκταρινι ά PRNPS Δαμασκη νιά PRNDO	<b>Αφίδες</b> ( <i>Myzus persicae</i> - MYZUPE, <i>Myzus cerasi</i> - MYZUCE, <i>Hyalopterus sp.</i> - HYALSP)	1000	45-120	450 – 1200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής από την ροζ κορυφή και μετά την συγκομιδή.	2/7
Ελιά OLVEU	Κοκκοειδή Λεκάνιο και άλλες ψώρες ( <i>Saissetia oleae</i> - SAISOL)	2000	30-75	600-1500	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής από την πτώση των πετάλων έως μικρούς καρπούς.	1
<b>Αμπέλι</b> <b>VITVI</b>	<b>Ψευδόκοκκος ή</b> <b>Βαμβακάδα</b> ( <i>Pseudococcus</i> <i>sp.</i> -PSECSP) ( <i>Planococcus sp.</i> - PLANSP) <b>Κ.α. ψώρες</b> ( <i>Parthenolecaniu</i> <i>m corni</i> – LECACO) ( <i>Pulvinaria vitis</i> - PULVVI) <b>Ερίνωση</b> ( <i>Eriophyes vitis</i> - ERPHVI) <b>Μετκάλφα</b> ( <i>Metcalfa</i>	1000	45-120	450 – 1200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής από την αρχή της βλάστησης έως το δέσιμο των καρπών και μετά την συγκομιδή.	2/7

	<p><i>pruinosa</i>-METFPR)  <b>Θρίπες</b>  <i>(Frankliniella occidentalis</i>-FRANOC)  <b>Δροσόφιλα</b>  <i>Drosophila suzukii</i> – DROSSU)</p>					
<b>Ακτινιδιά</b> <b>ATIDE</b>	<p><b>Κίτρινος Τετράνυχος</b>  <i>(Tetranychus urticae</i>-TETRUR)  <b>Ψώρα Σαν Ζοζέ</b>  <i>(Quadraspidiotus perniciosus</i>-QUADPE)  <b>Βαμβακάδα ή Διάσπις</b>  <i>(Pseudaulacaspis pentagona</i>-PSEAPE)  <b>Μετκάλφα</b>  <i>(Metcalfa pruinosa</i>-METFPR)  <b>Βαμβακάδα</b>  <i>(Euphyllura sp.</i>-EUPHSP)</p>	1000	45-120	450 – 1200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής από την αρχή της βλάστησης έως το δέσιμο των καρπών και μετά την συγκομιδή.	2/7
<b>Ροδιά</b> <b>PUNGR</b>	<p><b>Τετράνυχος</b>  <i>(Tetranychus urticae</i> TETRUR)  <b>Ακάρεα</b>  <i>(Eriophyes grannati</i> ACEIGA)  <b>Αλευρώδεις</b>  <i>(Trialeurodes vaporariorum</i>-TRIAVA  <i>Bemisia tabaci</i> – BEMITA)  <b>Αφίδες</b>  <i>(Aphis gossypii</i> – APHIGO  <i>A. fabae</i> -</p>	1000	45-120	450 – 1200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής από την αρχή της βλάστησης έως το δέσιμο των καρπών και μετά την συγκομιδή.	2/7

	ΑΡΗΙΦΑ, <i>Macrosiphum euphorbiae</i> - MACSEU, <i>Myzus persicae</i> - MYZUPE) Θρίπες ( <i>Thrips sp</i> - THRISP)					
Συκιά FIUCA	Κίτρινος Τετράνυχος ( <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR) Κηροπλάστης ( <i>Ceroplastes rusci</i> CERPRU) Λογχαία ή μαύρη μύγα των σύκων ( <i>Carpolonchaea aristella</i> - CAROAR) Ψύλλα ( <i>Homotoma ficus</i> -HOMTFI)	1000	45-120	450 – 1200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής από την αρχή της βλάστησης έως το δέσιμο των καρπών και μετά την συγκομιδή.	2/7
Τομάτα LYPES, Μελιτζάν α SOLME, Πιπεριά CPSAN, Αγγούρι CUMSA, Κολοκύθι CUUPG, Πεπόνι CUMME, Καρπούζι CITLA (θερμοκη πίου)	Αλευρώδεις ( <i>Bemisia tabaci</i> - BEMITA, <i>Trialeurodes vaporariorum</i> - TRIAVA) Θρίπες ( <i>Frankliniella occidentalis</i> - FRANOC)	1000	30-120	300-1200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	α) 2/7 β) 2/>60 (8)
Κουνουπί δι BRSOX, Μπρόκολ	Αλευρώδεις ( <i>Aleyrodes proletella</i> - ALEUPR)	1000	30-100	300 – 1000	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής,	2 / >60

ο BRSOK (υπαίθρο υ)						
<p><b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ο όγκος ψ.υ. εξαρτάται από το ύψος του φυτού.</li> <li>2. Στα Εσπεριδοειδή χρησιμοποιήστε τη μικρή δόση στην πρώτη εφαρμογή και τη μεγάλη στην δεύτερη, για την προστασία των καρπών.</li> <li>3. Κατά τη χρήση του PROMANAL NEU EW, τα δένδρα πρέπει να είναι ποτισμένα. Ποτίζουμε μία εβδομάδα πριν από τον ψεκασμό.</li> <li>4. Αποφύγετε τον ψεκασμό όταν τα φυτά είναι μισομαραμένα, σε περιόδους έντονης ξηρασίας, υπερβολικής υγρασίας και όταν υπάρχει παγετός.</li> <li>5. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32 °C γιατί μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα φυτοτοξικότητας.</li> <li>6. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα 40 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή θείου ή θειασβεστίου.</li> <li>7. Να μην προηγείται ή έπεται εφαρμογή σκευάσματος με δ.ο. captan, folpet ή dithianon σε διάστημα τουλάχιστον 1 εβδομάδας.</li> <li>8. Στα θερμοκήπια να μην πραγματοποιείται δεύτερη εφαρμογή με μεσοδιάστημα μικρότερο των 60 ημερών όταν γίνεται χρήση σκευασμάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς.</li> <li>9. Στις υπαίθριες καλλιέργειες κουνουπίδι, μπρόκολο το μεσοδιάστημα αφορά την περίοδο διαδοχικών/κλιμακωτών φυτεύσεων στον ίδιο αγρό.</li> <li>10. «Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες Αμυγδαλιά, Αμπέλι, Ακτινιδιά, Ροδιά και Συκιά από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος»</li> </ol>						

**13** Προστασία των καταναλωτών

**13.1 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις**

<u>Φυτικά προϊόντα</u>	<u>Ημέρες</u>
<u>Λεμονιά, Μανταρινιά (Κλημεντίνες), Πορτοκαλιά</u>	<u>Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος</u>
<u>Μηλιά, Αχλαδιά</u>	<u>Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος</u>
<u>Ροδακινιά, Νεκταρινιά Δαμασκηνιά, Κερασιά, Βερικοκιά</u>	<u>Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος</u>
<u>Αμυγδαλιά</u>	<u>Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος</u>
<u>Ελιά</u>	<u>Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος</u>
<u>Αμπέλι</u>	<u>Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος</u>
<u>Ακτινιδιά</u>	<u>Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος</u>
<u>Ροδιά</u>	<u>Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος</u>
<u>Συκιά</u>	<u>Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος</u>
<u>Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά Αγγούρι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι (θερμοκηπίου)</u>	<u>Δεν ορίζεται</u>
<u>Κουνουπίδι, Μπρόκολο (υπαίθρου)</u>	<u>Δεν ορίζεται</u>



Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. **7852/85220 /01.07.2014** απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό **14483** οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **PROMANAL NEU (δ.ο. Paraffin oil, CAS 8042-47-5)**.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ

Γ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ