



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 26 - 05 - 2017  
Αριθ. Πρωτ. 3842/37711

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 9212090  
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου

Προς: BASF Ελλάς ΑΒΕΕ  
Παραδείσου 2 & Κηφισίας  
Μαρούσι 15125  
e-mail:  
[dimitris.theodosiou@basf.com](mailto:dimitris.theodosiou@basf.com)

Τηλέφωνο: 210 9287161  
e-mail: [chpanagoulou@minagric.gr](mailto:chpanagoulou@minagric.gr)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της με αριθ. 60252 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CANTUS 50 WG (boscalid 50% β/β) ως προς το φάσμα δράσης (χρήσεις ήσσονος σημασίας)».

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

## ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με το SANCO doc.357 /rev.3/ 2008
3. Τον Ν. 4036 (ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012) σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, την ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 (ΦΕΚ Β'/2587) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας»

5. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 4774/46525 /27-4-2017 εισήγηση της Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης.
6. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
7. Τις με αρ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 412/4891/17-1-2017, και 3842/37711/3-4-2017 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 60252 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CANTUS 50 WG, που χορηγήθηκε με την αριθ. 127959/13-4-2009 Απόφασή μας, ως προς
  1. την κατηγορία και τρόπος δράσης
  2. τις οδηγίες χρήσης
  3. το φάσμα δράσης
  4. τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί
  5. τις δηλώσεις προφύλαξης
  6. την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή .

Συγκεκριμένα, τα σημεία 3, 4, 5, 11 και 13.2 διαμορφώνονται ως εξής:

3	<b>Οδηγίες χρήσης</b>	<p><b>Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες</b></p> <p>Τρόπος εφαρμογής: Αμπέλι, Μηλοειδή: ψεκασμοί καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας . Ακτινίδια: εμβάπτιση καρπών (μετασυλλεκτικές εφαρμογές).</p> <p>Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το βυτίο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώνουμε το βυτίο με νερό και συνεχίζουμε την ανάδευση σε όλη την διάρκεια του ψεκασμού.</p> <p>Παρασκευή του υγρού εμβάπτισης: Η απαιτούμενη δόση του σκευάσματος προστίθεται στη μισή ποσότητα νερού, αναδεύεται καλά και συμπληρώνεται με το υπόλοιπο νερό με συνεχή ανάδευση</p> <p>Καθαρισμός ψεκαστήρα: Συστήνεται ο καθαρισμός του ψεκαστήρα με νερό.</p>
---	-----------------------	---

	<p>Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:</p> <p>Καύση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε εξουσιοδοτημένη για το σκοπό αυτό μονάδα, η οποία διαθέτει κατάλληλο κλίβανο αποτέφρωσης (&gt;1100 ° C, 2 sec).</p> <p>Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας</p> <p>Οι άδειες συσκευασίες να μην χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό.</p> <p><b>Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του διαλύματος εμβάπτισης:</b>  <b>Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Τα υγρά απόβλητα από την εφαρμογή με Εμβάπτιση, υποβάλλονται σε επεξεργασία με μία από τις εγκεκριμένες διαδικασίες απορρύπανσης και έπειτα διοχετεύονται στο σύστημα αποχέτευσης, με την προϋπόθεση ότι αυτό είναι συνδεδεμένο με εγκατάσταση βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων.</li> <li>- Αν κάποια από αυτές τις προϋποθέσεις δεν ισχύει, μπορεί να ανατεθεί η εργασία αυτή σε ειδικό/εξουσιοδοτημένο συνεργείο που ανήκει σε εγκεκριμένη επιχείρηση για την ασφαλή διάθεση των υγρών και στερεών αποβλήτων.</li> </ul> <p>Σε περίπτωση χρήσης από συσκευαστήρια που δεν πληρούν τα ανωτέρω εφαρμόζονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 9, παράγραφο 12 και το άρθρο 10, παράγραφο 7 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8).</p>
--	---

<b>4</b>	<b>Κατηγορία και τρόπος δράσης:</b>	<p>Το CANTUS είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση του βοτρυτή στο αμπέλι με προληπτική και θεραπευτική δράση και της αλτερναρίωσης στη μηλιά και την αχλαδιά. Καταπολεμά επίσης τον βοτρυτή και την αλτερναρίωση στην ακτινιδιά σε μετασυσλλεκτικές εφαρμογές Η δραστική ομάδα bosclide ανήκει στην ομάδα των καρβοξαμιδικών και δρα εμποδίζοντας την κυτταρική αναπνοή στο σύμπλοκο II της αναπνευστικής αλυσίδας.</p> <p>Το CANTUS σταματά την βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τον σχηματισμό των <i>apogonia</i>, με τα οποία ο μύκητας διεισδύει στους φυτικούς ιστούς, εμφανίζοντας προληπτική κυρίως αλλά και θεραπευτική δράση στην έναρξη της μόλυνσης.</p>
----------	-------------------------------------	--

<b>5 5.1 Φάσμα δράσης</b>						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		γρ./στρέμμα (max)	γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος υγρού λίτρα / στρέμμα		
Αμπέλι	Βοτρυτής ( <i>Botrytis cinerea</i> )	120	120	100	Τέλος άνθησης ή πριν το κλείσιμο του σταφυλιού ή πριν τη συγκομιδή	1
<b>Μηλιά, Αχλαδιά</b>  (Μικρής σημασίας χρήση)	Αλτερναρίωση ( <i>Alternaria alternata</i> )	40	-	100-150	Οι ψεκασμοί ξεκινούν κατά την έναρξη της άνθισης μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το μισό του τελικού τους μεγέθους.	3/10-14
<b>Ακτινιδιά, για μετασυσλλεκτική ή χρήση</b>  (Μικρής σημασίας χρήση)	Βοτρυτής ( <i>Botrytis cinerea</i> )  Αλτερνάρια ( <i>Alternaria sp.</i> )	-	75	-	Κάνετε 1 μετασυσλλεκτική εφαρμογή (εμβάπτιση καρπών) 60 ημέρες πριν τη διάθεση των καρπών στην αγορά.	1

**Παρατήρηση:** Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες της μηλιάς, της αχλαδιάς, και των ακτινιδίων (μετασυλλεκτική χρήση) από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του επομένως η χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

11

**ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ**

**P405+ P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

**P270:** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια.

**P391:** Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

« Οι χειριστές θα πρέπει να φορούν κατάλληλη φόρμα εργασίας και σταθερά παπούτσια. Επιπλέον οι χειριστές/εργάτες που σχετίζονται με την διαδικασία εμβάπτισης των καρπών θα πρέπει να φορούν προστατευτικά γάντια».

«Οι εργάτες να μην εισέρχονται στο πεδίο εφαρμογής πριν στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό στην φυλλική επιφάνεια».

«Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία (μακρύ παντελόνι, μπλούζα με μακριά μανίκια) και κατάλληλα γάντια εάν εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής λίγο μετά τον ψεκασμό».

**SP1** Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

**SPe3** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων, από τα επιφανειακά ύδατα.

**EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**13 Προστασία των καταναλωτών**

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	ΡΗΙ(ημέρες)
Σταφύλια	28
Αχλάδια, Μήλα	7
Ακτινίδια	Τηρήστε ένα χρονικό διάστημα ασφαλείας 60 ημερών μεταξύ της μετασυλλεκτικής εφαρμογής και διάθεσης των καρπών προς κατανάλωση

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. 127959/13-4-2009 Απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ**