



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΠ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 16-08-2017
Αριθ. πρωτ: 4252/41567**

Ταχ. Δ/ση:	Α. Συγγρού 150, 17671-ΚΑΛΛΙΘΕΑ	Προς:	Dow AgroSciences Export SAS
TELEFAX:	210 92 12 090		Γαλλίας
Πληροφορίες:	Ηλ. Νασιόπουλος		(δια της εταιρείας
Τηλέφωνο:	210 928 72 11		K+N. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ,
e-mail:	inasiopoulos@minagric.gr		Τ.Θ. 48, Τ.Κ. 57022,
			ΒΙ.ΠΕ.Θ.-ΣΙΝΔΟΣ)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 60.475 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) Fenbuconazole-DOW 2,5 EW, ως προς το φάσμα δράσης, τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή»

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνεται η δραστική ουσία fenbuconazole.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης}-6-11 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επίσημησης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
7. Τη με αριθ. 14309/162816/22.12.14 Απόφασή μας με θέμα "Αντικατάσταση των εθνικών απαιτήσεων κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάση του Καν. 1107/2009".
8. Τη με αριθ. πρωτ. 393/4672/16.1.17 αίτηση της εταιρείας K+N. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ, ως υπεύθυνης επικοινωνίας της εταιρείας Dow AgroSciences Export SAS Γαλλίας, καθώς και τα με αριθ. πρωτ. 4252/41567/11.4.17 υποβληθέντα συμπληρωματικά στοιχεία.
9. Την αρχική έκθεση αξιολόγησης του σκευάσματος και το αναθεωρημένο τμήμα Β7 της έκθεσης αξιολόγησης (αριθ. πρωτ. ΜΦΙ εμπ 932/15.6.17, αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 6926/67641/22.6.17).
10. Τη με αριθ. 1606/16641/14.02.17 (Β' 629) Υπ. Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A. Τροποποιούμε τη με αριθ. **60.475** άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) Fenbuconazole-DOW 2,5 EW, που χορηγήθηκε με την αριθ. 8690/99149/15.9.15 Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με την αριθ. 10935/124782/24.11.15 Απόφασή μας, ως προς το φάσμα δράσης, τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή. Οι παράγραφοι 1.4^δ, 1.4^ε, 5 και 13.2 της αριθ. 8690/99149/15.9.15 Απόφασής μας, διαμορφώνονται ως ακολούθως:

1.4δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

Diachem SPA

S.S. 11 Padana Superiore Km 185, 24043 Caravaggio (BG), Italy

Dow AgroSciences Limited, Manufacturing site

Estuary Road, King's Lynn, Norfolk, PE30 2JD, UK

Dow AgroSciences Switzerland SA

Strada Statale 11, Kilometro 190,2
24050 Mozzanica, Bergamo, Italy

1.4ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

Diachem SPA

S.S. 11 Padana Superiore Km 185, 24043 Caravaggio (BG), Italy

Dow AgroSciences Limited, Manufacturing site

Estuary Road, King's Lynn, Norfolk, PE30 2JD, UK

Dow AgroSciences Switzerland SA

Strada Statale 11, Kilometro 190,2
24050 Mozzanica, Bergamo, Italy

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ

ΒΙ.ΠΕ.Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ -Τ.Κ. 57022
ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180

5. 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο-μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες
		κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	γρ/ στρ (max)	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ		
Μηλοειδή: Μηλιά Αχλαδιά Αχλαδιά -Nashi Κυδωνιά Μουσμουλιά (ήσσονος σημασίας)	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i> , <i>V. pirina</i>)	135-200	200	50-150	BBCH 10-80 Εφαρμογή από το στάδιο της «ρόδινης κορυφής» και την ανάπτυξη των φύλλων ως την ωρίμανση των καρπών.	4/7 μέρες

Πυρηνόκαρπα: Ροδακινιά Νεκταρινιά Βερικοκιά Δαμασκηνιά Κερασιά Βυσινιά	Φαιά Σήψη <i>(Monilinia Laxa, Monilinia fructicola, Monilinia fructigena),</i> Ωίδιο <i>(Sphaerotheca pannosa, Podosphaera clandestine, Podosphaera tridactyla),</i> Κυλινδροσπό-ριο κερασιάς <i>(Blumeriella jaapii),</i> Σκωρίαση <i>(Tranzschelia discolor, Polystigma rubrum),</i> Ανθράκωση <i>(Gnomonia erythrostoma)</i>	200-600	300	50-150	BBCH 11-87 Με το ξεδίπλωμα των φύλλων και την αναπτυξη των βλαστών ως την ωρίμανση των καρπών.	4/10 μέρες
Αμυγδαλιά	Φαιά Σήψη <i>(Monilinia Laxa, Monilinia fructicola, Monilinia fructigena)</i>	300-840	300	35-100	BBCH 57-69 Με την έκπτυξη των οφθαλμών/αρχή της άνθησης έως το τέλος της άνθησης.	2/7 μέρες
Φιστικιά (ήσσονος σημασίας)	Σεπτόρια <i>(Septoria pistacia),</i> Σκωρίαση <i>(Pileolaria terebinthi, pileolaria sp.),</i> Βοτρυοσφάρια <i>(C. pistaciear)</i>	300-840	300	35-100	BBCH 57-69 Με την έκπτυξη των οφθαλμών/αρχή της άνθησης έως το τέλος της άνθησης.	2/7 μέρες
Αμπέλι (Επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)	Ωίδιο <i>(Uncinula (Erysiphe) necator)</i>	150	150	100	BBCH 13-80 Εφαρμογή πριν την άνθηση, όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 5-10 εκ., και μέχρι της αλλαγής του χρώματος των ραγών, και ανάλογα των καιρικών συνθηκών που επικρατούν.	4/10-14 μέρες
ΕΛΙΑ	Κυκλοκόνιο <i>Cycloconium oleaginum</i> <i>(Spirocaea elagina)</i>	300	300	80-100	Από την εποχή που διαχωρίζονται τα πρώτα φύλλα μέχρι και πριν την άνθηση. Αλλαγή χρώματος της στεφάνης από πράσινο σε λευκό (πριν ανοίξουν τα πρώτα άνθη). BBCH 11-59	1

Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: Αγγούρι (Υ+Θ), Κολοκυθάκια (Υ)	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca fuligenia</i> (Podosphaera fusc), Erysiphe cichoracearum (Golovinomyces cichoracearum)	200-500	200	40-100	BBCH 13-89 Με την εμφάνιση 3 πραγματικών φύλλων στον κύριο βλαστό έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών.	3/8 μέρες
Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: Πεπόνι (Υ), Καρπούζι (Υ)						

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ.

Παρατηρήσεις:

1. Διαχείριση ανθεκτικότητας: Οι επεμβάσεις με το σκεύασμα, πρέπει να γίνονται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης που δεν ανήκουν στην ομάδα των DMIs και δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με αυτή.
2. Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας μουσμουλιάς και φιστικιάς δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. Υπεύθυνος σε σχέση με τις αποτυχίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα του προϊόντος για τις χρήσεις αυτές, είναι το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν.

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Καλλιέργεια	ΡΗΙ (ημέρες)
Μηλιά, Αχλαδιά, Αχλαδιά Nashi, Κυδωνιά, Μουσμουλιά	28
Αμυγδαλιά	120
Φιστικιά	120
Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά	3
Κερασιά, Βυσσινιά	5
Αμπέλι (Επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)	28
Κολοκυνθοειδή: Αγγούρι (Υ+Θ), Πεπόνι (Υ), Καρπούζι (Υ), Κολοκυθάκια (Υ)	3
Ελιά	Μη εφαρμόσιμο (καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής (βλ. παρ. 5)

Β. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 8690/99149/15.9.15 Απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής**

Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ