



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 18 - 12 - 2017  
Αριθ. πρωτ: 11984/115237

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 9212090  
Πληροφορίες: Νίκος Παπανικολάου  
Τηλέφωνο: 210 9287230  
e-mail: [npapanikolaou@minagric.gr](mailto:npapanikolaou@minagric.gr)

Προς: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.  
Παραδείσου 2 & Κηφισίας,  
151 25 Μαρούσι  
e-mail: [dimitris.theodosiou@basf.com](mailto:dimitris.theodosiou@basf.com)

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) DEVIN 10 EC (cycloxydim 10% β/ο)»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

## ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο έχει συμπεριληφθεί η δραστική ουσία cycloxydim.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1907/2006.

2

7. Τη με αριθμό έγκρισης 70.202/21-2-2017 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος FOCUS 10 EC, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τη με αριθμό πρωτ. 1606/16641/14.02.2017 (ΦΕΚ 629/Β/01.03.2017) Απόφαση Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9. Την με αριθ. πρωτ. 11984/115237/1-11-2017 αίτηση της εταιρείας BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

**A** Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν DEVIN 10 EC της εταιρείας BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος****Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης  
1.1.β Ημερομηνία λήξης

70265
18/12/2017
31/05/2022

**1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα  
1.2.β Μορφή:

DEVIN 10 EC
Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)

**1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες)**

<b>Δραστική ουσία</b>	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	<b>Cycloxydim</b>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	<b>94 % (β/β) min</b>
Χημική ομάδα	Κυκλοεξανοδιόνες
Παρασκευαστής	<b>BASF SE</b> Carl-Bosch-Strasse 38 67056 Ludwigshafen Germany
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: <b>BASF SE</b> Carl-Bosch-Strasse 38 67056 Ludwigshafen/Germany
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ στο part C της έκθεσης αξιολόγησης (registration report) του προϊόντος αναφοράς FOCUS 10 EC.

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας:

**BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε**

Παραδείσου 2 &amp; Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι

ΑΜΕ: BASGR

Τηλ.: 2106860120

Fax: 2106860200

E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε**

Παραδείσου 2 &amp; Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι

ΑΜΕ: BASGR

Τηλ.: 2106860120

Fax: 2106860200

E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

Ο κάτοχος της έγκρισης

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**BASF SE**

Carl-Bosch-Strasse 38

67056 Ludwigshafen

Germany

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1) **BASF SE**

B 510 Carl-Bosch-Strasse 38

67056 Ludwigshafen / Germany

2) **Schirm GmbH**

Standort Schönebeck

Geschwister-Scholl-Strasse 127

39218 Schönebeck/Germany

3) **IMPERIAL Chemical Logistics GmbH**

Wendessener Strasse 11c

38300 Wolfenbutte/Germany

4

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

**1) BASF SE**

B 510 Carl-Bosch-Strasse 38  
67056 Ludwigshafen / Germany

**2) Schirm GmbH**

Standort Schönebeck  
Geschwister-Scholl-Strasse 127  
39218 Schönebeck/Germany

**3) Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.**

570 22 ΣΙΝΔΟΣ, Θεσ/νίκη,  
Ελλάς.

**4) IMPERIAL Chemical Logistics GmbH**

Wendessener Strasse 11c  
38300 Wolfenbutte/Germany

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: cycloxydim 10% β/ο  
Βοηθητικές ουσίες: 88,8% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ στο Παράρτημα Ι και στο part C της έκθεσης αξιολόγησης (registration report) του προϊόντος αναφοράς FOCUS 10 EC.

Περιέχει το διαλύτη "narhta".

## 2 Συσκευασία(ες)

### 2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	100 κ.εκ, 150 κ.εκ, 250 κ.εκ, 500 κ.εκ, 1 λίτρο	PA/PE (Coex)
2	Eco-Φιάλες	1 λίτρο	PA/PE (Coex)
3	Δοχεία	3, 5, 10 λίτρα	PA/PE (Coex)
4	Eco-Δοχεία	5, 10 λίτρα	PA/PE (Coex)

**3** Οδηγίες χρήσης:**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ψεκασμός με τη χρήση μπεκ τύπου σκούπας. Εφαρμογές νωρίς μεταφυτευτικά / μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας και πριν οι γραμμές σποράς κλείσουν, όταν τα αγρωστώδη είναι σε ζωηρή ανάπτυξη και μέχρι το αδελφωμά τους.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού με την μισή ποσότητα νερού. Προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα σκευάσματος υπό ανάδευση. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με την υπόλοιπη ποσότητα νερού, συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Πλύνετε τα ψεκαστικά μηχανήματα με νερό, αμέσως μετά το τέλος του ψεκασμού.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. Το προϊόν καταστρέφεται με κάψιμο σε ειδικούς καυστήρες για αγροχημικά (περίπου 1100°C για 2 δευτερόλεπτα).

Συνδυαστικότητα: -**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εκλεκτικό, διασυστηματικό, μεταφυτευτικό ζιζανιοκτόνο, το οποίο καταπολεμά ετήσια και πολυετή ζιζάνια. Το DEVIN 10 EC περιέχει το δραστικό συστατικό cycloxydim, που ανήκει στη χημική ομάδα των κυκλοεξανοδίων. Το cycloxydim απορροφάται από τα φύλλα και παρεμποδίζει το σχηματισμό των μεριστωματικών ιστών των ευαίσθητων ζιζανίων. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει την καρβοξυλάση του ακετυλοσυνενζύμου Α στη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων.

5 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ στρέμμα	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά	<b><u>Αγρωστώδ η Ζιζάνια</u></b>	200 <sup>(1)</sup>	-	15-40	Κάνετε ανοιξιότικες – καλοκαιρινές εφαρμογές, μέχρι το στάδιο της πλήρους ανάπτυξης των καρπών.	1
Αμπέλι (επιτραπέζιο, οινοποιήσιμο, σταφίδα)		400 <sup>(2)</sup>			Κάνετε ανοιξιότικες – καλοκαιρινές εφαρμογές, μέχρι το πλήρες κλείσιμο των σταφυλιών.	1
Πατάτα		500 <sup>(3)</sup>			Κάνετε εφαρμογές κατά την ανάπτυξη του υπέργειου τμήματος (BBCH 10-19)	1
Καρότο, Χρένο, Ραπανάκι, Σελινόριζα, Παστινάκη, Λαγόχορτο					Κάνετε εφαρμογές από το στάδιο του 3 <sup>ου</sup> φύλλου ως την ανάπτυξη του 50% του ριζώματος.	1
Κρεμμύδι, Σκόρδο, Ασκαλώνιο, Φρέσκο κρεμμυδάκι, Πράσο					Κάνετε εφαρμογές από το στάδιο του 5 <sup>ου</sup> φύλλου ως την ανάπτυξη του 50% του βολβού.	1
Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα					Κάνετε εφαρμογές από το στάδιο του 2 <sup>ου</sup> φύλλου ως την ανάπτυξη του 3 <sup>ου</sup> πλευρικού βλαστού.	1
Λευκό Λάχανο, Λαχανάκια Βρυξελλών, Φυλλώδεις κράμβες (Κινέζικο λάχανο, Κόκκινο λάχανο)					Κάνετε εφαρμογές από το στάδιο του 3 <sup>ου</sup> φύλλου ως την ανάπτυξη του 50% του κεντρικού στελέχους.	1

Μαρούλι, Σκαρόλα, Λυκοτρίβολο Κάρδαμο, Κόκκινο Σινάπι, Γαιοκάρδαμο, Σπανάκι, Αντράκλα, Αρωματικά φυτά					Κάνετε εφαρμογές από το 3 <sup>ο</sup> ως το 9 <sup>ο</sup> φύλλο.	1
Φασόλια (φρέσκα με λοβό), Φασόλι (ξερό), Μπιζέλι (ξερό), Φακές, Λούπινα, Ρεβίθια					Κάνετε εφαρμογές από το 3 <sup>ο</sup> σύνθετο φύλλο ως το στάδιο ανάπτυξης του 5 <sup>ου</sup> μεσογονατίου διαστήματος.	1
Ζαχαρότευτλο , Κτηνοτροφικό τεύτλο, Γογγύλι, Παντζάρι					Κάνετε εφαρμογές από το στάδιο του 3 <sup>ου</sup> ζεύγους φύλλων ως την πλήρη ανάπτυξη της ροζέτας.	1
Βαμβάκι					Κάνετε εφαρμογές από το 2 <sup>ο</sup> φύλλο ως το στάδιο έκπτυξης όλων των πλάγιων βλαστών.	1
Ελαιοκράμβη					Κάνετε εφαρμογές από το 3 <sup>ο</sup> φύλλο ως το στάδιο ανάπτυξης του 5 <sup>ου</sup> μεσογονατίου διαστήματος.	1
Ρύζι <sup>(4)</sup>					Κάνετε εφαρμογές πριν τη σπορά.	1
Σόγια					Κάνετε εφαρμογές από το 4 <sup>ο</sup> ως το 9 <sup>ο</sup> σύνθετο φύλλο.	1
Ηλίανθος					Κάνετε εφαρμογές από το 2 <sup>ο</sup> ως το 8 <sup>ο</sup> φύλλο.	1

Παρατηρήσεις:

1) **Καταπολεμούμενα Ζιζάνια στη δόση των 200 κ.εκ./στρέμμα:**

**α. ευαίσθητα:** Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*), Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis*), Βέλιουρας (*Sorghum halepense*), Σετάρια (*Setaria* spp.), Βρόμος (*Bromus* spp.), Πάνικο (*Panicum dichotomiflorum*), Φάλαρη (*Phalaris* spp.), Λεπτόχλοα (*Leptochloa fascicularis*), Φεστούκα (*Festuca* spp.), Φυτά-εθελοντές σιταριού, κριθαριού και βρώμης, Άγρια είδη κριθαριού (*Hordeum* spp.) και βρώμης (*Avena* spp.)

**β. μετρίως ευαίσθητα:** Αλεπονουρά (*Alopecurus myosuroides*), Πολύανθη ήρα (*Lolium multiflorum*)

**2) Καταπολεμούμενα Ζιζάνια στη δόση των 400 κ.εκ./στρέμμα:**

**α. ευαίσθητα:** Κόκκινο ρύζι (*Oryza rufipogon*), **β. μετρίως ευαίσθητα:** Αγριάδα (*Cynodon dactylon*)

**3) Καταπολεμούμενα Ζιζάνια στη δόση των 500 κ.εκ./στρέμμα:**

**α. μετρίως ευαίσθητα:** Αγρόπυρο (*Agropyron repens*)

**4) Ρύζι: Οδηγίες Χρήσης:**

Γεμίστε με νερό τα «τηγάνια» μέχρι να φυτρώσει το κόκκινο ρύζι και άλλα ζιζάνια. Όταν τα ζιζάνια φυτρώσουν, αφαιρέστε το νερό, ώστε τα φύλλα τους να είναι εκτεθειμένα στο ψεκαστικό διάλυμα, και κάνετε εφαρμογή του DEVIN 10 EC.

Αφήστε να περάσουν τουλάχιστον 48 ώρες προτού ξαναγεμίσετε τα «τηγάνια» με νερό.

Προσοχή: Μεταξύ της εφαρμογής του προϊόντος και της σποράς πρέπει να μεσολαβεί ένα διάστημα τουλάχιστον 7-10 ημερών.

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Σε περίπτωση που οι γειτονικές καλλιέργειες είναι αγρωστώδεις και έχουν φυτρώσει κατά τον χρόνο εφαρμογής του DEVIN 10 EC, τηρήστε μια απόσταση ασφαλείας 1-5 μέτρων από αυτές.

Στις προτεινόμενες χρήσεις και δόσεις, το Focus 10 EC δεν έχει καμία αρνητική επίδραση στα μέρη του φυτού που αποτελούν πολλαπλασιαστικό υλικό. Στις πλώδεις καλλιέργειες που προορίζονται για την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού, το DEVIN 10 EC πρέπει να εφαρμόζεται πριν την αρχή της άνθισης.

**Διαχείριση ανθεκτικότητας**

Για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης ανθεκτικότητας, εναλλάσσετε ή συνδυάζετε το προϊόν με σκευάσματα με διαφορετικό τρόπο δράσης ή σκευάσματα που περιέχουν δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης. Επίσης, κάνετε προγράμματα αμειψισποράς των καλλιεργειών.

**7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:  
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα


Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, είναι δυνατή η φύτευση/σπορά όλων των δικοτυλήδων φυτών. Για τη φύτευση/σπορά αγρωστωδών καλλιεργειών πρέπει να περάσουν 4 εβδομάδες από την εφαρμογή του προϊόντος.

Όταν εφαρμόζονται προγράμματα αμειψισποράς, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός.

Μην εισέρχεστε στη ψεκασμένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από την φυλλική επιφάνεια.



9

<b>8</b> Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.	Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα, εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ετικέτα.
<b>9</b> Κατηγορία κινδύνου	 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
<b>10</b> Δηλώσεις επικινδυνότητας	H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

P102: Μακριά από παιδιά.  
 P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.  
 P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
 P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς.  
 P264: Πλύνετε με άφθονο νερό σαπουνι προσεκτικά μετά το χειρισμό. P271  
 Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.  
 P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.  
 P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα, μέσα  
 ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.  
 P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική  
 νομοθεσία.

Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση, κατά την συντήρηση  
 του ψεκαστικού μηχανήματος και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν κατάλληλο ρουχισμό εργασίας και γάντια  
 εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό.

P301 + P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ  
 ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

P302 + P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο  
 σαπουνι και νερό.

P304 + P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον  
 καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την  
 αναπνοή.

P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε  
 προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής,  
 αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P337+P313 Αν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός:

Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

P331 ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

P332+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος:  
 Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

P361 Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα.

SP1: Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

SPe2: Για να προστατέψετε τα υπόγεια νερά, μην εφαρμόζετε το προϊόν το  
 φθινόπωρο σε σπρώνες και σε χλοοτάπητα. Εφαρμόστε στην ελαιοκράμβη  
 μία φορά κάθε τρία χρόνια.

SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους να αφήσετε μια απέκαστη  
 ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη.

**12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:**

Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τον ρουχισμό. Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα. Εφόσον προκύψουν δυσκολίες ζητήστε ιατρική βοήθεια. Επιδείξτε το δοχείο, την ετικέτα και/ή το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στον ιατρό.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Διατηρείστε τον παθόντα ήρεμο και μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξεπλύνετε το στόμα και πιείτε άφθονο νερό. ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ ΕΜΕΤΟ. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Ποτέ μην προκαλείτε εμετό ή δίνετε οτιδήποτε από το στόμα εάν το θύμα δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο τρεχούμενο νερό, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**ΓΙΑΤΡΟΙ:** Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210- 77 93 777.**

**13 Προστασία των καταναλωτών**

**13.1** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Πατάτα, Φασόλι (ξηρό), Μπιζέλι (ξηρό), Φακές, Λούπινα, Ρεβίθια, Σόγια	56
Τομάτα, Μελιτζάνα, Λαχανάκια Βρυξελλών, Αμπέλι (επιτραπέζιο, οινοποιήσιμο, σταφίδα), Φυλλώδεις κράμβες (Κινέζικο λάχανο, Κόκκινο λάχανο), Φρέσκο κρεμμυδάκι, Πράσο.	42
Καρότο, Ραπανάκι	35
Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Φασόλια (φρέσκα με λοβό), Κρεμμύδι, Σκόρδο, Ασκαλώνιο, Σπανάκι, Λευκό Λάχανο, Αντράκλα, Αρωματικά φυτά	28
Πτεριά, Μαρούλι, Σκαρόλα, Λυκοτρίβολο, Κάρδαμο, Κόκκινο Σινάπι, Γαιοκάρδαμο	21
Βαμβάκι	Δεν ορίζεται

Παντζάρι, Σελινόριζα, Χρένο, Πασινάκη, Λαγόχορτο, Ελαιοκράμβη, Ζαχαρότευτλο, Κτηνοτροφικό τεύτλο, Γογγύλι, Ηλίανθος, Ρύζι.	Ορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας

- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, αποθηκευόμενο στην αρχική του κλειστή συσκευασία, μακριά από τρόφιμα και ζωοτροφές, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο

**15** Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16** Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο **Παράρτημα ΙΙΙ** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**B****Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ****Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**