



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (60.592 αντί 60.502)

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 26-02-2018  
Αριθ. πρωτ: 85/3177**

**Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150, 17671-ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 928 7211  
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr**

**Προς: Arysta LifeScience Benelux Sprl  
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας:  
Arysta LifeScience Ελλάς Α.Ε.,  
Ριζαρείου 16, 15233-Χαλάνδρι)**

**ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. 60.592 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SYLLIT 544 SC (δραστική ουσία: dodine) ως προς το φάσμα δράσης (χρήσεις ήσσονος σημασίας) και ως προς την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις»**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
4. Την αριθ. 10088/115732/26.9.13 Υπ. Απόφαση (Β' 2587) με θέμα "διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας".
5. Την αριθ. 1606/16641/14.02.17 (Β' 629) Υπ. Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
6. Τις με αριθ. πρωτ. 13329/130171/5.12.17 και 85/3177/8.1.18 σχετικές αιτήσεις της εταιρείας Arysta LifeScience Ελλάς Α.Ε., ως υπεύθυνη επικοινωνίας της εταιρείας Arysta LifeScience Benelux Sprl.
7. Το αριθ. ΕΜΠ 30/30.1.18 έγγραφο του ΜΦΙ (αριθμός πρωτοκόλλου ΥΠΑΑΤ 1149/17637/1.2.18).

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

- Α.** Τροποποιούμε τη με αριθ. **60.592** άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **SYLLIT 544 SC** (δραστική ουσία: dodine), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 10241/111556 π.ε./4.1.17 Απόφασή μας (Α.Δ.Α.: 6ΡΠΧ4653ΠΓ-4ΝΔ), ως προς το φάσμα δράσης (χρήσεις ήσσονος σημασίας) και ως προς την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις. Οι παράγραφοι 5 και 13.2 της αριθ. 10241/111556 π.ε./4.1.17 (Α.Δ.Α.: 6ΡΠΧ4653ΠΓ-4ΝΔ) Απόφασή μας, διαμορφώνονται ως ακολούθως:

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιερ. περίοδο/μεσοδ. εφαρμογών
		κ.εκ./στρ.	κ.εκ./ 100 λίτρα νερό	Όγκος ψεκ. υγρού (λτ. / στρ.)		
Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά, Μουσμουλιά, Κυδωνιά, Μεσπιλιά)	<b>Φουζικλάδιο</b> ( <i>Venturia inaequalis</i> , <i>V. pyrina</i> )	125	83-625	20-150	Από τη διόγκωση των οφθαλμών (πράσινη κορυφή - BBCH 01) ως 60 ημέρες πριν τη συγκομιδή.	2/ 7-10 ημέρες
Κερασιά, Βουσινιά	<b>Ανθράκωση</b> ( <i>Ariognomonina erythrostoma</i> , <i>Gnomonia erythrostoma</i> ), <b>Κυλινδροσπορίωση</b> ( <i>Blumeriella jaarii</i> , <i>Coccomyces hiemalis</i> )	125	83-250	50-150	Από την έναρξη της άνθισης (BBCH 60) ως την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των καρπών (BBCH 79) και/ή μετά τη συγκομιδή.	2/ 7-10 ημέρες
Ροδακινιά, Νεκταρινιά	<b>Εξώασκος</b> ( <i>Taphrina deformans</i> )	165	110-330	50-150	Από τη διόγκωση των οφθαλμών (BBCH 01) μέχρι την πτώση των πετάλων (BBCH 69) και/ή αργότερα από το 50% της πτώσης των φύλλων μέχρι και μετά την πτώση τους (φθινόπωρο).	2/ 7-10 ημέρες
Ελιά (επιτραπέζιες και ελαιοποιήσιμες ποικιλίες)	<b>Κυκλοκόνιο</b> ( <i>Cycloconium oleaginum</i> , <i>Spilocaea oleagina</i> ), <b>Γλοιοσπόριο</b> ( <i>Glomerella cingulata</i> , <i>Gloeosporium Olivarum</i> , <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> )	125-165	125-165	100	Από την έναρξη της ανάπτυξης των φύλλων (BBCH 11) μέχρι το τέλος της άνθησης (BBCH 69) και/ή το φθινόπωρο.	2/ 7 ημέρες
<b>ΧΡΗΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ</b>						
Καρυδιά [JUGRE]	<b>Ανθράκωση</b> ( <i>Marssonina juglandis</i> με ασκογενή μορφή <i>Gnomonia leptostyla</i> ) [GNOMLE]	125	83-250	50-150	Έως την έναρξη της άνθησης (BBCH 59).	2/ 7-10 ημέρες
Καστανιά [CSNSA]	<b>Ανθράκωση</b> ( <i>Mycosphaerella maculiformis</i> ) [MYCOMC]	125	83-250	50-150	Έως την έναρξη της άνθησης (BBCH 59).	2/ 7-10 ημέρες
Κελυφωτό φιστίκι [ARHHY]	<b>Σεπτόρια</b> ( <i>Septoria pistaciae</i> ) [SEPTPZ], <b>Βοτρυοσφαίρια</b> ( <i>Botryosphaeria</i> sp.) [BOTSSP] <b>Αλτερνάρια</b> ( <i>Alternaria</i> sp.) [ALTESP]	125	83-250	50-150	Έως την έναρξη της άνθησης (BBCH 59).	2/ 7-10 ημέρες
Αμυγδαλιά [PRNDU]	<b>Εξώασκος</b> ( <i>Taphrina deformans</i> ) [TAPHDE], <b>Κλαδοσπορίωση</b> ( <i>Venturia carpophila</i> συν. <i>Cladosporium carpophilum</i> ) [VENTCA], <b>Κορόνιο</b> ( <i>Wilsonomyces carpophilus</i> ) [STIGCA], <b>Πολυστιγμάτωση</b> ( <i>Polystigma ochraceum</i> ) [POLTOC]	165	110-330	50-150	Έως την έναρξη της άνθησης (BBCH 59).	2/ 7-10 ημέρες

**Παρατήρηση:** για τις ανωτέρω χρήσεις ήσσονος σημασίας (καρυδιά, καστανιά, κελυφωτό φιστίκι, αμυγδαλιά), δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

<b>Φυτικά προϊόντα</b>	<b>Ημέρες</b>
Μηλοειδή (μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά, μουσμουλιά και μεσπιλιά)	60
Κερασιά, Βυσσινιά	14
Ροδακινιά, Νεκταρινιά	75
Ελιά (επιτραπέζιες και ελαιοποιήσιμες ποικιλίες)	7
<b>Καρυδιά, Καστανιά, κελυφωτό φιστίκι, αμυγδαλιά</b>	<b>120</b>

Β. Απορρίπτουμε το αίτημα της ενδιαφερόμενης εταιρείας για διεύρυνση για διεύρυνση στην καλλιέργεια της δαμασκηνιάς, καθώς η δαμασκηνιά δεν θεωρείται ήσσονος σημασίας καλλιέργεια στη νότια ζώνη της ΕΕ.

Γ. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η αριθ. 10241/111556 π.ε./4.1.17 (Α.Δ.Α.: 6ΡΠΧ4653ΠΓ-4ΝΔ) Απόφασή μας.

**Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας**

**Γ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ**