



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 19-09-2018
Αριθ. πρωτ: 6957/93621

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
FAΧ: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Νίκος Παπανικολάου
Τηλέφωνο: 210 92 87230
e-mail: npapanikolaou@minagric.gr

Προς: FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ
Μαιάνδρου 15
11528 Αθήνα
E-mail: Evangelos.Diamantis@fmc.com

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) EXPLICIT 15 EC (indoxacarb 15% (β/ο))».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1511 της Επιτροπής της 30ής Αυγούστου 2017 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών 1-methylcyclopropene, beta-cyfluthrin, chlorothalonil, chlorotoluron, cypermethrin, daminozide, deltamethrin, dimethenamid-p, flufenacet, flurtamone, forchlorfenuron, fosthiazate, indoxacarb, iprodione, MCPA, MCPB, silthiofam, thiophanate-methyl και tribenuron.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1907/2006.
7. Την αξιολόγηση της αρμόδιας αρχής και την άδεια διάθεσης στην αγορά του όμοιου σκευάσματος EXPLICIT 15 EC στην Ισπανία (αριθ. έγκρισης: 25.466).
8. Την με αριθμό πρωτ. 1606/16641/14.02.2017 (ΦΕΚ 629/Β/01.03.2017) Απόφαση Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

9. Την με αριθ. πρωτ. 6957/93621/3-7-2018 αίτηση της εταιρείας FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν EXPLICIT 15 EC της εταιρείας FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

14675
19/09/2018
31/10/2019

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

EXPLICIT 15 EC

1.2.β Μορφή:

EC- Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο

1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία

Δραστική ουσία	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσιών/ών κατά ISO	Indoxacarb
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	min 90% (β/β)
Χημική ομάδα	Ομάδα οξαδιαζίνες
Παρασκευαστής	FMC international Switzerland Sarl, Quai de l'Île 13 CH 1204 Geneva Switzerland
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: FMC Corporation Mobile Manufacturing Center U.S. Highway 43 North, Axis Alabama 36505,USA
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ ΕΔΡΑ: Μαιάνδρου 15, 11528 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΑ: Λαγουμιτζή 24, 17671 Αθήνα ΤΗΛ.: 211 198 3903 FAX: +30 211 1097209 E-mail: Evangelos.Diamantis@fmc.com

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ

ΕΔΡΑ: Μαιάνδρου 15, 11528 Αθήνα
 ΓΡΑΦΕΙΑ: Λαγουμιτζή 24, 17671 Αθήνα
 ΤΗΛ.: 211 198 3903
 FAX: +30 211 1097209
 E-mail: Evangelos.Diamantis@fmc.com

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ

ΕΔΡΑ: Μαιάνδρου 15, 11528 Αθήνα
 ΓΡΑΦΕΙΑ: Λαγουμιτζή 24, 17671 Αθήνα
 ΤΗΛ.: 211 198 3903
 FAX: +30 211 1097209
 E-mail: Evangelos.Diamantis@fmc.com

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

FMC international Switzerland Sarl,
 Quai de l'Île 13
 CH 1204 Geneva
 Switzerland

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

DuPont de Nemours (France) S.A.S.

82 rue de Wittelsheim BP9
 F-68701 Cernay Cedex
 France

E.I. du Pont de Nemours and Co

Valdosta Manufacturing Center
 2509 Rocky Ford Road
 Valdosta, GA 31601
 USA.

Platte Chemical Company

P.O. Box 5156
 931 Platte Road
 Greenville, Mississippi 38701 USA

Helena Industries

434 Fenn Road
 Cordele, GA 31010, USA

Althaller Italia s.r.l. - Strada Com.le per
 Campagna 5, 20078 San Colombano al
 Lambro MI

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

DuPont de Nemours (France) S.A.S.

82 rue de Wittelsheim BP9
F-68701 Cernay Cedex
France

Helena Industries

434 Fenn Road
Cordele, GA 31010 , USA

Chemark Kft,

h-8182 Peremarton gyartelep,
Pf.31, Hungary

Althaller Italia s.r.l. - Strada Com.le per
Campagna 5, 20078 San Colombano al
Lambro MI

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: Indoxacarb 15% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 83% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2

Συσκευασία(ες)

Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	50 κ.εκ. - 5000 κ.εκ.	HDPE/EVOH (High Density Polyethylene with Ethylene Vinyl Alcohol layer)

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμοί φυλλώματος κατά προτίμηση νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ. Να αποφεύγεται ο διασκορπισμός του ψεκαστικού νέφους εκτός της ζώνης εφαρμογής και ιδιαίτερα πλησίον επιφανειακών υδάτων. Μειώστε τον κίνδυνο διασποράς ρυθμίζοντας τον εξοπλισμό να παράγει μεγαλύτερες σταγόνες ή χρησιμοποιώντας ακροφύσια χαμηλής διασποράς. Εφαρμόστε μόνο όταν οι επιβλαβείς πληθυσμοί εντόμων φθάσουν τα όρια οικονομικής ζημίας που καθορίζονται από τον αρμόδιο τεχνικό ή σύμβουλο της περιοχής σας. Πριν αποφασιστεί η εφαρμογή του προϊόντος, θα πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψιν οι πληθυσμοί των ωφέλιμων εντόμων. Μην εφαρμόζετε εάν η καλλιέργεια είναι σε κατάσταση στρες.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Χρησιμοποιείτε καθαρό ψεκαστικό. Μισογεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό. Προσθέστε σιγά-σιγά την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Απογεμίστε το βυτίο με νερό και διατηρήστε την ανάδευση έως την ολοκλήρωση της εφαρμογής. Πλύνετε τη συσκευασία και προσθέστε τα νερά της έκπλυσης στο βυτίο. Ολοκληρώστε την πλήρωση του δοχείου με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση. Χρησιμοποιήστε το ψεκαστικό υγρό το συντομότερο δυνατόν.

Καθαρισμός ψεκαστήρα:

Καθαρίστε σχολαστικά τον εξοπλισμό εφαρμογής αμέσως μετά την εφαρμογή του προϊόντος, για να μειώσετε την καθίζηση που θα δυσχεράνει τον επόμενο καθαρισμό. Αδειάστε τον εξοπλισμό. Ξεπλύνετε σχολαστικά το δοχείο του εξοπλισμού εφαρμογής, τη ράβδο και τους εύκαμπτους σωλήνες με καθαρό νερό. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα. Αφαιρέστε τα ακροφύσια και τα φίλτρα. Ξεπλύνετε ξανά όλα τα μέρη του εξοπλισμού με καθαρό νερό. Να φοράτε προστατευτική ενδυμασία κατά τη διάρκεια καθαρισμού. Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε πηγάδια, υδάτινες οδούς, καλλιεργούμενες γαίες και δένδρα. Τα νερά της έκπλυσης πρέπει να απορρίπτονται σε κατάλληλους χώρους.

Διαχείριση κενών συσκευασίας:

Ξεπλύνετε 3 φορές τα κενά υλικά συσκευασίας, ρίξτε τα νερά στο ψεκαστικό. Μην ξαναχρησιμοποιείτε τα κενά υλικά συσκευασίας για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Τρυπήστε ή κάψτε τα κενά υλικά συσκευασίας ή απομακρύνετε τα με άλλο τρόπο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Συνδιαστικότητα:

Το προϊόν δεν είναι συμβατό με σκευάσματα που έχουν αλκαλική αντίδραση.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση κύρια Λεπιδοπτέρων. Περιέχει indoxacarb που ανήκει στην ομάδα οξαδιαζινών. Δρα στο κεντρικό νευρικό σύστημα των εντόμων, και συγκεκριμένα στους διαύλους των ιόντων Na στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων των εντόμων. Μετά την εφαρμογή του τα έντομα σταματούν κάθε κίνηση και πρόσληψη τροφής. Τα ευαίσθητα έντομα θανατώνονται μέσα σε 24-60 ώρες από την εφαρμογή.
Έχει δράση σε όλα τα προνυμφικά στάδια των λεπιδοπτέρων αλλά και σε ακμαία ορισμένων ειδών. Παραμένει δραστικό και στις υψηλές θερμοκρασίες.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ/ στρέμμα	κ.εκ / 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Αμπέλι οينوποιήσιμο VITVI	Ευδεμίδα <i>Lobesia botrana</i> POLYBO		35	30-70	Ψεκασμός φυλλώματος από το στάδιο των 3 φύλλων έως την πλήρη ωρίμανση . Η έναρξη των ψεκασμών θα πρέπει να γίνεται κατά την εκκόλαψη των αυγών κάθε γενιάς. Η 1 ^η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται πριν ή μετά την ανθοφορία με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών. Για τον έλεγχο της 2ης και 3ης γενιάς, η 1 ^η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται από την αρχική εναπόθεση των αυγών και έως το πρώτο στάδιο του μαύρου κεφαλιού. Εάν οι πτήσεις των 2 γενιών εκτείνονται πάνω από 10 ημέρες, μπορείτε να πραγματοποιήσετε 2 εφαρμογές στη γενιά.	3 με μεσοδιάστημα 10-14 ημερών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Βιομηχανική Τομάτα LYPSS	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Τούτα <i>Tuta absoluta</i> GNORAB	25		50-100	Ψεκασμός φυλλώματος από το στάδιο των 3 φύλλων έως την πλήρη ωρίμανση. Η έναρξη των ψεκασμών θα πρέπει να γίνεται με την εμφάνιση των αυγών ή των νεαρών προνυμφών (η πιο αποτελεσματική εφαρμογή πραγματοποιείται κατά την εκκόλαψη), επαναλαμβάνοντας τις εφαρμογές ανάλογα με την ένταση της προσβολής	3 με μεσοδιάστημα 10-14 ημερών
Μπρόκολο BRSOK Λάχανο BRSOL - BRSOX Κουνουπίδι BRSOB	Πιερίδα <i>Pieris rapae</i> PIERRA Πλουτέλλα <i>Plutella xylostella</i> PLUTMA Σποντόπτερα <i>Spodoptera spp¹</i> SPODSP	17		30-70	Ψεκασμός φυλλώματος από το στάδιο των 3 φύλλων έως την πλήρη ωρίμανση. Η έναρξη των ψεκασμών θα πρέπει να γίνεται με την εμφάνιση των αυγών ή των νεαρών προνυμφών, επαναλαμβάνοντας τις εφαρμογές ανάλογα με ένταση της προσβολής.	3 με μεσοδιάστημα 10-14 ημερών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Βαμβάκι GOSHI	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR	25		50-100	Ψεκασμός φυλλώματος από το στάδιο των 9 φύλλων (BBCH 19) και έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 89). Η έναρξη των ψεκασμών θα πρέπει να γίνεται με την εμφάνιση των αυγών ή των νεαρών προνυμφών (η πιο αποτελεσματική εφαρμογή πραγματοποιείται κατά την εκκόλαψη), επαναλαμβάνοντας τις εφαρμογές ανάλογα με την ένταση της προσβολής	3 με μεσοδιάστημα 10-14 ημερών
------------------	--	----	--	--------	---	--------------------------------------

Παρατηρήσεις

1. Ειδικότερα, με την εμφάνιση της σποντόπτερας (*Spodoptera* spp.), συνιστάται η εναλλαγή με άλλο αποτελεσματικό εντομοκτόνο, με διαφορετικό τρόπο δράσης, όπως το Altacor® 35 WG.
2. Οι ψεκασμοί γίνονται με βάση την εμφάνιση των εντόμων και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή και όχι με το στάδιο της καλλιέργειας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
3. Οι ψεκασμοί να γίνονται σύμφωνα με τις κατά τόπους γεωργικές προειδοποιήσεις.
4. Μην εφαρμόζεται το σκεύασμα αν οι καλλιέργειες βρίσκονται σε κατάσταση στρες.
5. Ο ψεκασμός δεν χρειάζεται να επαναληφθεί αν ακολουθήσει βροχή μετά από 2 ώρες.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Διαχείριση ανθεκτικότητας,

Για την αποφυγή εμφάνισης ή πολλαπλασιασμού πληθυσμών εντόμων ανθεκτικών στο EXPLICIT® 15EC, όπως τα έντομα που αναφέρονται στην ετικέτα, συνιστάται να χρησιμοποιείτε το προϊόν στα πιο ευαίσθητα στάδια ανάπτυξης των εντόμων, εναλλάσσοντας το προϊόν με άλλα αποτελεσματικά εντομοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης ή με τη χρήση βιολογικών ή καλλιεργητικών μεθόδων που ελαχιστοποιούν τους πληθυσμούς επιβλαβών οργανισμών. Μη χρησιμοποιείτε εντομοκτόνο με τον ίδιο τρόπο δράσης σε δύο διαδοχικές γενιές του εντόμου. Εντομοκτόνο IRAC Group 22A.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
 - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις .

- 9** ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ



ΠΡΟΣΟΧΗ

- 10** ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα, νευρικό σύστημα και καρδιά) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.

H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

ΕUH401: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΕUH208: Περιέχει indoxacarb. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

11 ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P260: Μην αναπνέετε σταγονίδια.

P264: Πλύντε σχολαστικά προστατευτικές ενδυμασίες μετά το χειρισμό.

P501: Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σε σημεία συλλογής που προβλέπονται από το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης.

SP1: Μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

SPo 2: Ξεπλύνετε όλες τις προστατευτικές ενδυμασίες μετά τη χρήση.

SPo 5: Να αερίσετε πλήρως τους χώρους/τα θερμοκήπια όπου χρησιμοποιήθηκαν φυτοφάρμακα πριν ξαναμπίετε.

SPe 3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μία αφέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

Μην ψεκάζετε όταν οι μέλισσες είναι παρούσες.

Προστασία χειριστή:

Για όλες τις εγκεκριμένες χρήσεις, να φοράτε γάντια χημικής προστασίας κατά τη διάρκεια της ανάμειξης / πλήρωσης.

Για όλες τις εγκεκριμένες χρήσεις με χειροκίνητο ψεκασμό, να φοράτε γάντια και ενδυμασία χημικής προστασίας (τύπου 3 ή 4, σύμφωνα με το πρότυπο UNE-EN14605: 2005 + A1: 2009) και κατάλληλα υποδήματα, κατά την εφαρμογή, τον καθαρισμό και τη συντήρηση του εξοπλισμού.

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής με τρακτέρ που διαθέτει κουβούκλιο και συσκευή φιλτραρίσματος του αέρα, μπορείτε να παραλείψετε τον προστατευτικό εξοπλισμό, υπό την προϋπόθεση ότι τα παράθυρα θα είναι κλειστά. Αποφύγετε την επαφή με υγρό φύλλωμα κατά τη διάρκεια του ψεκασμού.

Προστασία εργαζόμενου:

Για εγκεκριμένες χρήσεις, εκτός του βαμβακιού, να χρησιμοποιείτε γάντια χημικής προστασίας για εργασίες που διαρκούν πάνω από 2 ώρες.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

P314: Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Η δηλητηρίαση μπορεί να προκαλέσει:

Νευροτοξικότητα και ερεθισμό των ματιών, του δέρματος και των βλεννογόνων.

Απομακρύνετε το άτομο από τη μολυσμένη ζώνη. Αφαιρέστε τα λερωμένα ή πιτσιλισμένα ρούχα.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ξεπλύνετε με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15-20 λεπτά. Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε τους φακούς επαφής. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι, χωρίς τρίψιμο.

Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό και μη χορηγήσετε τίποτα από το στόμα. Διατηρήστε τον ασθενή σε ανάπαυση. Διατηρήστε τη θερμοκρασία του σώματος. Παρακολουθείτε την αναπνοή. Εάν χρειαστεί, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Εάν το άτομο χάσει τις αισθήσεις του, ξαπλώστε το στο πλάι με το κεφάλι χαμηλότερα από το υπόλοιπο σώμα και τα γόνατα μισολυγισμένα. Μεταφέρετε το άτομο που έχει υποστεί δηλητηρίαση σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα και δείξτε την ετικέτα ή τη συσκευασία, εάν είναι δυνατόν. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ.

Συμβουλές προς τους ιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό:

Σε περίπτωση κατάποσης συνιστάται καθαρισμός του πεπτικού συστήματος, ανάλογα με την κατάσταση συνείδησης. Συμπτωματική θεραπεία.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΕΑΝ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΤΕ ΑΔΙΑΘΕΣΙΑ, ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ή ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ. Σε κάθε περίπτωση πάρτε μαζί σας τη συσκευασία ή την ετικέτα.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

13**Προστασία των καταναλωτών**

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αμπέλι οινοποιήσιμο	10
Βιομηχανική τομάτα	1
Μπρόκολο, κουνουπίδι, λάχανο	3
Βαμβάκι	14

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Στην αρχική απαράβιαστη συσκευασία του και σε κανονικές συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευόμενων μελετών

Στο Παράρτημα ΙΙΙ καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

B

Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ