



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 02-03-2004

Αριθ. πρωτ.: 97451

Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 3-5
Ταχ. Κώδικας: 101 64 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 36 17 103
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 212 45 08

ΠΡΟΣ: 1. ΙΝΑΓΚΡΟ Ε.Π.Ε.
Καπετάν Μητρούση 4
546 46 – Θεσσαλονίκη
(με απόδειξη)
2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
α) Διευθύνσεις Γεωργίας
Έδρες τους
β) Διευθύνσεις Εμπορίου
Έδρες τους
3. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου
Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής έγκρισης
κυκλοφορίας στο φυτοπροστα-
τευτικό προϊόν (εντομοκτόνο)
PARAFFINIC OIL 80% EC -
ΙΝΑΓΚΡΟ ”

ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 (ΦΕΚ 298/Α/77) «για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα τα άρθρα 2 (παρ. 2) και 5 (παρ. 2 και 8).
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ 674/Β/13.9.88) Απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» Κεφ. Β., παρ. 1.
3. Τη με αριθ. 83346/28.7.86 (ΦΕΚ 599/Β/24.8.88) Απόφασή μας όσον αφορά τον «καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», καθώς και το με αριθ. 115/97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.97) Προεδρικό Διάταγμα.
4. Τη με αριθ. 104424/14.9.2000 Απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 1881 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο όμοιας σύνθεσης φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) AGRUMIN.
5. Τη με αριθ. 399580/30.10.2001 (ΦΕΚ 1479/Β/31.10.2001) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για “Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη”.
6. Τις σχετικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 22-12-2003 πρωτόκολλο πληρότητας του σχετικού φακέλου.

Αποφασίζουμε

- I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **14038** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** PARAFFINIC OIL 80% EC-ΙΝΑΓΚΡΟ (ΘΕΡΙΝΟΣ ΠΟΛΤΟΣ)
2. **Μορφή:** Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** paraffin oil 80% β/β (μη θειωνούμενο υπόλειμμα min 92%)
βοηθητικές ουσίες: 20% β/β
ειδικό βάρος: 0.868
4. **Καθαρότητα technical από το οποίο παρασκευάζεται:** 100%
5. **Παρασκευαστής:** ΙΝΑΓΚΡΟ Ε.Π.Ε., Καπετάν Μητρούση 4, 546 46 – Θεσσαλονίκη.
6. **Αντιπρόσωπος:** ----
7. **Τυποποιητής:** AGROTECHNICA- ΟΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ., ΤΘ 112, 570 22-Σίνδος.
8. **Συσκευαστής:** AGROTECHNICA- ΟΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ., ΤΘ 112, 570 22-Σίνδος.
9. **Συσκευασία: 9α. Είδος-Μέγεθος:** -Φιάλες των 100, 250, 500, 800 και 1.000 κ.εκ.
-Δοχεία των 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 17, 20 και 25 λίτρων.
9β. Υλικό: -Πλαστικές φιάλες τύπου COEX (τριών στρώσεων) εντός χαρτοκυτίου.
-Πλαστικά μπιτόνια από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο ομοιόμορφου πάχους, μη αναγεννημένου, τα οποία σφραγίζονται με θερμοκόλληση με ένα φύλλο αλουμινίου και πλαστικό πόμα. Τα μπιτόνια φέρονται σε χαρτοκιβώτια ανά δύο.

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:

Θερινός πολτός κατά κοκκοειδών, αυγών ακάρεων, αφίδων και λεπιδοπτέρων.

- 11. Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος (μέχρι απορροής) με ψεκαστήρες κοινού όγκου (5-6 atm) ή μηχανοκίνητους (25-30 atm) και μπεκ τύπου σκούπας.

12. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

- Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση
- Αραιώνουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού ανακατεύοντας μέχρι να γίνει ομοιόμορφο γαλάκτωμα και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας.
- Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού.
- Σε περίπτωση που πρέπει να προστεθούν άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, αυτό γίνεται αφού πρώτα το γαλάκτωμα του ορυκτελαίου αναδευτεί καλά.
- Σε περίπτωση που το αναμειζουμε με βρέξιμη σκόνη, ετοιμάζουμε πρώτα το αραιωμένο γαλάκτωμα ορυκτελαίου και μετά προσθέτουμε την ήδη διαλυμένη σε νερό βρέξιμη σκόνη.

13. Φάσμα δράσης:

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ (κιλά/100 lt νερό)	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Λεμονιά, πορτοκαλιά, νερατζιά.	-Κοκκοειδή -Αφίδες -Αλευρώδης -Ακάρεα	1,5	Ψεκασμοί την άνοιξη ή το καλοκαίρι.
ΜΗΛΙΑ	-Κοκκοειδή -Αφίδες -Αυγά και προνύμφες λεπιδοπτέρων -Ακάρεα -Λοιπά διαχειμάζοντα έντομα	α) 2,5-3 β) 1,5	α) Χειμερινοί ψεκασμοί (κατά το λήθαργο με κλειστά ή μέχρι να φουσκώσουν τα μάτια). β) Ανοιξιάτικοι και καλοκαιρινοί ψεκασμοί.

ΑΧΛΑΔΙΑ	-Κοκκοειδή -Αφίδες -Αυγά και προνύμφες λεπιδοπτέρων -Ψύλλα αχλαδιάς -Ακάρεα -Λοιπά διαχειμάζοντα έντομα	α) 2,5-3 β) 1,5	α) Χειμερινοί ψεκασμοί (με κλειστά ή μέχρι να φου- σκώσουν τα μάτια). β) Ανοιξιάτικοι ή καλοκαιρινοί ψεκασμοί.
ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ	-Κοκκοειδή -Αφίδες -Αυγά και προνύμφες λεπιδοπτέρων -Ακάρεα -Λοιπά διαχειμάζοντα έντομα	2,5-3	Χειμερινοί ψεκασμοί (κατά το λήθαργο με κλειστά ή μέχρι να φουσκώσουν τα μάτια).
ΚΕΡΑΣΙΑ	-Κοκκοειδή -Αφίδες -Αυγά και προνύμφες λεπιδοπτέρων -Ακάρεα -Λοιπά διαχειμάζοντα έντομα	α) 2,5-3 β) 1,5	α) Χειμερινοί ψεκασμοί (κατά το λήθαργο με κλει- στά ή μέχρι να φουσκώ- σουν τα μάτια). β) Ανοιξιάτικοι και καλοκαι- ρινοί ψεκασμοί.
ΕΛΙΑ	-Κοκκοειδή -Ακάρεα	1-1,5	Εφαρμόζεται την κατάλληλη εποχή.
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ	-Κοκκοειδή	1	Εφαρμόζεται όταν εμφανιστεί προσβολή
Σαν προσκολλητικό με εντομοκτόνα		200-300 γραμ. / 100 λίτρα νερό	Εφαρμόζεται ο χρόνος εφαρ- μογής του εντομοκτόνου με το οποίο συνδυάζεται.

Παρατηρήσεις:

1. Να μην γίνονται ψεκασμοί όταν υπάρχει παγετός και σε περιόδους ξηρασίας και υπερβολικής υγρασίας.
2. Χρησιμοποιούνται στο στρέμμα: 100-200 λίτρα ψεκαστικού υγρού (στα οπωροφόρα δένδρα) και 50-80 λίτρα (στα καλλωπιστικά φυτά).

14. Φυτοτοξικότητα: -Μετά την εφαρμογή του σκευάσματος και για 14-21 ημέρες, να μην επακολουθούν ψεκασμοί με θείο, πολυθειούχα και βορδ. πολτό.

-Να μην εφαρμόζεται επί 60 ημέρες μετά ή 90 ημέρες πριν από εφαρμογές σκευασμάτων που περιέχουν ως δρων συστατικό captan ή folpet.

-Να μην συνδυάζεται με δινιτροενώσεις, carbaryl, dimethoate.

15. Συνδυαστικότητα:

-Συνδυάζεται με τα περισσότερα εγκεκριμένα εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα.

-Δεν συνδυάζεται με ισχυρώς αλκαλικά σκευάσματα (πολυθειούχα, βορδ. πολτός) και με τα ακόλουθα: θείο, δινιτροενώσεις, carbaryl, captan, folpet, dinocap, morestan, dimethoate και tenn-cop.

16. Σήμανση τοξικότητας: Xn - Επικίνδυνο.

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

R20/21/22 Βλαβερό όταν εισπνέετε, σε επαφή με το δέρμα και σε περιπτώσεις κατάποσης.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R & RO φράσεις):

RO4/RO7 Πολύ τοξικό για τα ψάρια και γενικά για τους υδρόβιους οργανισμούς.

R53 Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

S1/2 -Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

S13 -Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S23 -Μην εισπνέετε το ψεκαστικό υγρό.

S26 -Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύντε αμέσως με άφθονο νερό.

S27 -Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό.

S28 -Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

S35 -Καταστρέψτε τα κενά μέσα συσκευασίας. Η χρήση τους για κάθε σκοπό είναι επικίνδυνη.

SY1/4 -Φοράτε ελαστικά γάντια και προστατευτικά γυαλιά όταν χειρίζεστε ή εφαρμόζετε το σκεύασμα.

SY8 -Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

SY10 -Μην αυξάνετε τις δόσεις.

SY11 -Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του.

20. Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύντε αμέσως με άφθονο νερό. Εάν μετά το πλύσιμο ο ερεθισμός επιμένει, ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Αν υπάρχει αναπνευστικό πρόβλημα: ο παθών να μεταφερθεί σε καθαρό αέρα.

Αντίδοτο: Συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77 93 777.

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

(SO3) Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Αποφεύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

(Π1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: **20 ημέρες.**

Σε περίπτωση αναμίξεως με άλλο σκεύασμα οφείλουμε να τηρούμε την “τελευταία επέμβαση” του άλλου σκευάσματος (αν αυτή είναι πάνω από 20 ημέρες).

24. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης :

Στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο περιβάλλον. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

II. Κείμενο ετικέτας:

α. Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 22 (παρ. 1) του Ν. 721/77 και με την παρούσα Απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **31-12-2008**.

β. Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ε. ΑΡΓΥΡΗΣ