



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας : 176 71 – Αθήνα  
Πληροφορίες : Α. Φονταρά  
Τηλέφωνο : 210 92 87 227  
FAX : 210 92 12 090

**ΘΕΜΑ:** “Διεύρυνση του φάσματος δράσης  
της οριστικής έγκρισης του  
φυτοπροστατευτικού προϊόντος,  
(μυκητοκτόνο), NIMROD 25 EC  
και τροποποίησή της, ως προς την  
ημερομηνία λήξης.”

Αθήνα 29-12-2008

Αριθ. πρωτ: 126247

**ΠΡΟΣ:** ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ  
Εθνικής Αντιστάσεως 73,  
152 31- Χαλάνδρι  
(με απόδειξη)

**ΚΟΙΝ.:** 1) Γραφείο κ. Υπουργού  
2) Γραφείο Γ. Γρ. κ. Κ. Σκιαδά  
3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
Ινστιτούτο, Τμήμα Ελέγχου  
Γεωργικών Φαρμάκων  
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά  
4) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.  
Έδρες τους  
5) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  
Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης  
(με e-mail), Έδρες τους  
6) Τμήματα Β, Γ & Ε της Δ/σής μας  
7) Γραμματεία της Δ/σής μας

#### ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) για “την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί” και ειδικότερα το άρθρο 4 (παρ. 6) και το άρθρο 8, (παρ. 2 και 3).
2. Τη με αριθ. 85418/24-8-88 ( ΦΕΚ 674/Β/13-9-88 ) απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων» Κεφ. Β., παρ. 7.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 ( ΦΕΚ 599/Β/24-8-88 ) απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», όπως ισχύει σήμερα.
4. Τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-2002) ΚΥΑ με θέμα την «ταξινόμηση, συσκευασία και επίσημανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων», καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β'/8-8-2003) απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
5. Τη με αριθ. 2008/934/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής της 5<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2008, που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Ι333/11-14/11.12.2008 της επίσημης εφημερίδας της Ε.Ε., σχετικά με τη μη καταχώριση ορισμένων δραστικών ουσιών στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν αυτές τις ουσίες.

6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 149/2008 της Επιτροπής της 29-1-2008 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση των παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV για τον καθορισμό ανώτατων ορίων καταλοίπων στα προϊόντα που καλύπτονται από το παράρτημα Ι του κανονισμού».
7. Τη γνωμοδότηση για το 13<sup>ο</sup> θέμα της 15<sup>ης</sup> /18-12-2008 Συνεδρίασης του Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ.
8. Το Π.Δ. 206/2007 / (ΦΕΚ 232/Α/19-9-2007) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Τη με αριθ. 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β/18-1-2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με “Εντολή Υπουργού”».
10. Τις από 29-06-2004, 4-9-08 και 4-11-08 αιτήσεις της εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ, καθώς και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα εξέτασης του σχετικού φακέλου.

## Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

**Ι. Διευρύνουμε** τη με αριθ. **6087** οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο), **NIMROD 25 EC (δ.ο. bupirimate 25 % β/ο)** της παρασκευάστριας εταιρείας **ΜΑΚΗΤΕSHIM CHEMICAL WORKS LTD**, Ισραήλ, η οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία **ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ** με τη με αριθ. 178598/6558/17-7-1980 απόφασή μας όπως ισχύει σήμερα, (ανανεώθηκε με τη με αριθ. 116724/24-7-2007 απόφασή μας και τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 119590/17-6-2008 απόφασή μας), **ως προς το φάσμα δράσης** (σημείο 13 της Υ.Α.), το οποίο διαμορφώνεται ως ακολούθως:

### 13. Φάσμα δράσης:

Καλλιέργειες	Ασθένειες	Δόσεις (κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού)	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στ ρ.)	Δόσεις (κ.εκ./στρ.)	Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ/κή περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών
Μηλιά	Ωίδιο ( <i>Podosphaera leucotricha</i> )	40 - 60	100-150	60	Από το στάδιο της πράσινης κορυφής.	3/14
Βερικοκιά	Ωίδιο ( <i>Podosphaera oxycanthae</i> )	30 - 60	100-150	90	Από την πτώση των πετάλων ή μόλις εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα της ασθένειας.	3/14
Ροδακινιά	Ωίδιο ( <i>Sphaerotheca pannosa</i> )	30 - 60	100-150	90	Από την πτώση των πετάλων ή μόλις εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα της ασθένειας.	3/14
Αμπέλι	Ωίδιο ( <i>Uncinula necator</i> )	150-180	80-100	120-180	Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας και με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.	4/10-14
Φράουλα	Ωίδιο ( <i>Sphaerotheca macularis</i> )	120-150	50-70	60-105	Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας και με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.	4/10

Τομάτα (Y+Θ)	Ωίδιο ( <i>Leveillula taurica</i> )	200-250	50-100	100-250	Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας και με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.	3/10
Πιπεριά (Y+Θ)	Ωίδιο ( <i>Leveillula taurica</i> )	200-300	50-100	100-300	Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας και με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.	2/10
Αγγούρι (Y+Θ)	Ωίδιο ( <i>Erysiphe cichoracearum, Leveillula taurica Sphaerotheca fuliginea</i> )	100-120	50-100	50-120	Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας και με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.	4/10
Κολοκύθι (Y+Θ)	Ωίδιο ( <i>Erysiphe cichoracearum, Leveillula taurica Sphaerotheca fuliginea</i> )	100-150	50-100	50-150	Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας και με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.	4/10
Τριανταφυλλιά	Ωίδιο ( <i>Sphaerotheca pannosa</i> )	120 - 200 (προστατευ- τικά)	50	100	Προστατευτική εφαρμογή	3/14
		200 - 300 (θεραπευτικ- ά) + 40 κ.εκ. προσκολλη- τικό AGRAL 90	50	150	Θεραπευτικά	

#### Παρατηρήσεις :

- Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής.
- Ο όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα είναι ανάλογος του σταδίου ανάπτυξης κάθε καλλιέργειας.
- Στη Μηλιά, η δόση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τα 60 κ.εκ./στρ. και στη Βερικοκιά και Ροδακινιά τα 90 κ.εκ./στρ.
- Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές που εφαρμόζονται.
- Για διαχείριση φαινομένων ανθεκτικότητας οι επεμβάσεις με το σκεύασμα πρέπει να γίνονται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα που ανήκουν σε ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης από τις αμινοπυριμιδίνες.

#### **14. Φυτοτοξικότητα:**

Δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες που αναφέρονται στην ετικέτα του προϊόντος όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, κάτω από τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

#### **15. Συνδυαστικότητα:**

Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα που έχουν ισχυρή αλκαλική αντίδραση.

**16. Σημάνσεις:** Χη-Επιβλαβές, Ν-Επικίνδυνο για το περιβάλλον

**17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):**

- R10** Εύφλεκτο  
**R38** Ερεθίζει το δέρμα  
**R65** Επιβλαβές: Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.  
“Περιέχει bupirimate. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση”

**18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R & RO φράσεις):**

- R51/53** Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

**19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S & SY φράσεις):**

- S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από τα παιδιά.  
**S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.  
**S20/21** Μην τρώτε, μην πίνετε και μη καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.  
**S36/37/39** Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.  
**SY8** Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

**Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**

**21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (S & SO φράσεις):**

- S60** Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.  
**S61** Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

**23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):**

- (Π1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:  
μηλιά, βερικοκιά, ροδακινιά: 21 ημέρες  
αμπέλι: 14 ημέρες  
φράουλα: 3 ημέρες  
τομάτα (υ+θ): 3 ημέρες  
πιπεριά (υ+θ): 3 ημέρες  
αγγούρι υπαίθρου: 3 ημέρες  
αγγούρι θερμοκηπίου: 1 ημέρα  
κολοκύθι υπαίθρου: 3 ημέρες  
κολοκύθι θερμοκηπίου: 1 ημέρα

Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)	Προϊόντα	MRLs (mg/kg)
<b>bupirimate</b>	Έχουν καθοριστεί Ευρωπαϊκά MRLs στον Κανονισμό 396/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008	

**II. Ετικέτα:**

- α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97), τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-2002) ΚΥΑ και με την παρούσα Απόφαση.  
**β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2010.**

**β. Η αποθήκευση, διάθεση στην αγορά και χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων του ανωτέρω φυτοπροστατευτικού προϊόντος, από πρόσωπα διάφορα του κατόχου της έγκρισης, επιτρέπεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011.**

**IV. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 116724/24-7-2007 απόφασή μας.**

**Ε. Υ.**

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ**

