



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Τ.Κ.: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α. Φονταρά
Τηλέφωνο: 210 928 7227
FAX: 210 92 12 090**

**ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής έγκρισης
στο φυτοπροστατευτικό προϊόν
(μυκητοκτόνο), ΑΤΕΜΙ 10WG”**

Αθήνα, 28-1-2008

Αριθ. Πρωτ: 115673

**ΠΡΟΣ: Syngenta Hellas ΑΕΒΕ
Λεωφόρος Ανθούσας
153 49 – Ανθούσα - Αττικής
(με απόδειξη)**

**ΚΟΙΝ.: 1) Γραφείο κ. Υπουργού
2) Γραφείο Γ. Γρ. κ. Κ. Σκιαδά
3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου
Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά
4) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους
5) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Δ/σεις Αγροτικής Ανάπτυξης
(με e-mail), Έδρες τους
6) Τμήματα Β, Γ & Ε της Δ/σής μας
7) Γραμματεία της Δ/σής μας**

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) για “την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί” και ειδικότερα το άρθρο 8 (παρ. 2 και 3) και το άρθρο 9 (παρ. 1)
2. Τη με αριθ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ674/Β/13-9-88) απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» Κεφ Β. παρ.1.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων» όπως ισχύει σήμερα.
4. Τη με αριθ. 265/2002/ 3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β’/19.9.2002) ΚΥΑ με θέμα την “ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων”, καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β’/8-8-2003) απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
5. Τη με αριθ. 68644/9-3-1994 απόφασή μας, όπως ισχύει σήμερα, με την οποία χορηγήθηκε η με

αριθμό 6597 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο σκεύασμα CADDY 10 WG, το οποίο περιέχει την ίδια δραστική ουσία, στην ίδια περιεκτικότητα και την ίδια μορφή με το αιτούμενο σκεύασμα, καθώς και το Αρ. Πρωτ.: ΕΜΠ 772/22-11-2007 έγγραφο του Μ.Φ.Ι.

6. Το με αριθ. 123951/14-6-2005 έγγραφό μας στο οποίο αναφέρονται τα εθνικά ανώτατα όρια υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας cyproconazole.
7. Το Π.Δ. 206/2007 / (ΦΕΚ 232/Α/19-9-2007) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Τη με αριθ. 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β/18-1-2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με “Έντολή Υπουργού”».
9. Τις από 26/3/2006 και 9/10/2007 αιτήσεις, της εταιρείας Syngenta Hellas AEBE καθώς και το από 9-10-2007 πρωτόκολλο εξέτασης του σχετικού φακέλου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά με αριθμό **60.156** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο), με τα ακόλουθα στοιχεία:

- 1. Εμπορικό όνομα:** ATEMI 10 WG
- 2. Μορφή:** Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
- 3. Εγγυημένη σύνθεση:** cyproconazole 10% β/β
βοηθητικές ουσίες 89,4 % β/β
- 4. Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 94% min.
- 5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** Syngenta Crop Protection AG , Ελβετία
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Saltigo GmbH (η Δ/ση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στη Δ/ση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής και είναι εμπιστευτική).
- 6. α. Κάτοχος της έγκρισης:** Syngenta Hellas AEBE, Λεωφόρος Ανθούσας, 153 49, Ανθούσα - Αττικής.
γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: Syngenta Hellas AEBE, Λεωφόρος Ανθούσας, 153 49, Ανθούσα - Αττικής.
- 7.α. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Syngenta Crop Protection AG, Ελβετία
β. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: KWIZDA Agro GmbH, Αυστρία (η Δ/ση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στη Δ/ση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής και είναι εμπιστευτική).
- 8. Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:**
 - Syngenta Hellas AEBE, Οινόφυτα Βοιωτίας, για τις συσκευασίες μεγέθους: 15 γρ., 30 γρ., 50 γρ., και 75 γρ.
 - KWIZDA Agro GmbH, Αυστρία για τις συσκευασίες μεγέθους: 100 γρ., 150 γρ., 200 γρ., 250 γρ., 300 γρ., 600 γρ. και 1 κιλού
- 9. Συσκευασία: 9α.Είδος-Μέγεθος :** Βαζάκια ή μπουκάλια 15 γρ., 30 γρ., 50 γρ., 75 γρ., 100 γρ., 150 γρ., 200 γρ., 250 γρ., 300 γρ., 600 γρ. και 1 κιλού
9β.Υλικό : Βαζάκια PE, μπουκάλια PE ή HDPE.
- 10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:**
Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs (υποομάδα τριαζολών) με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση.
- 11. Τρόπος εφαρμογής:**
Ψεκασμοί φυλλώματος.
- 12. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:**
Γεμίστε το 1/3 του δοχείου του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό.
Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο νερό αναδεύοντας και συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

13. Φάσμα δράσης:

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΟΣΕΙΣ γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρό	ΟΓΚΟΣ ΨΕΚ. ΥΓΡΟΥ λίτρα/στρ	Μέγιστη ποσότητα σκευάσμα τος γρ./στρ.	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/τική περίοδο	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Μηλιά	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i>)	10-15	100-200	30	4	Από το στάδιο της πράσινης κορυφής και εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Στις περιοχές που εφαρμόζεται σύστημα γεωργικών προειδοποιήσεων, να ακολουθούνται οι σχετικές συστάσεις των Περιφερειακών Κέντρων Προστασίας Φυτών.
Ροδακινιά	Φαιά σήψη <i>Sclerotinia laxa</i>)	10-15	150-250	37,5	3	Στην έκπτυξη των οφθαλμών, στη ρόδινη κορυφή και στην πλήρη άνθηση.
Αμπέλι	Ωϊδίο (<i>Uncinula necator</i>)	10-15	50-150	22,5	4	-Όταν οι βλαστοί αποκτήσουν 3-4 φύλλα -άνθηση -λίγο μετά το δέσιμο των ραγών.
Σπαράγγι	Σκωρίαση (<i>Puccinia asparagi</i>)	20-30	100	30	6	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Μεσοδιάστημα επεμβά- σεων 15 ημέρες.

Παρατηρήσεις :

Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής.

Προσοχή

Για διαχείριση φαινομένων ανθεκτικότητας:

- Οι επεμβάσεις με το σκευάσμα, πρέπει να γίνονται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης που δεν ανήκουν στην ομάδα των DMIs και δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με αυτή.
- Χρήση μόνο της εγκεκριμένης δοσολογίας.
- Ορθή εφαρμογή ψεκασμών.

14. Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και τις συνιστώμενες δόσεις.

15. Συνδυαστικότητα: --

16. Σημάνσεις Τοξικότητας: Χn, Επιβλαβές– N, Επικίνδυνο για το περιβάλλον

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

R63 Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R & RO φράσεις):

R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

RO3 Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S & SY φράσεις):

- S1/2** Να φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
S13 Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S20/21 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.
S35 Το προϊόν και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο.
S57 Να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο περιβάλλον για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.
S36/37 Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια.
SY8 Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκάσμο.
 Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση στο σκεύασμα.
SY9 Να μη χρησιμοποιείται από έγκυες γυναίκες ή παρουσία εγκύων γυναικών.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

20. Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

- Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλείτε εμετό και καλέστε αμέσως γιατρό.
 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε τα αμέσως με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά και συμβουλευθείτε γιατρό.
 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλυθείτε με νερό και σαπούνι.
 Σε περίπτωση εισπνοής απομακρύνετε τον παθόντα από την επικίνδυνη περιοχή.
 Εάν δεν αναπνέει σωστά εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή και καλέστε γιατρό.
 Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (S & SO φράσεις) :

- S61** Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
SO4 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις) :

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις) :

(Π1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή :

- Μηλιά: 90 ημέρες
 Ροδακινιά: 21 ημέρες
 Αμπέλι: 28 ημέρες
 Σπανάκι: 90 ημέρες

24. Χρονική σταθερότητα του σκεύασματος – Συνθήκες αποθήκευσης :

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97), τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-2002) ΚΥΑ και με την παρούσα Απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

ΠΙ. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2012.

β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσής της.

Ε.Υ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



Κ. ΣΚΙΑΛΑΣ