



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 23 - 1 - 2008
 Αριθ. πρωτ: 114796

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
 Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
 TELEFAX: 210 92 12 090
 Πληροφορίες: Η. Κιούλος
 Τηλέφωνο: 210 92 87 254
 e-mail: syg040@minagric.gr

Προς: Syngenta ΕΛΛΑΣ
 Α.Ε.Β.Ε.
 Λ.Ανθούσας
 15349 – Ανθούσα, Αττική
 (με απόδειξη)

- Κοιν.:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
 2. Γραφείο Γ.Γ. κ. Κ. Σκιαδά
 3. Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις
 Δ/σεις Γεωργίας (με e-mail)
Έδρες τους
 4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
 Ινστιτούτο
 Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
 Φαρμάκων
 Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά
 5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους
 6. ΕΣΥΦ
 Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα
 7. Εσωτερική διανομή:
 -Τμήματα Β', Γ' & Ε' της
 Δ/σής μας
 -Γραμματεία της Δ/σής μας
 8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
 Διδότου 26, Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο)
Acylon Gold Combi 45 WG»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως έχει συμπληρωθεί και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ.1 αυτού.
2. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Απόφαση του Υπ. Γεωργίας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», όπως ισχύει σήμερα και τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.
3. Την Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθ. 119119/19-7-2004 (ΦΕΚ 1177/Β/2-8-2004) για την «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 115/1997, Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Α' 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2003/82/ΕΚ της Επιτροπής».
4. Την ΚΥΑ 116077/9-2-2007 (ΦΕΚ 243/Β/26-2-2007) των Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας για τα «Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων επί και εντός προϊόντων φυτικής προέλευσης», σε εναρμόνιση προς την οδηγία 2006/92/ΕΚ της Επιτροπής για την δ.ο. folpet.
5. Την ΚΥΑ 125170/22-07-2005 (ΦΕΚ 1093/Β/2-8-2005) των Υπ. Οικονομίας & Οικονομικών και Γεωργίας για τα «Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων Φυτοφαρμάκων επί και εντός προϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης», σε εναρμόνιση προς την οδηγία 2004/115/ΕΚ της Επιτροπής, για την δ.ο. metalaxyl-m.
6. Την ΚΥΑ 101382/27-5-2003 (ΦΕΚ 736/Β/10-6-2003) των Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας, με την οποία καταχωρήθηκε στο Παράρτημα Ι του ΠΔ 115/1997 η δραστική ουσία metalaxyl-m.
7. Την ΚΥΑ 121796/7-9-2007 (ΦΕΚ 1880/Β/14-9-2007) Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας, με την οποία καταχωρήθηκε στο Παράρτημα Ι του ΠΔ 115/1997 η δραστική ουσία folpet.
8. Τη γνωμοδότηση του **Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ.** για το 2^ο θέμα της 8^{ης}/2007 Συνεδρίασης του.
9. Το Π.Δ. 206/2007, Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών, (ΦΕΚ 232^Α/19.9.2007).
10. Τη με αριθ.263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47Β'/18.1.2008) απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με “Έντολή Υπουργού”».
11. Τις από 5-8-2003 και 27-9-2007 αιτήσεις της εταιρείας Syngenta Hellas A.E.B.E..

Αποφασίζουμε

A Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά σύμφωνα με το ΠΔ 115/97, άρθρο 4 παρ. 1, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **Acylon Gold Combi 45 WG** της εταιρείας Syngenta Hellas A.E.B.E. με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

60149

23/1/2008

30/9/2011

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

1.2.β Μορφή:

Acylon Gold Combi

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

1.3 Δραστικές ουσίες

α) Κοινή ονομασία των δραστικών ουσιών κατά ISO

Metalaxyl-m (ομάδα φαινυλαμιδίων)

Folpet (ομάδα φθαλιμιδίων)

β) Περιεκτικότητα των τεχνικώς καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία:

Metalaxyl-m: 91 % (β/β) min
Folpet: 94%(β/β) min

γ) Παρασκευαστής των δ.ο.:

Metalaxyl-m: Syngenta Crop Protection AG, Ελβετίας

Folpet: Makhteshim-Agan Agrochemicals Division L.t.d., Ισραήλ

δ) Εργοστάσια παρασκευής των δ.ο.

Metalaxyl-m:
Säurefabrik Schweizerhalle AG
Ελβετία

Folpet:
Makhteshim-Agan
Agrochemicals Division
Ισραήλ

(οι Δ/νσεις των εργοστασίων είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκονται στο Παράρτημα I της παρούσας).

ε) Τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών ουσιών:

Οι τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών ουσιών Metalaxyl-m και Folpet όπως προσδιορίζονται στην αίτηση για προσωρινή έγκριση με ημερομηνία 5-8-2003 (Αρ. Πρ. ΥΓ 108562) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

Syngenta Hellas AEBE
Λ.Ανθούσας-Ανθούσα Αττικής
AME:SYNGR
T.K.15349
Τηλ.:210-6666612-13
Fax: 210-6665777
E-mail: youla.kalliakaki@syngenta.com

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης):

Ο κάτοχος της έγκρισης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Syngenta Crop Protection AG, Ελβετία

γ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
Syngenta Crop Protection AG, Ελβετία

(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).

δ) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Syngenta Hellas ABEE
Οινόφυτα Βοιωτίας
2. Χελλαφαρμ ΑΕ
Άγιος Ιωάννης Στυλίδα
3. Syngenta Crop Protection AG
Monthey Ελβετίας

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Metalaxyl-m: 5% β/β
Folpet: 42% β/β
βοηθητικές ουσίες : 52,1% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στην αίτηση για προσωρινή έγκριση με ημερομηνία 5-8-2003 (Αρ. Πρ. ΥΓ 108562) και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής, στο παράρτημα Γ (Part C) της έκθεσης αξιολόγησης (registration report).

2 Συσκευασίες

2.2 Συσκευασίες: (Σύνολο συσκευασιών: 6)

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Σακούλα εντός χαρτοκυτίου.	200 gr-400 gr-800gr-1kgr-2kgr-5kgr	Σακούλα με τριπλό τοίχωμα από PET (polyester) ALU (aluminium) LLDPE (Linera low density polyethylene) εντός χαρτοκυτίου.

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Βάζουμε στο ψεκαστικό το μισό του απαιτούμενου νερού και με συνεχή ανάδευση ρίχνουμε τη δόση του προϊόντος που αναλογεί στην έκταση που θα ψεκαστεί. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο και ψεκάζουμε αφού προηγηθεί ανάδευση.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Η απόσυρση/καταστροφή του Acylon Gold Combi 45 WG πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό, για την ασφαλή καταστροφή του σκευάσματος.

Τα υλικά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4

Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση του περονόσπορου σε αμπέλι.

Το metalaxyl-m είναι εκλεκτικό διασυστηματικό μυκητοκτόνο με δράση κατά των ωομυκήτων που κινείται μέσα στο φυτό με αποπλαστική κυρίως κίνηση παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη του παθογόνου μέσα στους φυτικούς ιστούς.

Το folpet είναι προστατευτικό μυκητοκτόνο με δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων.

5

5.1 Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο
		γρ./στρέμμα (max)	γρ. σκευάσματος /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού: λίτρα / στρέμμα		
Αμπέλι (οινοποιήσιμες ποικιλίες)	Περονόσπορος (<i>Plasmopara viticola</i>)	200	200	50-100	Ψεκασμοί φυλλώματος που ξεκινούν κατά την κρίσιμη, για την ανάπτυξη του περονόσπορου, περίοδο της άνθησης και εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, με μεσοδιάστημα επεμβάσεων 10-14 ημέρες. *	Μέχρι 4

* το μικρότερο μεσοδιάστημα (10 ημέρες) να εφαρμόζεται σε περίπτωση υψηλής πίεσης προσβολής

Παρατηρήσεις:

1. Εφαρμόστε τη συνιστώμενη δόση με την κατάλληλη ποσότητα ψεκαστικού υγρού, ώστε να καλυφθεί πλήρως το φύλλωμα του φυτού.
2. Οι εφαρμογές πρέπει να αρχίζουν προληπτικά πριν εκδηλωθεί η ασθένεια κατά την περίοδο της έντονης ανάπτυξης των φυτών.
3. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων των τοπικών Περιφερειακών Κέντρων (στις περιοχές που εφαρμόζονται)
4. Περίπου 7-10 ημέρες μετά τον τελευταίο ψεκασμό με Acylon Gold Combi 45 WG, συνεχίστε τους ψεκασμούς με μυκητοκτόνα επαφής ή διασυστηματικά με διαφορετικό τρόπο δράσης.
5. Η χρήση του μπορεί να προκαλέσει ελαφρά αύξηση των ακάρεων.

6	Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί	<p><u>Διαχείριση ανθεκτικότητας:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Εφαρμογή μόνο σε προληπτικούς και όχι θεραπευτικούς ή εξοντωτικούς ψεκασμούς. ▪ Επεμβάσεις κατά προτίμηση στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου. ▪ Τα διαστήματα μεταξύ των εφαρμογών να μην ξεπερνούν τις 14 ημέρες και μπορούν να είναι μικρότερα σε περίπτωση υψηλής πίεσης προσβολής. ▪ Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο 4, εκ των οποίων οι 2 μπορεί να είναι συνεχόμενες. <p>Μετά τη 2η εφαρμογή με Acylon Gold Combi 45 WG, η επόμενη πρέπει να γίνεται με μυκητοκτόνο διαφορετικού τρόπου δράσης από τα φαινυλαμίδια και στη συνέχεια να τηρείται το συνιστώμενο μεσοδιάστημα του άλλου μυκητοκτόνου.</p>
<p><u>Να μην εφαρμόζεται σε αμμώδη εδάφη με περιεκτικότητα σε οργανική ουσία μικρότερη ή ίση με 1%.</u></p>		

7

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

8

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.

Να μην εφαρμόζεται σε φυτώρια αμπέλου.

9 Σήμανση σκευάσματος:	Xn – Επιβλαβές N - Επικίνδυνο για το περιβάλλον
10 Φράσεις R	R20 Επιβλαβές όταν εισπνέεται R40 Ύποπτο καρκινογένεσης R43 -Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
11 Φράσεις S	S1/2 Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. S13 Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές. S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. S36/37 Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. «Να φοράτε προστατευτική μάσκα» «Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια σε περίπτωση επανεισόδου των εργατών στον αγρό σύντομα μετά την εφαρμογή» S60 Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα. S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας. SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. SPe3 Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να αφήνεται ανέκαστη ζώνη προστασίας <u>5 μέτρων</u> μεταξύ επιφανειακών υδάτων και αμπελώνα «Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»
12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο	Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα: <u>Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:</u> Αφαιρέστε τα ρούχα που έχουν μολυνθεί και ξεπλύνετε τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος που έχουν έρθει σε επαφή με το σκεύασμα με άφθονο νερό και σαπούνι. <u>Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:</u> Ξεπλύνετε με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό. <u>Σε περίπτωση κατάποσης:</u> Χορηγείστε ιατρικό ενεργό άνθρακα, διαλυμένο σε μεγάλες ποσότητες νερού. Προσοχή μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα και μην προκαλέσετε εμετό, σε περίπτωση που δεν έχει τις αισθήσεις του. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)	MRLs (mg/kg)
Metalaxyl-m	Έχουν οριστεί με την ΚΥΑ 125170/22.07.2005 (ΦΕΚ 1093/Β/2.8.2005)
Folpet	Έχουν οριστεί με την ΚΥΑ 116077/09.02.2007 (ΦΕΚ 243/Β/26.2.2007)

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια	PHI(ημέρες)
Αμπέλι (οινοποιήσιμες ποικιλίες)	42 ημέρες

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Το Acylon Gold Combi 45 WG παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία σε καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από ήλιο και υγρασία και σε θερμοκρασία από -10 °C έως 35 °C.

15 Προστατευόμενα στοιχεία και μελέτες

Στο Παράρτημα I (Annex I) του registration report καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα έγκριση κυκλοφορίας. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής και είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων.

16 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση χορηγείται με την προϋπόθεση ότι η ενδιαφερόμενη εταιρεία θα προσκομίσει στην Αρμόδια Αρχή τις παρακάτω μελέτες:

- μελέτη για τον καθορισμό των δύο προσμίξεων τοξικολογικής σημασίας του folpet υπερχλωρομεθυλική μερκαπτάνη (perchloromethylmercaptan) και τετραχλωράνθρακας (carbon tetrachloride) στο σκεύασμα πριν και μετά την αποθήκευση για 14 μέρες στους 54 °C μέχρι 31 Ιουλίου 2008,
- μελέτη θρυπτικότητας και δια τριβής φθορά των κόκκων μέχρι 31 Ιουλίου 2008,
- στοιχεία επικύρωσης της αναλυτικής μεθόδου με την οποία πραγματοποιείται ο προσδιορισμός των δύο προσμίξεων τοξικολογικής σημασίας perchloromethylmercaptan και carbon tetrachloride στο σκεύασμα μέχρι 31 Ιουλίου 2008.

Η Αρμόδια Αρχή θα αξιολογήσει τα στοιχεία αυτά και θα αποφανθεί εντός έξι (6) μηνών από την υποβολή τους, γνωστοποιώντας το αποτέλεσμα στο ΑΣΥΓΕΦ.

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

B**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ

Δ – 7 (GAP)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Γεωργικό (ά) Φάρμακο (ά) (κοινή ονομασία) : metalaxyl-M + folpet
 EEC No (α) :
 Εμπορικό (ά) όνομα (τα) Acylon Gold Combi 45 WG
 Κύρια χρήση π.χ. εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο Μυκητοκτόνο

Σελίδες :
 Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ

1	2	3	4	5	6		7				8			9	10
					Μορφή	Περιεκτικότητα σε δ.ο	Μέθοδος/ Τρόπος	στάδιο ανάπτυξης και εποχή	αριθμός εφαρμογών ελαχ. μεγ.	χρονικό μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών (ελαχ)	χλγ δ.ο/ εκατόλιτρο ελαχ. μεγ.	Λίτρα ψεκαστ. Υγρού/ εκτάριο ελαχ.μεγ.	χλγ.δ.ο /εκτάριο ελαχ.μεγ		
(α)			(β)	(γ)	(δ)	(θ)	(η)	(ι)	(κ)				(λ)	(μ)	
Καλλιέργεια και/ή συνθήκες χρήσης	Κράτος Μέλος ή Χώρα	Εμπορικό Όνομα του σκευάσματος	(Α) (Θ) (Κ)	Εχθρός,ομάδα εχθρών ή ασθενείων ή ζιζανίων που ελέγχονται	Σκεύασμα		Εφαρμογή						Δοσολογία ανά επέμβαση	Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες)	Παρατηρήσεις
Αμπέλι (Οινοποιήσιμες ποικιλίες)	ΕΛΛΑΣ	Acylon Gold Combi 45 WG	A	<i>Plasmopara viticola</i>	WG	Metalaxyl-M 50gr/kg (άθροισμα εναντιομερών min 91% R- και max 4% S-) Folpet 400gr/Kg	Ψεκασμός φυλλώματος.	BBCH 53- BBCH 69	2 – 4	10 - 15	0,01 (1) 0,08 (2)	500 - 1000	(0,05 - 0,1) (0,4 - 0,8)	42	(1) δόση metalaxyl-m (2) δόση folpet

Παρατηρήσεις: (α) Για τις καλλιέργειες, η ταξινόμηση της ΕΕ και του Codex (και τα δύο) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Όπου βρίσκει εφαρμογή, οι συνθήκες χρήσης θα πρέπει να περιγράφονται (π.χ. καπνισμός των κατασκευών).
 (β) Ανοιχτού αγρού (Α), εφαρμογές σε θερμοκήπια (Θ), ή σε κλειστούς χώρους (Κ).
 (γ) πχ. Μασητικά και μυζητικά έντομα, έτομα εδάφους, έντομα φυλλώματος, ζιζάνια
 (δ) πχ. Βρέξιμη σκόνη (WG), γαλακτοποιήσιμο συμπύκνωμα (EC)
 (ε) GCPF Κώδικες – GIFAP Technical Monograph No 2, 1989.
 (στ) όλες οι χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες θα πρέπει να εξηγούνται
 (ζ) Μέθοδος πχ. Ψεκασμός υψηλού όγκου, σκονισμός.

(η) Τρόπος, πχ σ' όλη την επιφάνεια, από αέρος, στις γραμμές, ατομικά φυτά – ο τύπος του ψεκαστικού μηχανήματος θα πρέπει να προσδιορίζεται
 (θ) g/kg ή g/lit
 (ι) Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία εφαρμογή (BBCH Monograph, Growth Stages of Prants, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), περιλαμβάνοντας όπου βρίσκει εφαρμογή, πληροφορίες σχετικά με την εποχή κατά τον χρόνο εφαρμογής
 (κ) Ο ελάχιστος και ο μέγιστος δυνατός αριθμός εφαρμογών υπό πρακτικές συνθήκες
 (λ) Ελάχιστο χρονικό μεσοδιάστημα πριν τη συγκομιδή
 (μ) Οι παρατηρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: οικονομική σημασία / περιορισμούς στη χρήση.