



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 7 - 11 - 2011
Αριθ. πρωτ: 102336

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Γ. Τσιάμπα

Τηλέφωνο: 210 928 7228
e-mail: syg064@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 6087/17-7-1980 οριστικής έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο), NIMROD 25 EC (δ.ο. bupirimate), ως προς την εγγυημένη σύνθεση, το εργοστάσιο συσκευασίας και την ημερομηνία λήξης της έγκρισης»

Προς: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73
Τ.Κ. 15231 - ΑΘΗΝΑ
(με απόδειξη)

Κοιν.: 1 Γραφείο Υπουργού
κ. Κ. Σκανδαλίδη
2 Γραφείο Υφυπουργού
κ. Ι. Δριβελέγκα
3 Περιφερειακές Ενότητες
Δ/σεις Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Έδρες τους
4 Μ.Φ.Ι.
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
5 Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους
6 Ε.ΣΥ.Φ.
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα
7 Εσωτερική διανομή:
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της
Δ/σής μας
-Γραμματεία της Δ/σής μας
8 Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
Διδότου 26, Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερο το άρθρο 80 αυτού.

2. Την Οδηγία 2011/25/ΕΕ της Επιτροπής της 3^{ης} Μαρτίου 2011 για τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να καταχωριστεί η ουσία **bupirimate** ως δραστική ουσία και για την τροποποίηση της απόφασης 2008/934/ΕΚ της Επιτροπής.
3. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2008.
4. Το Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154 Α').
5. Τη με αριθ. 155540/30-6-2011 (ΦΕΚ 1588/Β'/1-7-2011) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Δριβελέγκα».
6. Τη με αριθ. πρωτ. 96918/25-5-2011 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α Τροποποιούμε την με αρ. αριθ. **6087** έγκριση διάθεσης στην αγορά, του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **NIMROD 25 EC** (δ.ο. bupirimate) η οποία ανανεώθηκε με την αριθ. 116724/24-7-2007 και διευρύνθηκε με την αριθ. 126247/29-12-2008 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς την εγγυημένη σύνθεση, το εργοστάσιο συσκευασίας και την ημερομηνία λήξης της έγκρισης, η οποία και διαμορφώνεται ως ακολούθως:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

6087
17-7-1980
31-05-2015

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα

NIMROD 25 EC

- 1.2.β Μορφή:

Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)

1.3 Δραστική ουσία (ες)

- α) Κοινή ονομασία της/των δραστική/ζών ουσίας/ών κατά ISO

bupirimate

- β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

bupirimate: 945 g/kg

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

Makhteshim Chemical Works Ltd

Northern Industrial Zone
PO Box 60, Beer-Sheva 84100
Ισραήλ
Adi Azmon
Product Manager-Regulatory Affairs
Τηλ: +972 86296659
Fax: +972 732321336
E-mail: adia@mcw.co.il

European address

**Makhteshim-Agan International
Coordination Center (MAICC)**

c/o Feinchemie Schwebda GmbH
Edmund Rumpler Str. 6
51149 Köln, Germany
Dr. Wolfgang Busch
Τηλ. +49 2203 5039-501
E-mail: Wolfgang.Busch@fcs-feinchemie.com

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Makhteshim Chemical Works Ltd

Ισραήλ

(η Δ/ση του εργοστασίου είναι
εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο
Παράρτημα Ι της παρούσας).

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της
δραστικής ουσίας:

τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας
bupirimate όπως έχουν κατατεθεί από την
Παρασκευάστρια Εταιρεία Makhteshim
Chemical Works Ltd, Ισραήλ κατά την
διαδικασία συμμόρφωσης με την οδηγία
καταχώρηση με αριθ. πρωτ. 96918/25-5-
2011 και παραμένουν στα αρχεία της
Αρμόδιας Αρχής.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ,

Εθνικής Αντιστάσεως 73,
Τ.Κ.: 15231 Χαλάνδρι
Τηλ.: 211 120 5570
Fax: 211 120 5572
E-mail: martha.paissiou@alfagro.gr
technical@alfagro.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική
συσσκευασία και σήμανση (εφόσον
είναι διαφορετικός από τον κάτοχο
της έγκρισης)

Ο κάτοχος της έγκρισης
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Makhteshim Chemical Works Ltd
Northern Industrial Zone
PO Box 60, Beer-Sheva 84100
Ισραήλ
Adi Azmon
Product Manager-Regulatory Affairs
Τηλ: +972 86296659
Fax: +972 732321336
E-mail: adia@mcw.co.il

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Makhteshim Chemical Works Ltd
Ισραήλ.

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ ,
Οινόφυτα, Βοιωτία
2. **Makhteshim Chemical Works Ltd**
Ισραήλ.

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία Bupirimate 25 % β/ο,
Βοηθητικές ουσίες : 71,25 % β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στην DPD της αίτησης της εταιρείας με αριθ. πρωτ. 96918/25-5-2011 και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

2 Συσκευασία

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
	Φιαλίδια	80, 100, 200, 250, 400, 500 κ.εκ. & 1 λίτρου	Πλαστικό τύπου SELAR, COEX ή PET

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμοί φυλλώματος με καλό λούσιμο των φυτών.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό.

Προσθέστε την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος, αναδεύοντας συγχρόνως το ψεκαστικό υγρό.

Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα που έχουν ισχυρή αλκαλική αντίδραση.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση κατά του Αΐδιου. Απορροφάται από τα φύλλα και έχει διελασματική δράση. Αναστέλλει την παραγωγή σπορίων

5 5.1 Φάσμα δράσης

Καλλιέργειες	<u>Ασθένειες</u>	Δόσεις (κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού)	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στ ρ.)	Δόσεις (κ.εκ./στρ.)	Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ/κή περίοδο/Μεσοδιά στημα εφαρμογών
Μηλιά	<u>Ωίδιο</u> (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	40 - 60	100-150	60	Από το στάδιο της πράσινης κορυφής.	3/14
Βερικοκιά	<u>Ωίδιο</u> (<i>Podosphaera oxyacanthae</i>)	30 - 60	100-150	90	Από την πτώση των πετάλων ή μόλις εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα της ασθένειας.	3/14
Ροδακινιά	<u>Ωίδιο</u> (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	30 - 60	100-150	90	Από την πτώση των πετάλων ή μόλις εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα της ασθένειας.	3/14
Αμπέλι	<u>Ωίδιο</u> (<i>Uncinula necator</i>)	150-180	80-100	120-180	Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας και με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.	4/10-14
Φράουλα	<u>Ωίδιο</u> (<i>Sphaerotheca macularis</i>)	120-150	50-70	60-105	Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας και με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.	4/10
Τομάτα (Y+Θ)	<u>Ωίδιο</u> (<i>Leveillula taurica</i>)	200-250	50-100	100-250	Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας και με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.	3/10

Πιπεριά (Y+Θ)	<u>Ωίδιο</u> (<i>Leveillula taurica</i>)	200-300	50-100	100-300	Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας και με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.	2/10
Αγγούρι (Y+Θ)	<u>Ωίδιο</u> (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Leveillula taurica</i> <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	100-120	50-100	50-120	Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας και με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.	4/10
Κολοκύθι (Y+Θ)	<u>Ωίδιο</u> (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Leveillula taurica</i> <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	100-150	50-100	50-150	Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας και με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.	4/10
Τριανταφυλλιά	<u>Ωίδιο</u> (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	120 - 200 (προστατευτικά) 200 - 300 (θεραπευτικά) + 40 κ.εκ. προσκολλητικό AGRAL 90	50 50	100 150	Προστατευτική εφαρμογή Θεραπευτικά	3/14

Παρατηρήσεις :

- Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής.
- Ο όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα είναι ανάλογος του σταδίου ανάπτυξης κάθε καλλιέργειας.
- Στη Μηλιά, η δόση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τα 60 κ.εκ./στρ. και στη Βερικοκιά και Ροδακινιά τα 90 κ.εκ./στρ.
- Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές που εφαρμόζονται.
- Για διαχείριση φαινομένων ανθεκτικότητας οι επεμβάσεις με το σκεύασμα πρέπει να γίνονται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα που ανήκουν σε ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης από τις αμινοπυριμιδίνες.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτούγειας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες που αναφέρονται στην ετικέτα του προϊόντος, όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, κάτω από τις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

- 9** Σήμανση σκευάσματος:

Xn - Επιβλαβές
N - Επικίνδυνο για το περιβάλλον.

- 10** Φράσεις R

R10 Εύφλεκτο
R38 Ερεθίζει το δέρμα
R65 Επιβλαβές: Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.

«Περιέχει bupirimate. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση»

R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

- 11** Φράσεις S

S1/2 Να φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
S13 Μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές.
S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.
S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών προσώπου
S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας
S62 Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήσετε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.

SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Σε περίπτωση κατάποσης, να μην προκληθεί εμετός, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε και δείξτε αυτό ,ο δοχείο ή την ετικέτα του. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777

13 Προστασία των καταναλωτών**13.1** Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)

bupirimate

Φυτικά Προϊόντα	MRLs (mg/kg)
Έχουν καθοριστεί Ευρωπαϊκά MRLs στον Κανονισμό 396/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008.	

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μηλιά, Βερικοκιά, Ροδακινιά	21
Αμπέλι	14
Φράουλα	3
Τομάτα (Υ&Θ)	3
Πιπεριά (Υ&Θ)	3
Αγγούρι (Υ)	3
Αγγούρι (Θ)	1
Κολοκύθι(Υ)	3
Κολοκύθι (Θ)	1

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από πηγές ανάφλεξης και θερμότητα προστατευμένο από παγετό. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

Η έγκριση θα ανακληθεί στις **31-5-2013** εάν δεν υποβληθεί από τον κάτοχο της έγκρισης αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙΙ για αξιολόγηση σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο Παράρτημα VI του Π.Δ. 115/97.

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ι. ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ