



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 28 - 12 - 2011  
Αριθ. πρωτ: 103828

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Γ. Τσιάμπα  
Τηλέφωνο: 210 928 7228  
e-mail: [syg064@minagric.gr](mailto:syg064@minagric.gr)

Προς: Syngenta ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ  
Λεωφ. Ανθούσας  
15349 Ανθούσα  
(με απόδειξη)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ.  
60.156/28-1-2008 έγκρισης στο  
φυτοπροστατευτικό προϊόν  
(μυκητοκτόνο) ΑΤΕΜΙ 10 WG  
(δ.ο. cyproconazole) ως το  
εργοστάσιο παρασκευής της  
δραστικής ουσίας και την  
ημερομηνία λήξης της έγκρισης.»

- Κοιν.: 1. Γραφείο Υπουργού κ. Κ.  
Σκανδαλίδη  
2. Γραφείο Υφυπουργού  
κ. Ι. Δριβελέγκα  
3. Περιφερειακές Ενότητες  
Δ/σεις Αγροτικής  
Οικονομίας & Κτηνιατρικής  
Έδρες τους  
4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
Ινστιτούτο  
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών  
Φαρμάκων  
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά  
5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. - Έδρες τους  
6. ΕΣΥΦ  
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα  
7. Εσωτερική διανομή:  
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της  
Δ/σής μας  
-Γραμματεία της Δ/σής μας  
8 Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων  
Λιδότου 26, Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερο το άρθρο 80 αυτού.
2. Την Οδηγία 2011/56/ΕΕ της Επιτροπής της 27<sup>ης</sup> Απριλίου 2011 για τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να καταχωριστεί η ουσία **cyproconazole** ως δραστική ουσία και για την τροποποίηση της απόφασης 2008/934/ΕΚ της Επιτροπής.

3. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2008.
4. Το Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 243 Α').
5. Τη με αριθ. 196018/25-11-2011 (ΦΕΚ 2741/25-11-2011) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Δριβελέγκα και Αστέριο Ροντούλη.
6. Τη με αριθμό 454/2011 ατομική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με θέμα «Αρμόδιες Αρχές εφαρμογής του κανονισμού 1107/2009 σχετικά με την διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ»
7. Τη με αριθ. πρωτ. 97318/31-5-2011 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας Syngenta ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε τη με αριθ. **60.156** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **ATEMI 10 WG** (δ.ο. cyproconazole) της εταιρείας Syngenta ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, που χορηγήθηκε με την αριθ. 115673/28-1-2008 Υπ. απόφαση, ως προς το εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας και την ημερομηνία λήξης της έγκρισης και η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

## **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

### **1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

<b>60.156</b>
<b>28-1-2008</b>
<b>31 – 05 - 2015</b>

### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
- 1.2.β Μορφή:

<b>ATEMI 10 WG</b>
<b>Βρέξιμοι κόκκοι (WG)</b>

### **1.3 Δραστική ουσία (ες)**

- α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO
- β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:
- γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

cyproconazole (ομάδα τριαζόλες/DMIs)
---

cyproconazole: 940 g/kg min
-----------------------------

Syngenta Crop Protection AG, Ελβετίας
---------------------------------------

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

- Bayer Schweiz AG, Ελβετία
- Saltigo GmbH, Leverkusen, Γερμανία

(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας cyproconazole όπως έχουν κατατεθεί από την Παρασκευάστρια Εταιρεία Syngenta Crop Protection AG, Ελβετίας, κατά την διαδικασία συμμόρφωσης με την οδηγία καταχώρησης με ημερομηνία 31-5-2011 (Αρ.Πρ. Υ.Α.Α.Τ. 97318) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

Syngenta Hellas AEBE  
Εκ μέρους της  
Syngenta Crop Protection AG Ελβετίας  
Τ.Κ.15349  
Τηλ.:210-6666612-13  
Fax:210 6665777  
E-mail: [youla.kalliakaki@syngenta.com](mailto:youla.kalliakaki@syngenta.com)

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης):

Ο κάτοχος της έγκρισης  
Syngenta Hellas AEBE

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Syngenta Crop Protection AG, Ελβετίας

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

KWIZDA Agro GmbH,  
AUSTRIA

(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).

- ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος
- Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
- 1.Syngenta Hellas AEBE  
Οινόφυτα-Βοιωτίας
  2. KWIZDA Agro GmbH Αυστρίας
- στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:
- Δραστική ουσία: cyproconazole 10% β/β  
Βοηθητικές ουσίες: 89,4 % β/β
- Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στην αίτηση της εταιρείας με ημερομηνία 26-3-2007 (Αρ.Πρ. Υ.Α.Α.Τ. 117911) και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

## 2 Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Βαζάκι Μπουκάλι με ή χωρίς κουτί	15 γρ., 20 γρ., 30 γρ., 40 γρ., 50 γρ., 60 γρ., 75 γρ., 100 γρ., 150 γρ., 200 γρ., 250 γρ., 300 γρ., 500 γρ., 600 γρ., 1 κιλό, 2 κιλά, 5 κιλά	PE ή HDPE
2	Σακούλα με ή χωρίς κουτί	15 γρ., 20 γρ., 30 γρ., 40 γρ., 50 γρ., 60 γρ., 75 γρ., 100 γρ., 150 γρ., 200 γρ., 250 γρ., 300 γρ., 500 γρ., 600 γρ., 1 κιλό, 2 κιλά, 5 κιλά	πολυστρωματική σακούλα (polyester, aluminium &polyethylene laminate)

## 3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

**Τρόπος εφαρμογής:**  
Ψεκασμοί φυλλώματος.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**  
Γεμίστε το 1/3 του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό, προσθέστε την καταλληλή δόση ή τον υδατοδιαλυτό σάκκο στο νερό, ανακατέψτε καλά και γεμίστε το ψεκαστικό με νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**Συνδυαστικότητα: --**

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα κενά μέσα συσκευασίας (βαζάκια, σακούλες), ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό), καταστρέφονται με τρύπημα ή σκίσιμο αντίστοιχα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης και εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

## 4 Κατηγορία και

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DIMs (υποομάδα

τρόπος δράσης: τριαζόλης) με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση.

## 5 5.1 Φάσμα δράσης

Καλλιέργειες	Ασθένειες	Δόσεις			Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητ. περίοδο, μεσοδιάστημα επεμβάσεων	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής
		γραμ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρό	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / στρέμμα)	ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΟΣΗ (γραμ. σκευάσμ./ στρέμμα)		
Μηλιά	Φουζικλάδιο ( <i>Venturia Inaequalis</i> )	10-15	100-200	30	Από το στάδιο της πράσινης κορυφής και εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Στις περιοχές που εφαρμόζεται σύστημα γεωργικών προειδοποιήσεων, να ακολουθούνται οι σχετικές συστάσεις των Περιφερειακών Κέντρων Προστασίας Φυτών.	4
Ροδακινιά	Φαιά σήψη ( <i>Sclerotinia laxa</i> )	10-15	150-250	37,5	Στην έκπτυξη των οφθαλμών, στη ρόδινη κορυφή και στην πλήρη άνθηση	3
Αμπέλι	Ωίδιο ( <i>Uncinula necator</i> )	10-15	50-150	22,5	- όταν οι βλαστοί αποκτήσουν 3-4 φύλλα - άνθηση - λίγο μετά το δέσιμο των ραγών	4
Σπαράγγι	Σκωρίαση ( <i>rusicinia asparagi</i> )	20-30	100	30	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Μεσοδιάστημα επεμβάσεων 15 ημέρες	6

### Παρατηρήσεις

Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής.

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Για διαχείριση φαινομένων ανθεκτικότητας  
- οι επεμβάσεις με το σκεύασμα, πρέπει να γίνονται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης που δεν ανήκουν στην ομάδα των DMIs και δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με αυτή.  
- χρήση μόνο της εγκεκριμένης δοσολογίας  
- ορθή εφαρμογή ψεκασμών

**7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:  
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

---

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν  
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

---

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και τ συνιστώμενες δόσεις.

**9** Σήμανση σκευάσματος:

**Xn** - Επιβλαβές  
**N** - Επικίνδυνο για το περιβάλλον

**10** Φράσεις R

**R63** Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.  
**R50/53:** Πολύ Τοξικό για υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

**11** Φράσεις S

**S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.  
**S13** Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.  
**S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.  
**S35** Το προϊόν και ο περιέκτης του πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.  
**S36/37** Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια.  
**S57** Να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο περίβλημα για να αποφευχθεί ρύπανση του περιβάλλοντος.  
Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά το ψεκασμό.  
Να μην χρησιμοποιείται από έγκυες γυναίκες ή παρουσία εγκύων γυναικών.  
**S61** Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον.  
Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.  
**SP1** Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.  
  
«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»

**12** Πρώτες

**Πρώτες Βοήθειες**

βοήθειες - Αντίδοτο	<p><b>Σε περίπτωση κατάποσης</b>, μην προκαλείτε εμετό και καλέστε αμέσως γιατρό.</p> <p><b>Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια</b>, ξεπλύνετε τα αμέσως με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά και συμβουλευθείτε γιατρό.</p> <p><b>Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα</b>, αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλυθείτε με νερό και σαπούνι.</p> <p><b>Σε περίπτωση εισπνοής</b>, απομακρύνετε τον παθόντα από την επικίνδυνη περιοχή.</p> <p>Εάν δεν αναπνέει σωστά εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή και καλέστε γιατρό. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.</p> <p><b>Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.</b></p>
---------------------	---

### 13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) cyproconazole

Προϊόντα	MRLs (mg/kg)
Έχουν καθοριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά MRLs στο Παράρτημα III του Κανονισμού 396/2005.	

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια	PHI(ημέρες)
Μηλιά	90
Ροδακινιά	21
Αμπέλι	28
Σπαράγγι	90

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα παραμένει για δύο (2) χρόνια.

### 15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων αυτή χορηγήθηκε.

Η έγκριση θα ανακληθεί στις **31-5-2013** εάν δεν υποβληθεί από τον κάτοχο της έγκρισης αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο με τα στοιχεία του Παραρτήματος III για αξιολόγηση σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο Παράρτημα VI του Π.Δ. 115/97.

### **B** Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από τη χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί παράπτωμα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ**

**Ι. ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ