



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα, 31 - 5 - 2012  
Αριθ. πρωτ: 2358/27367

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου  
Τηλέφωνο: 210 92 87 161  
e-mail: [syg036@minagric.gr](mailto:syg036@minagric.gr)

Προς: **PROBELTE S.A.,  
Ctra Madrid, Km 384.6,  
Poligono Industrial El Tiro  
30100 Espinardo  
MURCIA – ΙΣΠΑΝΙΑ**

Δια μέσου της εταιρείας  
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος &  
Σια Ε.Ε.  
Τσιτούρη 22, 152 31 - Χαλάνδρι  
( με απόδειξη)

Κοιν.: **ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  
ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ**

**ΘΕΜΑ:** Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
διάθεσης στην αγορά στο  
φυτοπροστατευτικό προϊόν  
(μυκητοκτόνο) FOSBEL 80 WP

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερο το άρθρο 80 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις
3. Τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.

4. Τον Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
5. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών
6. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου , όπως τροποποιήθηκε με το SANCO doc.357 /rev.3/ 2008
7. Την έγκριση του από την Ιταλία.
8. Τη με αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/Β/22-5-2009) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για “Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με «Εντολή Υφυπουργού».
9. Την από 7/12/2009 και 7/3/2012 αίτηση της Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & Σια Ε.Ε εκ μέρους της εταιρείας **PROBELTE S.A.**, Ισπανίας

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 80, του Κανονισμού 1107/2009 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **FOSBEL 80 WP** της εταιρείας **PROBELTE S.A.**, Ισπανίας με υπεύθυνο επικοινωνίας στη χώρα μας την εταιρεία. Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & Σια Ε.Ε με τα ακόλουθα στοιχεία:

### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

#### **1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης  
1.1.β Ημερομηνία λήξης

<b>60.323</b>
<b>31-5-2012</b>
<b>30/4/2017</b>

#### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα

<b>FOSBEL 80 WP</b>
---------------------

- 1.2.β Μορφή:

Βρέξιμη σκόνη (WP)
--------------------

#### **1.3 Δραστική ουσία**

- α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Fosetyl-Al (ομάδα των φωσφονικών)
--------------------------------------

- β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

96 % (β/β) min
----------------

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

**FATF - INDUSTRIAS AFRASA SA,**  
Pol. Ind. Fuente del Jarro,  
C/Ciudad de Sevilla 53  
E-46988 Paterna (Valencia)  
**Ισπανία**

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
**Hangzhou March Chemical Laboratory**  
- Κίνα  
&  
**Shandong Dacheng Pesticide Co, Ltd.**  
- Κίνα  
(η Δ/νση των εργοστασίων είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας **fosetyl Al** όπως προσδιορίζονται στο **Annex II - Doc J** της αίτησης με ημερομηνία 12/7/2009 (Αρ. Πρ. ΥΓ 135019) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

**PROBELTE S.A.,**  
Ctra Madrid, Km 384.6, Poligono Industrial El Tiro  
30100 Espinardo  
MURCIA – ΙΣΠΑΝΙΑ  
Mr. Antonio Gómez  
Tel.: +34 968 307250  
Fax.: +34 968 305432  
E-mail: [probelte@probelte.es](mailto:probelte@probelte.es) ;  
[antonio.gomez@probelte.es](mailto:antonio.gomez@probelte.es)

Υπεύθυνος επικοινωνίας στην Ελλάδα

**ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**  
ΤΣΙΤΟΥΡΗ 22 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ  
Τηλ.: 210 6725174  
E-mail: [aconsult@otenet.gr](mailto:aconsult@otenet.gr)  
[a.toutoutzidakis@yahoo.gr](mailto:a.toutoutzidakis@yahoo.gr)

β) Υπεύθυνος για τη διάθεση, την τελική συσκευασία και σήμανση

**ΣΕΓΕ Α.Β.Ε.Ε.**  
Εθνικής Αντιστάσεως 84, 15231 Χαλάνδρι  
Τηλ.: 210 6717794  
Fax: 210 6722310  
E-mail: [sege@otenet.gr](mailto:sege@otenet.gr)

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**PROBELTE S.A.**,  
Ctra Madrid, Km 384.6, Poligono Industrial El Tiro  
30100 Espinardo  
MURCIA – ΙΣΠΑΝΙΑ  
Mr. Antonio Gómez  
Tel.: +34 968 307250  
Fax.: +34 968 305432  
E-mail: [probelte@probelte.es](mailto:probelte@probelte.es) ;  
[antoniogomez@probelte.es](mailto:antoniogomez@probelte.es)

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
**PROBELTE S.A.**, - ΙΣΠΑΝΙΑ  
  
(η Δ/ση των εργοστασίων είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:  
**1) PROBELTE S.A.**, - ΙΣΠΑΝΙΑ  
  
&  
**2) ΣΕΓΕ Α.Β.Ε.Ε.**  
Θέση Μαδάρω, Οινόφυτα Βοιωτίας  
Τηλ.: 22620 31851  
Fax : 22620 32748  
E-mail: [sege@otenet.gr](mailto:sege@otenet.gr)

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία **80 % (β/β)**  
Βοηθητικές ουσίες 16,7% (β/β)

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στο Τμήμα J της αίτησης με ημερομηνία 5-9-2011 (Αρ. Πρ. Υ.Α.Α Τ.100361) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής στο Part C του registration report της αρμόδιας αρχής της Ιταλίας

## **2** Συσκευασία(ες)

### 2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Κουτί με εσωτερική σακούλα	25, 50, 100, (4x25 γρ.), 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 750, 800 γραμ., 1 κιλού, (1,2), (2,5) και 5 κιλά.	Σακούλα πολυαιθυλενίου, κουτί χάρτινο
2	Σακίδιο	25, 50, 100, (4x25 γρ.), 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 550, 600, 750, 800 γραμ., 1 κιλού, (1,2), (2,5) και 5 κιλά.	Σακούλα σύνθετου υλικού Polyethylene/ Al/Polyester

**3** Οδηγίες χρήσης:**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες**

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος, επάλειψη με πινέλο στα προσβεβλημένα μέρη του κορμού και των κλαδιών των εσπεριδοειδών

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Συνδυαστικότητα: Συνδυάζεται με σκευάσματα Mancozeb 80% WP. Δεν συνδυάζεται με χαλκούχα σκευάσματα και με διαφυλλικά λιπάσματα με βάση το άζωτο. Σε περίπτωση που προηγηθεί εφαρμογή με παραφινικό λάδι, να εφαρμοστεί το FOSBEL 80 WP αφού περάσει μία εβδομάδα από την εφαρμογή.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, κουτιά) αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Παρουσιάζει συμπλαστική και αποπλαστική κίνηση και δρα παρεμποδίζοντας την βλάστηση των σπορίων αλλά και επάγοντας μηχανισμούς άμυνας των φυτών.

**5** 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφαρμ/ ανά καλλ...περίοδο Μεσοδιάστ. Εφαρμογών σε ημέρες
		γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	γρ/ στρέμμα (max)	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
<b>Εσπεριδοειδή</b> (Πορτοκαλιές, Λεμονιές, Μανταρινιές, Κλημεντίνες, Γκρέϊτ –φρουτ, Φράπα, Κίτρο Περγαμόντο, Κουμκουατ, Νεραντζιά )	Φυτόφθορα ( <i>Phytophthora spp.</i> )	250-300	250 - 450	100 - 150	Πρώτος ψεκασμός την άνοιξη, στην αρχή της άνθησης, δεύτερος ψεκασμός το Ιούλιο και τρίτος Οκτώβρη- Νοέμβρη (1)	3
<b>Μηλοειδή</b> (Μηλιά, Αχλαδιά)	Φυτόφθορα λαμού και ριζών ( <i>Phytophthora spp.</i> )	250-300	200 - 360	80 - 120	3 ψεκασμοί: ο πρώτος τον Απρίλιο , ο δεύτερος τον Ιούλιο και τρίτος Σεπτέμβρη- Οκτώβρη	3
Αμπέλι (οινοποιήσιμο)	Περονόσπορος ( <i>Plasmopara viticola</i> )	250-300	75 - 330	30 - 110	Ψεκασμός λίγο πριν την άνθηση και επανάληψη κάθε 10-14 ημέρες, εάν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. (2)	4 με μεσοδιάστημα 10 – 14 ημέρες

## Παρατηρήσεις:

- (1) Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι οδηγίες των Γεωργικών Προειδοποιήσεων
- (2) Συνιστάται ο συνδυασμός του με μυκητοκτόνα επαφής (με δ.ο. mancozeb, folpet) για να επιτυγχάνεται καλύτερη προστασία των φυτών και ειδικά στους ψεκασμούς μετά την άνθηση ή όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας.

<b>6</b>	Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί	
<b>7.</b>	Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: <ul style="list-style-type: none"> <li>- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας</li> <li>- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν</li> <li>- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα</li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Δεν εφαρμόζεται</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Δεν εφαρμόζεται</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>
<b>8</b>	Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.	Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.
<b>9</b>	Σήμανση σκευάσματος:	---
<b>10</b>	Φράσεις R	<b>R52/53</b> Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον
<b>11</b>	Φράσεις S	<p>(S1/2) Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.</p> <p>(S13) Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.</p> <p>(S20/21) Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε μην πίνετε ή καπνίζετε.</p> <p>(S29) Μην αδειάζετε το περιεχόμενο στη αποχέτευση</p> <p>(S61) Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον ,αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας</p> <p><b>Sp1</b> Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του</p> <p><i>«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»..</i></p>

**12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

**Σε περίπτωση κατάποσης** ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην χορηγείται τίποτα από το στόμα σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τις. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια** πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση εισπνοής** μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα** πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα  
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία  
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 – 7793777

**13** Προστασία των καταναλωτών**13.1** Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)  
Fosetyl-AI

Φυτικά προϊόντα	mg/kg
<b>Έχουν οριστεί με τον Κανονισμό 396/2005 ΕΚ</b>	

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Εσπεριδοειδή	15
Μηλοειδή	28
Αμπέλι (οινοποιήσιμο)	28

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

**15** Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**B** Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού 1107/2009 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ**



**Δ – 7 (GAP)****ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ**

Γεωργικό (ά) Φάρμακο (ά) (κοινή ονομασία)

FOSETYL AL

Σελίδες :

EEC No (α)

254-320-2

Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ

Εμπορικό (ά) όνομα (τα)

FOSBEL 80 WP

Ημερομ. 8/2011

Κύρια χρήση π.χ. εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο

Μυκητοκτόνο

1	2	3	4	5	6		7				8			9	10
Καλλιέργεια Και/ή Συνθήκες χρήσης	Κράτος Μέλους ή χώρα	Εμπορικό όνομα του σκευάσμα-τος	(A) (Θ) ή (K)	Εχθρός, ομάδα εχθρών ή ασθενειών ή ζιζανίων που ελέγχονται	Σκεύασμα		Εφαρμογή				Δοσολογία ανά επέμβαση			Τελευταία Επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες)	Παρατη- ρήσεις
(α)			(β)	(γ)	Μορφή (δ-στ)	Περιεκ- σε δ.ο. (θ)	Μέθοδος/ τρόπος (στ-η)	Στάδιο Ανάπτυξης και εποχή (ι)	Αριθμός Εφαρμογών Ελάχ. Μεγ. (κ)	χρονικό μεσοδιά- στημα μεταξύ των εφαρμογών (ελάχ.)	γρ δ.ο. / εκατόλιτρο ελάχ. μεγ. (λ)	λίτρα ψεκαστ. υγρού / εκτάριο ελάχ. μεγ.	Γρ. δ.ο. /εκτάριο ελάχ. μεγ. (μ)		
Εσπερδοιοδή (Πορτοκαλιές, Λεμονιές, Μανταρινιές, Κλημεντίνες, Γκρέϊπ –φρουτ, Φράπα, Κήτρο Περγαμόντο, Κουμκουατ, Νεραντζιά )	ΕΛ	FOSBEL 80 WP	A	Φυτόφθορα (Phytophthora spp.)	WP	800 gr/kg	Ψεκασμός φυλλώματος	Πρώτος ψεκασμός την άνοιξη, στην αρχή της άνθησης, δεύτερος ψεκασμός το Ιούλιο και τρίτος Οκτώβρη- Νοέμβρη <i>BBCH</i> <i>39- 91 -15</i>	3	3 - 4μήνες	200 - 240	1000 - 1500	2000 - 3600	15	
<b>Μηλοειδή</b> (Μηλιά, Αχλαδιά)	ΕΛ	FOSBEL 80 WP	A	Φυτόφθορα λαμού και ριζών (Phytophthora spp.)	WP	800 gr/kg	Ψεκασμός φυλλώματος	3 ψεκασμοί: ο πρώτος τον Απρίλιο , ο δεύτερος τον Ιούλιο και τρίτος Σεπτέμβρη- Οκτώβρη <i>BBCH 39 – 91</i>	3	~ 1 μήνα	200 - 240	800 - 1200	1600 - 2880	28	
Αμπέλι (οινοποιήσιμο)	ΕΛ	FOSBEL 80 WP	A	Περωνόσπορος (Plasmopara viticola)	WP	800 gr/kg	Ψεκασμός φυλλώματος	Ψεκασμός λίγο πριν την άνθηση και επανάληψη κάθε 10-14 ημέρες, εάν οι συνθήκες είναι ευνοικές για την ανάπτυξη της	4	10 - 14	200 - 240	300 - 1100	600 - 2640	28	

								ασθένειας. <i>BCH 57-85</i>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--