



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Αθήνα, 10 - 12 - 2012
Αριθ. πρωτ: 10607/105541**

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX 210 92 12 090
Πληροφορίες Χ. Παναγοπούλου
Τηλέφωνο 210 92 87 161

e-mail: syg036@minagric.gr

Προς: **INDUSTRIAS AFRASA S.A.**
C/CIUDAD DE SEVILLA 53,
46988 – POLIGONO
INDUSTRIAL, FUENTE DEL
JARRO, PATERNA, VALENCIA
SPAIN
Δια μέσου της εταιρείας
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & Σια
E.E.
Τσιτούρη 22, 152 31 – Χαλάνδρι
E-mail:
a.toutoutzidakis@yahoo.gr
Κοιν.: **ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ**
ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αρ. 60. 336 οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) ALFIL 80 WG ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερο το άρθρο 45 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τη με αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/Β/22-5-2009) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με «Εντολή Υφυπουργού»».
4. Τη με αριθ. πρωτ. 10607/105541/12-10-2012 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε τη με αριθ. **60. 336 οριστική** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **ALFIL 80 WG** που χορηγήθηκε με την αριθ. 6511/67362/21-9-2012 Υπ. απόφαση, ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή

Συγκεκριμένα:

A. Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφαρμ/ ανά καλλ..περίοδο Μεσοδιάστ. Εφαρμογών σε ημέρες
		γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	γρ/ στρέμμα (max)	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιές, Λεμονιές, Μανταρινιές, Κλημεντίνες, Γκρέϊτ –φρουτ, Φράπα, Κίτρο, Περγαμόντο, Κούμκουάτ, Νεραντζιά)	Φυτόφθορα (<i>Phytophthora</i> spp.)	250-300	250 - 450	100 - 150	Πρώτος ψεκασμός την άνοιξη, στην αρχή της άνθησης, δ εύτερος ψεκασμός το Ιούλιο και τρίτος Οκτώβρη-Νοέμβρη	3
Μηλιά Αχλαδιά	Φυτόφθορα λαμού και ριζών (<i>Phytophthora</i> spp.)	250-300	200 - 360	80 - 120	Ο πρώτος τον Απρίλιο , ο δεύτερος τον Ιούλιο και τρίτος Σεπτέμβρη-Οκτώβρη	3
Αμπέλι (οινοποιήσιμο)	Περονόσπορος (<i>Plasmopara viticola</i>)	250-300	75 - 330	30 - 110	Ψεκασμός λίγο πριν την άνθηση και επανάληψη κάθε 10-14 ημέρες, εάν οι συνθήκες είναι ευνοικές για την ανάπτυξη της ασθένειας. (2)	4 /10 - 14

B Το σημείο 13.2 διαμορφώνεται ως εξής:

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Εσπεριδοειδή	15
Μηλιά, Αχλαδιά	28
Αμπέλι (οινοποιήσιμο)	28

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 6511/67362/21-9-2012 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. **60.336 οριστική** έγκριση διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) **ALFIL 80 WG**.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Γεωργικό (ά) Φάρμακο (ά) (κοινή ονομασία)

FOSETYL AL

Σελίδες :

EEC Νο (α)

254-320-2

Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ

Εμπορικό (ά) όνομα (τα)

ALFIL 80 WG

Ημερομ. 8/2011

Κύρια χρήση π.χ. εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο

Μυκητοκτόνο

1	2	3	4	5	6		7				8			9	10
Καλλιεργεία Και/ή Συνθήκες Χρήσης	Κράτος Μέλος ή χώρα	Εμπορικό όνομα του σκευάσμα-τος	(Α) (Θ) (Κ)	Εχθρός, ομάδα εχθρών ή ασθενειών ή ζιζανίων που ελέγχονται	Σκεύασμα		Εφαρμογή				Δοσολογία ανά επέμβαση			Τελευταία Επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες)	Παρατη- ρήσεις
(α)			(β)	(γ)	Μορφή (δ-στ)	Περιεκ- σε δ.ο. (θ)	Μέθοδος/ τρόπος (στ-η)	Στάδιο Ανάπτυξης και εποχή (ι)	Αριθμός Εφαρμογών Ελάχ. Μεγ. (κ)	χρονικό μεσοδιά- στημα μεταξύ των εφαρμογών (ελάχ.)	γρ δ.ο. / εκατόλιτρο ελάχ. μεγ.	λίτρα ψεκαστ. υγρού / εκτάριο ελαχ. μεγ.	Γρ. δ.ο. /εκτάριο ελάχ. μεγ.	(λ)	(μ)
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιές, Λεμονιές, Μανταρινιές, Κλημεντίνες, Γκρέϊτ –φρουτ, Φράπα)	ΕΛ	ALFIL 80 WG	A	Φυτοφθορα (Phytophthora spp.)	WG	800 gr/kg	Ψεκασμός φυλλώματος	Πρώτος ψεκασμός την άνοιξη, στην αρχή της άνθησης, δεύτερος ψεκασμός το Ιούλιο και τρίτος Οκτώβρη- Νοέμβρη BBCH 39- 91 -15	3	3 - 4μήνες	200 - 240	1000 - 1500	2000 - 3600	15	
Μηλιά Αχλαδιά	ΕΛ	ALFIL 80 WG	A	Φυτοφθορα λαϊμού και ριζών (Phytophthora spp.)	WG	800 gr/kg	Ψεκασμός φυλλώματος	3 ψεκασμοί: ο πρώτος τον Απρίλιο , ο δεύτερος τον Ιούλιο και τρίτος Σεπτέμβρη- Οκτώβρη BBCH 39 – 91	3	~ 1 μήνα	200 - 240	800 - 1200	1600 - 2880	28	
Αμπέλι (οινοποιήσιμο)	ΕΛ	ALFIL 80 WG	A	Περωνόσπορος (Plasmopara viticola)	WG	800 gr/kg	Ψεκασμός φυλλώματος	Ψεκασμός λίγο πριν την άνθηση και επανάληψη κάθε 10-14 ημέρες, εάν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. BBCH 57-85	4	10 - 14	200 - 240	300 - 1100	600 - 2640	28	