



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

17 - 4 - 2013

Αθήνα,

Αριθ. πρωτ: 523/5512

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 161
e-mail: syg036@minagric.gr

Προς: **BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ**
Λ. Μεσογείων 449,
153 43 Αγία Παρασκευή.
E-mail:
dimitris.theodosiou@basf.com

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο)
FERANTO 50 WG”

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 810/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουλίου 2011 για την έγκριση της δραστικής ουσίας Kresoxim-methyl, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και την κατάργηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής
7. Την έγκρισή του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **STROBY 50 WG**.

8. Τη με αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/Β/22-5-2009) Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για “Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με «Εντολή Υφυπουργού»».
9. Την από 16-1-2013 αίτηση της εταιρείας BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **FERANTO50 WG** της εταιρείας **BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ** με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

60362
14/4/2013
31/12/2015

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα

FERANTO 50 WG

- 1.2.β Μορφή

ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (WG)

1.3 Δραστική ουσία

Δραστική ουσία	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Kresoxym -methyl
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	91% (β/β) min
Χημική ομάδα	στρομπιλουρίνες
Παρασκευαστής	BASF SE Crop Protection Division P.O. Box 120 67114 Limburgerhof, Γερμανία
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): BASF SE, Crop Protection Division 67 056 Ludwigshafen, Γερμανία.
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν με το με αριθ. πρωτ. Αρ. Πρ. Υ.Α.Α Τ. 111268/ 11-12-04 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι της έγκρισης του φ.π. STROBY 50 WG Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

- | | |
|--|---|
| α) Κάτοχος της άδειας: | BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή.
Τηλ.: 210-6860100
Fax: 210-6860200
E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com |
| α) Υπεύθυνος επικοινωνίας: | BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή.
Τηλ.: 210-6860100
Fax: 210-6860200
E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com |
| β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα) | BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή.
Τηλ.: 210-6860100
Fax: 210-6860200
E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com |
| γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: | BASF SE
Crop Protection Division
P.O. Box 120
67114 Limburgerhof, Γερμανία |
| δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος | Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση):
BASF SE, Crop Protection Division
67 056 Ludwigshafen, Γερμανία. |
| ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος | Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
BASF SE, Crop Protection Division
67 056 Ludwigshafen, Γερμανία. |
| στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: | Δραστική ουσία kresoxim-methyl 50% (β/β)
Βοηθητικές ουσίες 47,4% β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος κατατέθηκε με το με αριθ. πρωτ. Αρ. Πρ. Υ.Α.Α Τ. 111268/ 11-12-04 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας και παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι της έγκρισης του φ.π. STROBY 50 WG Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ |

2 Συσκευασία(ες)**2.2** Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	20,30,40,50,60,75,100,150,200,300, 600 γραμμαρίων	HDPE
2	Σακίδια	20,30,40,50,60,75,100,150,200,300, 600 γραμμαρίων	Χαρτοσακούλα με επένδυση PE

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Διαλύουμε το σκεύασμα σε λίγο νερό. Στη συνέχεια αδειάζουμε το μίγμα στο μισογεμισμένο με νερό βυτίο με συνεχή ανάδευση και απογεμίζουμε το βυτίο με νερό.

Συνδιαστικότητα: Μπορεί να συνδυαστεί με μυκητοκτόνα που ανήκουν σε ομάδες διαφορετικές των στρομπιλουρινών (π.χ. azoxystrobin) ή οξαζολιδινιδιονών (π.χ. famoxadone) και δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με αυτές.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Προϊόν: Καύση σε εγκεκριμένη για το σκοπό αυτό μονάδα, η οποία διαθέτει κατάλληλο κλίβανο αποτέφρωσης.

Συσκευασίες: Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα με κατάλληλο μηχανισμό (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία για διαχείριση τους ως επικίνδυνα απόβλητα. Συστήνεται η καύση τους σε κατάλληλους κλιβάνους, όπως και για το φυτοπροστατευτικό προϊόν.

Συνιστώμενη θερμοκρασία αποτέφρωσης 1100°C.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μη διασυστηματικό μυκητοκτόνο, με προληπτική ή/και θεραπευτική δράση, καθώς και αξιόλογη διάρκεια δράσης (περίπου 15 ημέρες). Δρα παρεμποδίζοντας τη βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου καθώς και την παραγωγή σπορίων. Εμφανίζει διελασματική και τοπικά διεισδυτική δράση και η αποτελεσματικότητά του δεν επηρεάζεται από ενδεχόμενη βροχόπτωση, δύο ώρες μετά την εφαρμογή του.

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής ¹	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο ²
		Γρ./στρέμμα	Γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Αμπέλι	Ωίδιο (<i>Unicinula necator</i>)	20	-	30-150	Προληπτικοί ψεκασμοί, ξεκινώντας πριν από την άνθηση, με μεσοδιάστημα 12-ημερών	3
Μηλιά	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i>)	20	-	100-250	Ο πρώτος ψεκασμός πρέπει να γίνεται στο χρονικό διάστημα που τα δέντρα βρίσκονται μεταξύ του σταδίου της πράσινης κορυφής έως την πρώτη ανάπτυξη των καρπών και οι επόμενοι να ακολουθούν με μεσοδιάστημα 12-14 ημερών.	3 ή 4 εφόσον ο συνολικός αριθμός επεμβάσεων για το φουζικλάδιο στην περιοχή ξεπερνά τις 11 ανά καλλιεργητική περίοδο.
	Ωίδιο (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	20	-	100-250		

Ελιά Βρώσιμη, Ελαιοποιήσιμη	Κυκλοκόνιο <i>(Spilocaea oleagina)</i>	10- 20 ¹	-	100	Έναρξη ψεκασμών μετά τη συλλογή του ελαιοκάρπου όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, χωρίς να υπερβεί η δόση τα 20 gr /στρ σκευάσματος ανά εφαρμογή. Στις βρώσιμες ελιές οι εφαρμογές ξεκινούν μετά τη συγκομιδή και σταματούν πριν την επόμενη άνθηση (κρόκιασμα). Στις ελαιοποιήσιμες ελιές γίνονται κατά μέγιστο 2 εφαρμογές μετά τη συλλογή των καρπών και πριν την άνθηση (Χειμώνας – Άνοιξη) και 1 εφαρμογή όταν ο ελαιοκάρπος είναι παρών (Φθινόπωρο- Χειμώνας).	2 (βρώσιμες) 3 (ελαιοποιή- σιμες)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ <ol style="list-style-type: none"> 1. Η μικρή δόση στην Ελιά συνιστάται για μείγματα με εγκεκριμένα σκευάσματα οργανικού χαλκού και η μεγάλη όταν το προϊόν χρησιμοποιείται μόνο του. 2. Εφόσον υπάρχει σύστημα γεωργικών προειδοποιήσεων, να ακολουθούνται οι γενικές συστάσεις. 3. Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II της παρούσας 						

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκευάσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί

- **Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης ανθεκτικότητας στα παθογόνα στόχους συνιστώνται προληπτικές επεμβάσεις **συνεχόμενες** (μέχρι 3) ή **απλές** (σε εναλλαγή ή σε μίγμα με μυκητοκτόνα που ανήκουν σε ομάδες διαφορετικές των στρομπιλουρινών (π.χ azoxystrobin) ή οξαζολιδινιδιονων (π.χ famoxadone) και δεν εμφανίζουν διασταύρωτη ανθεκτικότητα με αυτές). Στην

ή να αποκλειστεί

περίπτωση που οι αγροτικές προειδοποιήσεις συστήνουν θεραπευτικές επεμβάσεις για το φουζικλάδιο τη μηλιάς, **τότε μόνο (κατ'εξαιρέση)**, μπορεί το σκεύασμα να χρησιμοποιηθεί θεραπευτικά.

- **Να μην διενεργούνται θεραπευτικές επεμβάσεις, εκτός αν συστήνονται από τις αγροτικές προειδοποιήσεις.**
- Να μη χρησιμοποιείται σε αμμώδεις περιοχές με ψυχρά κλίματα και υψηλή βροχόπτωση.
- Να μην εφαρμόζεται σε αμπελώνες ή μηλεώνες που χρησιμοποιούνται για παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού.

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας

μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Πρόσβαση των ανθρώπων: η επανείσοδος σε ψεκασμένες καλλιέργειες είναι δυνατή αφού στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον τηρούνται οι οδηγίες της ετικέτας.

- 9** Σήμανση σκευάσματος

Xn - Επιβλαβές
N - Επικίνδυνο για το περιβάλλον

- 10** Φράσεις R

R 40 - Ύποπτο καρκινογένεσης.
R 50/53 - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

11 Φράσεις S

S 1/2 - Φυλάξτε το κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
 S 13 - Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
 S 20/21 - Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.
 S 36/37 - Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
 S 60 - Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεση τους επικίνδυνα απόβλητα.
 S 61 - Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον.
 SP 1 - Μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
 SPe3 - Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μian αφέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης».

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Γενικές πληροφορίες: Αποφύγετε επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε ψεκαστικό υγρό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο, την ετικέτα και/ή το φύλλο ορθού χειρισμού στον γιατρό.

Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατήστε τον παθόντα ήρεμο και μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν αναπτυχθεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά κάτω από τρεχούμενο νερό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα και πιείτε αρκετό νερό. Ζητήστε ιατρική φροντίδα. Μην προκαλείτε εμετό εκτός αν σας δοθεί τέτοια εντολή από κέντρο δηλητηριάσεων ή γιατρό. Ποτέ μην προκαλείτε εμετό και μη χορηγείτε τίποτα από το στόμα εάν το θύμα δεν έχει τις αισθήσεις του ή αν έχει σπασμούς.

ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. Δεν είναι γνωστό συγκεκριμένο αντίδοτο.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 - 77 93 777.

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs): Έχουν οριστεί Κοινοτικά MRL's (Καν. 396/2005)

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αμπέλι	35
Μηλιά	28
Ελιά, Ελαιοποιήσιμη	30
Ελιά , Βρώσιμη	-

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το σκεύασμα διατηρείται για δύο (2) χρόνια, αν αποθηκευθεί στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό δροσερό και καλά αεριζόμενο

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

Η έγκριση θα ανακληθεί στην ημερομηνία λήξης της εάν ο κάτοχος της έγκρισης δεν υποβάλει το αργότερο έως τις 31-12-2013, ζωνική αίτηση για το προϊόν αναφοράς (STROBY 50 WG) ;όπως αναφέρεται στην με αριθμ πρωτ. 103740 π.ε./14-3-2012 απόφαση για την τροποποίηση της με αριθ. 6856 οριστικής έγκρισης στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) STROBY 50 WG ως προς την ημερομηνία λήξης της έγκρισης και τις προϋποθέσεις διατήρησης της έγκρισης.

B**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ ηλεκτρονικά τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

M. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ