



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**19- - 11 - 2013**

**Αθήνα,**

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Αριθ. πρωτ: 12227/141872**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150**  
**Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ**

**TELEFAX: 210 92 12 090**  
**Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου**  
**Τηλέφωνο: 210 92 87 161**  
**e-mail: [syg036@minagric.gr](mailto:syg036@minagric.gr)**

**Προς: SAPEC AGRO S.A.**  
Alameda dos Oceanos lote  
1.06.1.1 – 3<sup>ο</sup>A  
Parque das Naçdes,  
1990-207, Lisboa, Πορτογαλία  
**Δια μέσου της εταιρείας**  
**Τουτουτζιδάκης Αντώνιος &**  
**ΣΙΑ Ε.Ε.**  
Τσιτούρη 22, 152 31 Χαλάνδρι  
Τηλ.: 210 6725174  
E-mail: [aconsumt@otenet.gr](mailto:aconsumt@otenet.gr)

**ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αριθμό 14.420 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) KARAKAS 10 CS ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ”**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Ο**

**ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Το από 30 /10 /2013 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
4. Τη με αριθ. Πρωτ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/10.09.2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράψουν «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού»»

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- 1** Τροποποιούμε την με αριθμό 14.420 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) **KARAKAS 10 CS** , που χορηγήθηκε με την αρ.πρωτ.9572/96583/8-4-2013 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

## Συγκεκριμένα

## Α. Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής

| 5               |   | 5.1 Φάσμα δράσης           |                                  |                       | Χρόνος εφαρμογής  | Μέγ. αριθμός εφαρμ/ ανά καλλ..περίοδο Μεσοδιάστ. Εφαρμογών σε ημέρες |
|-----------------|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|---|--|
| Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος  | Δόσεις σκευάσματος         |                                  |                       |   |  |
|                 |   | κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού | Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα | κ. εκ./ στρέμμα (max) |   |  |
| Μηλιά           | Καρπόκαψα ( <i>Cydia pomonella</i> )                  | 7,5-10                     | 100                              | 10                    | Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής  | 1-2/14 ημέρες  |
|                 | Αφίδες ( <i>Aphis fabae</i> , <i>Myzus persicae</i> ) | 10                         | 100                              | 10                    | Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής  |  |
| Αχλαδιά         | Καρπόκαψα ( <i>Cydia pomonella</i> )                  | 7,5-10                     | 100                              | 10                    | Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής  | 1-2/14 ημέρες  |
|                 | Αφίδες ( <i>Aphis fabae</i> , <i>Myzus persicae</i> ) | 10                         | 100                              | 10                    | Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής  |  |
|                 | Ψύλλα ( <i>Cacopsylla pyri</i> )                      | 20-30                      | 100                              | 30                    | Ψεκασμοί κατά την Άνοιξη όταν ο πληθυσμός είναι χαμηλός και το Φθινόπωρο με την έναρξη της πτώσης των φύλλων εναντίων των ακμαίων που πρόκειται να διαχειμάσουν |  |
| Ελιά            | Πυρηνοτρήτες ( <i>Prays oleae</i> )                   | 7,5                        | 100                              | 7,5                   | Ψεκασμός με την έναρξη της εναπόθεσης των ωών   | 1-2/14 ημέρες  |

|   |   |       |     |      |  |   |
|---|---|-------|-----|------|--|---|
| Αμπέλι  | Ευδεμίδα<br>( <i>Lobesia botrana</i> )  | 17,5  | 100 | 17,5 | Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής                               | 1-2/14 ημέρες   |
|   | Πυραλίδα<br>( <i>Sparganothis pilleriana</i> )  | 7,5   | 100 | 7,5  | Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής                               |   |
| Τομάτα<br>Υπαίθρου  | Πράσινο σκουλήκι<br>( <i>Helicoverpa armigera</i> )   | 20-25 | 100 | 25   | Ψεκασμός όταν ο πληθυσμός αρχίζει και αυξάνει σε επίπεδο προβλήματος | Μια εφαρμογή ανά εχθρό και το μέγιστο 2 (δύο) εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο |
|   | Αλευρώδης<br>( <i>Bemisia tabaci</i> ,<br><i>Trialeurodes vaporariorum</i> )                                | 15-20 | 100 | 20   | >>   |   |
|   | Αγρότιδα<br>( <i>Agrotis segetum</i> )  | --    | 100 | 7,5  | Καθολικός ψεκασμός στο έδαφος, πριν την έναρξη της προσβολής         |   |
| Πιπεριά<br>Υπαίθρου   | Αλευρώδης<br>( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> )   | 15-20 | 100 | 20   | Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής                               | 1-2/14 ημέρες   |
| Μαρούλι   | Αφίδες<br>( <i>Myzus persicae</i> )   | 12,5  | 100 | 12,5 | Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής                               | 1-2/14 ημέρες   |
| Λάχανο,<br>Κόκκινο<br>λάχανο,<br>Ρέβες,<br>Κουνουπίδι,<br>Μπρόκολο.<br>Λαχανάκια<br>Βρυξελλών | Περίδα<br>( <i>Pieris brassicae</i> και<br><i>Pieris rapae</i> )<br>Μαμέστρα<br>( <i>Autographa gamma</i> ) | 7,5   | 100 | 7,5  | Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής                               | 1-2/14 ημέρες   |
|   | Αλευρώδης<br>( <i>Aleyrodes proletella</i> )  | 15-20 | 100 | 20   | Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής                               |   |
|   | Αγρότιδα<br>( <i>Agrotis segetum</i> )  | --    | 100 | 7,5  | Καθολικός ψεκασμός στο έδαφος, πριν την έναρξη της προσβολής.        | 1   |

|                              |  |             |       |     |   |               |
|------------------------------|--|-------------|-------|-----|---|---------------|
| Φασολάκια<br>Υπαίθρου        | Αλευρώδης<br>( <i>Trialeurodes<br/>variorariorum</i> )   | 15-20       | 100   | 20  | Ψεκασμός με την<br>εμφάνιση της<br>προσβολής  | 1             |
| Πατάτα                       | Δορυφόρος<br>( <i>Leptinotarsa<br/>decemlineata</i> )  | --          | 50-80 | 10  | Ψεκασμός με την<br>εμφάνιση της<br>προσβολής  | 1-2/14 ημέρες |
|                              | Αγρότιδα<br>( <i>Agrotis<br/>segetum</i> )   | --          | 100   | 7,5 | Καθολικός ψεκασμός<br>στο έδαφος πριν την<br>έναρξη της<br>προσβολής  | 1             |
| Βρώμη,<br>Σιτάρι,<br>Κριθάρι | Αφίδες<br>( <i>Metopolophiu<br/>m dirhodum,<br/>Rhopalosiphu<br/>m padi,<br/>Sitobion<br/>avenae</i> ) | --          | 50    | 7,5 | Ψεκασμός με την<br>εμφάνιση της<br>προσβολής.   | 1             |
| Καλαμπόκι                    | Πυραλίδα<br>( <i>Ostrinia<br/>nubilalis</i> )  | --          | 50    | 20  | Ψεκασμός με την<br>εμφάνιση της<br>προσβολής  | 1             |
|                              | Αγρότιδα<br>( <i>Agrotis<br/>segetum</i> )   | --          | 50    | 7.5 | Καθολικός ψεκασμός<br>στο έδαφος, πριν την<br>έναρξη της<br>προσβολής   | 1             |
| Ζαχαρότευτλα                 | Αφίδες<br>( <i>Aphis fabae,<br/>Myzus<br/>persicae</i> )   | 15          | 100   | 15  | Ψεκασμός με την<br>εμφάνιση της<br>προσβολής  | 1             |
| Φοινικοειδή                  | Κόκκινο<br>σκαθάρι των<br>φοινικοειδών<br>( <i>Rhynchophorus<br/>ferrugineus</i> )<br>Olivier          | <b>8-15</b> | ---   | --- | -Ψεκασμός κάλυψης<br>από τη στεφάνη για την<br>προστασία των<br>φοινικοειδών από τις<br>προσβολές του<br>εντόμου.<br><br>-Ψεκασμός κάλυψης<br>για περιορισμό της<br>εξάπλωσης της<br>προσβολής στο<br>κομμένο φυτό, στα<br>κομμένα τεμάχια και<br>στο χώρο γύρω από τη<br>θέση κοπής, κατά τη<br>διαδικασία της κοπής.<br><br>-Στο χώρο διατήρησης<br>των ευπαθών φυτών<br>(φυτώρια): σε<br>περίπτωση που<br>υπάρχουν ύποπτα<br>σημεία προσβολής στο<br>χώρο ή στη γύρω<br>περιοχή, προληπτική<br>εφαρμογή με ψεκασμό<br>κάλυψης των φυτών<br>(στα φυτώρια τα | 2             |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | φοινικοειδή έχουν μικρό ύψος και μπορεί να γίνει ψεκασμός κάλυψης). |
| Παρατηρήσεις:  |  |  |  |  |   |
| 1) Ακολουθείστε τις οδηγίες των γεωργικών προειδοποιήσεων όπου εφαρμόζονται.                             |  |  |  |  |   |
| <b>Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II της παρούσας</b> |  |  |  |  |   |

## B. Το σημείο 13 διαμορφώνεται ως εξής

### 13 Προστασία των καταναλωτών

#### 13.2 Τελευταία

επέμβαση

πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

| Φυτικά προϊόντα  | Ημέρες |
|--|--------|
| Μηλιά, Αχλαδιά, Αμπέλι, Μαρούλι, Λάχανο, Κόκκινο λάχανο, Ρέβες, Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Λαχανάκια Βρυξελλών, Φασολάκια, Πατάτα, Ζαχαρότευτλα | 7      |
| Τομάτα, Πιπεριά  | 3      |
| Βρώμη, Σιτάρι, Κριθάρι   | 28     |
| Καλαμπόκι  | 60     |
| Ελιά   | 120    |

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. **9572/96583/8-4-2013** Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ.14.420 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (**εντομοκτόνο**) **KARAKAS 10 CS** όπως ισχύει σήμερα

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
α/α

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ