



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 21.10.2020
Αριθ. πρωτ: 10817/287329**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΛΕΦΑΧ: 210 9212090
Πληροφορίες: Μαρία Γάσπαρη
Τηλέφωνο: 210 928 7250
e-mail: mgaspari@minagric.gr**

**Προς: Luxembourg Pamol Cyprus
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
MedPest Consultancy Office
κ. Κ. Μαρκάκη)**

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 60491 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) LBG-01F34 (δ.ο. potassium phosphonates) ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις) και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
4. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 απόφαση (ΦΕΚ Β'/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
5. Τη με αριθ. πρωτ. 2256/25263/27-2-2013 εγκύκλιο της Υπηρεσίας με θέμα «Προστασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 59 και 80.2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 και κοινοχρησία μελετών σε σπονδυλωτά σύμφωνα με το άρθρο 62 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009»
6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
7. Τη με αριθ. πρωτ. 4933/75184/25-05-2018 (ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας.
8. Το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει.
9. Τις με αριθ. πρωτ. 4726/127761/19-5-2020 και 5989/162780/22-6-2020 αξιολογήσεις της αρμόδιας αρχής.
10. Τις από 11-12-2018 και 12-11-2019 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας και τα από 14-10-2020 συμπληρωματικά στοιχεία και παράβολα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Α. Τροποποιούμε τα σημεία 5 και 13 της με αριθ. **60491** άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **LBG-01F34 (δ.ο. potassium phosphonates)**, που χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 6950/82281/22-12-2015 ΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τα παρακάτω:

5 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		L/ στρέμμα ⁶	ml/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Αμπέλι (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο) <i>Vitis vinifera</i> VITVI	Περονόσπορος (<i>Plasmopara viticola</i>)	0,4	300-400	20-100	Προληπτικοί ψεκασμοί με μεσοδιάστημα 10 ημερών μεταξύ των εφαρμογών. Το σκεύασμα χρησιμοποιείται στα στάδια από το 6ο φύλλο μέχρι το στάδιο πριν το κλείσιμο της σταφυλής*	5
Σπανάκι <i>Spinacea oleracea</i> SPQOL (Χρήση ήσσονος σημασίας) ⁴	Περονόσπορος <i>Peronospora farinosa</i> var. <i>spinaceae</i> PEROFS	0,106	-	20-50	Προληπτικοί ψεκασμοί με μεσοδιάστημα 7 ημερών μεταξύ των εφαρμογών. Το σκεύασμα χρησιμοποιείται στα στάδια από το 2ο φύλλο μέχρι το στάδιο σχηματισμού του τυπικού μεγέθους του μεγέθους της κεφαλής (BBCH 12-49)	2
Μελιτζάνα <i>Solanum melongena</i> SOLME (Χρήση ήσσονος σημασίας) ⁴	Περονόσπορος <i>Phytophthora infestans</i> PHYTIN Αλτερνάρια <i>Alternaria solani</i> ALTESO	0,437	-	20-50	Προληπτικοί ψεκασμοί με μεσοδιάστημα 7-14 ημερών μεταξύ των εφαρμογών. Το σκεύασμα	5

					χρησιμοποιείται στάδιο που το 10% των καρπών παρουσιάζει τον τυπικό χρωματισμό της ποικιλίας (BBCH 81)	
Βατόμουρα <i>Rubus sect. rubus</i> RUBSS Σμέουρα (ερυθρά και κίτρινα) <i>Rubus idaeus</i> RUBID Μύρτιλλα <i>Vaccinium angustifolium</i> VACAN Μύρτιλλα μακρόκαρπα <i>Vaccinium macrocarpon</i> VACMA Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, μαύρα ή άσπρα) <i>Ribes nigrum</i> RIBNI <i>Ribes rubrum</i> RIBRU Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, πράσινα ή κίτρινα) <i>Ribes uva-crispa</i> RIBCU (Χρήσεις ήσσονος σημασίας)⁴	Περονόσπορος <i>Phytophthora sp.</i> PHYTSP	0,546	-	20-100	Προληπτικοί ψεκασμοί με μεσοδιάστημα 10-30 ημερών μεταξύ των εφαρμογών. Το σκεύασμα χρησιμοποιείται στάδιο φουσκώματος των ανθών μέχρι την αρχή της ωρίμανσης (BBCH 51-81)	3
Καλλωπιστικά Φυτά NNNZZ (Χρήση ήσσονος σημασίας)^{4,5}	Περονόσπορος <i>Peronospora sparsa</i> (PSPESR) <i>Plasmopara halstedii</i> (PLASHA)	0,3	-	20-50	Προληπτικοί ψεκασμοί μεσοδιάστημα 7-10 ημερών μεταξύ των εφαρμογών.	4
Παρατηρήσεις: 1.Συνιστάται ο συνδυασμός του LBG-01F34 με εγκεκριμένα μυκητοκτόνα επαφής δραστικής ουσίας						

mancozeb, folpet για να επιτυγχάνεται καλύτερη προστασία των φυτών και ειδικά μετά την άνθηση ή όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. Σε αυτή την περίπτωση συστήνεται να γίνεται χρήση της ελάχιστης δόσης (0,3L/στρέμμα) με μεσοδιάστημα 12-14 ημερών, ανάλογα με την ένταση της προσβολής.

2. Σε περίπτωση ανάμειξης να ακολουθείται ο μακρύτερος χρόνος επέμβασης πριν την συγκομιδή και να τηρούνται οι πιο αυστηρές συστάσεις προφύλαξης που αναγράφονται στην ετικέτα των σκευασμάτων.

3. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται τα προγράμματα γεωργικών προειδοποιήσεων να ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων.

4. Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις χρήσεις ήσσονος σημασίας στο σπανάκι, στη μελιτζάνα, στα βατόμουρα, στα μύρτιλλα, στα σμέουρα, στα φραγκοστάφυλα και στα ανθοκομικά φυτά από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του, επομένως η χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

5. Δεδομένου ότι στα καλλωπιστικά φυτά υπάρχουν πολλές ποικιλίες με διαφορετικά επίπεδα ευαισθησίας, συνιστάται πριν από τη χρήση να διεξαχθούν δοκιμαστικές εφαρμογές σε μικρό αριθμό φυτών.

6. Οι αναφερόμενες δόσεις έχουν υπολογιστεί σε potassium phosphonates.

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αμπέλι	14
Σπανάκι	14
Μελιτζάνα	3
Βατόμουρα, Μύρτιλλα, Σμέουρα, Φραγκοστάφυλα (όπως αναφέρονται στο φάσμα δράσης)	14
Καλλωπιστικά	Μη εφαρμόσιμο

Β Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 6950/82281/22-12-2015 ΥΑ απόφασή μας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
κ.α.α.

Δ.ΜΗΛΑΙΟΣ