



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 26 - 3 - 2014  
Αριθ. πρωτ: 3035/34711

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Κ. Μαρκάκης  
Τηλέφωνο: 210 928 7226  
e-mail: [syg061@minagric.gr](mailto:syg061@minagric.gr)

Προς: ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.  
Τ.Θ. 600 36, 15310-Αγ. Παρασκευή

Κοιν.: Εσωτερική διανομή:  
Τμήμα Δ της Δ/νσής μας  
(Υπόψη κου Κ. Μαρκάκη)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ.  
14025/13-5-2008 οριστικής  
έγκρισης του  
φυτοπροστατευτικού  
προϊόντος (εντομοκτόνο)  
LASER ως προς το φάσμα  
δράσης (διεύρυνση σε  
ήσσονος σημασίας χρήση)»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

## ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερο το άρθρο 45 αυτού.
2. Τον Ν. 4036 (ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012) σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, την ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Την με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 (ΦΕΚ Β΄/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας»
4. Την με αρ. πρωτ. 118687/13-5-2008 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14025 **οριστική** έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) LASER (δ.ο. spinosad 48%) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

5. Τις με αριθ. πρωτ. 185192/2-6-2010, 2715/31010/15-3-2012 και 4362/47777/15-5-2013 αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τις οποίες διευρύνθηκε το φάσμα δράσης του σκευάσματος LASER (δ.ο. spinosad 48%)
6. Τη με αριθ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν «“με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”»
7. Τη με αριθ. Πρωτ. 3035/34711/13-3-2014 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
8. Τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. 14025/13-5-2008 οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) LASER (δ.ο. spinosad 48%), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 118687/13-5-2008 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**Συγκεκριμένα τα σημεία 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:**

5						
5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Εχθρός	Δόσεις εφαρμογής*			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδο
		γρ. δ.ο./ στρέμμα	κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρέμμα		
ΜΗΛΟΕΙΔΗ Μηλιά, Αχλαδιά	Καρπόκαψα των μήλων <i>Cydia pomonella</i> Νάρκη των γιγαρτοκάρπων <i>Lithocolletis blancardella</i>	9,6-18	20-30	100-125	Εφαρμογές σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις και επανάληψη μετά από 7-14 ημέρες.	3
Αχλαδιά**	Ψύλλα της αχλαδιάς <i>Cacopsylla pyri</i>	14,4-21	30-35	100-125	Εφαρμογές σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις και επανάληψη μετά από 7-14 ημέρες	3
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερυκοκιά	Βλαστορύκτης της ροδακινιάς <i>Anarsia lineatella</i>	9,6	20	100	Εφαρμογές σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις και επανάληψη μετά από 7-14 ημέρες	3
Αμπέλι	Ευδεμίδα <i>Lobesia botrana</i>	1,92-8,64	10-15	40-120	Η εφαρμογή, στην 2 <sup>η</sup> και στην 3 <sup>η</sup> γενιά, μπορεί να γίνει είτε στο μέγιστο των πτήσεων ή στην έναρξη των πτήσεων του εντόμου και επαναλαμβάνεται μετά 7-10 ημέρες και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις	4

	Θρίπας της Καλιφόρνιας <i>Frankliniella occidentalis</i>	3,84-9,6	20-25	40-80	Η εφαρμογή γίνεται στην έναρξη (10-20%) της ανθοφορίας και όταν υπάρχουν 1-2 θρίπες (κινητές μορφές) ανά τσαμπί και επαναλαμβάνεται μετά 7-10 ημέρες..	
--	---	----------	-------	-------	--	--

Πεδίο Εφαρμογής	Εχθρός	Δόσεις			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδο
		γρ. δ.ο./ στρέμμα	κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα/ στρέμμα		
Τομάτα (Υ)***	Φυλλορύκτης <i>Liriomyza spp</i>	12-14,4	50	50-60	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επαναλαμβάνεται, αν χρειάζεται, μετά από 10 ημέρες	3
Τομάτα (Θ)***	Φυλλορύκτης <i>Liriomyza spp</i>	12-54	50-75	50-150		
	Θρίπας Καλιφόρνιας της <i>Frankliniella occidentalis</i>	4,8-18	20-25	50-150		
Τομάτα (Θ/Υ)	<i>Spodoptera spp</i>	6-14,4	25-30	50-100	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών και επαναλαμβάνεται αν χρειάζεται, μετά από 7-10 ημέρες	
Πιπεριά (Υ)	Φυλλορύκτης <i>Liriomyza spp</i>	12-14,4	50	50-60	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επαναλαμβάνεται, αν χρειάζεται, μετά από 10 ημέρες	3
Πιπεριά (Θ)	Φυλλορύκτης <i>Liriomyza spp</i>	12-36	50-75	50-100		
	Θρίπας Καλιφόρνιας της <i>Frankliniella occidentalis</i>	4,8-12	20-25	50-100		

Πεδίο Εφαρμογής	Εχθρός	Δόσεις			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδο
		γρ. δ.ο./ στρέμμα	κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα/ στρέμμα		
Φράουλα (Θ)	Θρίπας Καλιφόρνιας <i>Frankliniella occidentalis</i> της	4,8-12	20-25	50-100	Η εφαρμογή γίνεται όταν υπάρχουν 1-2 θρίπες (κινητές μορφές) ανά άνθος και επαναλαμβάνεται αν χρειάζεται, μετά από 10 ημέρες	3
Βαμβάκι	Πράσινο σκουλήκι <i>overpra armigera</i>	7,2-9,6	15-20 ml/στρ	50-80	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών και επαναλαμβάνεται, αν χρειάζεται, μετά από 10 ημέρες	3
Πατάτα	Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i>	2,4	5	100	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών και επαναλαμβάνεται, αν χρειάζεται, μετά από 7-10 ημέρες	3
Φιστικιά (καλλιέργεια ήσσοнос σημασίας) <sup>1</sup>	Ψύλλα της φιστικιάς ( <i>Agonosцена spp.</i> )	14,4	30	100	Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση ωών και νυμφών στα φύλλα. Μεσοδιαστήματα 14-21 ημέρες Έως 3 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο.	3
Σπανάκι (καλλιέργεια ήσσοнос σημασίας) <sup>1</sup>	Θρίπας <i>Thrips tabaki</i>  Θρίπας Καλιφόρνιας ( <i>Frankliniella occidentalis</i> )	9,6	20-25	40-80	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων ενηλίκων και επαναλαμβάνεται, αν χρειάζεται, μετά από 7-10 ημέρες	3

Ρόκα (καλλιέργεια ήσσονος σημασίας)	Θρίπας Καλιφόρνιας ( <i>Frankliniella occidentalis</i> )	9,6	20-25	40-80	Ρόκα	3
Σαλάτα (θερμοκηπίου γαλλική <i>Lactuca sativa var. capitata</i> ) (καλλιέργεια ήσσονος σημασίας) <sup>1</sup>	-Θρίπας της Καλιφόρνιας ( <i>Frankliniella occidentalis</i> )	9,6	40-80 λίτρα	40-80	Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών	3

**Παρατηρήσεις:**

\* Η δόση είναι ανάλογη της πυκνότητας του πληθυσμού των εντόμων.

\*\* Συνιστάται συνδυασμός με παραφινικό λάδι στη δόση 250 κ.εκ./hl στην αχλαδιά για αντιμετώπιση της ψύλλας *Psylla pyri*, για αύξηση της αποτελεσματικότητας .

\*\*\* Στην τομάτα, αγρού και θερμοκηπίου, για την αντιμετώπιση του φυλλορύκτη, το LASER 480 SC μπορεί να εφαρμοστεί στη δόση 35-50 κ.εκ./ σκευάσματος/hl σε συνδυασμό με παραφινικό λάδι στη δόση 300 κ.εκ./hl.

Επανάληψη εφαρμογής εφόσον βρέξει μέσα σε 4 ώρες.

<sup>1</sup> Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες φυσικιάς, σπανάκι, ρόκα, σαλάτα θερμοκηπίου από τη χρήση του σκευάσματος.

Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του.

**13****Προστασία των καταναλωτών**

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργειες	ΡΗΙ(ημέρες)
Μηλιά	7 ημέρες
Αχλαδιά	7 ημέρες
Αχλαδιά ( εφαρμογές για καταπολέμηση της ψύλλας}	14 ημέρες
Βερικοκιά	7 ημέρες
Ροδακινιά	7 ημέρες

Νεκταρινιά	7 ημέρες
Αμπέλι	14 ημέρες
Τομάτα	3 ημέρες
Πιπεριά	3 ημέρες
Φράουλα	1 ημέρα
Πατάτα	7 ημέρες
Βαμβάκι	21 ημέρες
Φιστικιά	7 ημέρες
Σπανάκι	3 ημέρες
Ρόκα	3 ημέρες
Σαλάτα θερμοκηπίου	3 ημέρες

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 118687/13-5-2008 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) LASER (δ.ο. sprinosad 48%).

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ**

**α.α.**

**Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ**