



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Αθήνα, 23-7-2014  
Αριθ. πρωτ: 7882/85780**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Ηλ. Νασσιόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 928 7211  
e-mail: [svg046@minagric.gr](mailto:svg046@minagric.gr)**

**Προς: BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ  
Σωρού 18-20  
15125-ΜΑΡΟΥΣΙ**

**ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 6757 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) FOLICUR 25 WG (δραστική ουσία: tebuconazole), ως προς το φάσμα δράσης, τα εικονογράμματα κινδύνου (πρώην σημάνσεις), τις δηλώσεις κινδύνου (πρώην φράσεις κινδύνου), τις δηλώσεις προφύλαξης (πρώην φράσεις προφύλαξης) και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή»**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο**

**ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 80 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον Κανονισμό 1272/08 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-12-08 “για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006”, καθώς και τη με αριθ. 7923/87577/12.7.13 εγκύκλιο της Δ/σης Προστασίας Φυτ. Παραγωγής.
4. Τον Κανονισμό 61/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24-1-14, “για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες cyromazine, fenpropidin, formetanate, oxamyl και tebuconazole μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα”.
5. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.13 (ΦΕΚ 2240/Β'/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”».
6. Το σχετικό Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
7. Τις με α.π. 3709/39890/26.3.14 και 7882/85780/2.7.14 αιτήσεις της εταιρείας BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

- Α.** Τροποποιούμε την με αριθ. 6757 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) FOLICUR 25 WG (δραστική ουσία: tebuconazole) που χορηγήθηκε με τη αριθ. 105266/4.6.04 Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 186220/16.6.10 και 6038/65212/18.6.13 Αποφάσεις μας, ως προς το φάσμα δράσης, τα εικονογράμματα κινδύνου (πρώην σημάνσεις), τις δηλώσεις κινδύνου (πρώην φράσεις κινδύνου), τις δηλώσεις προφύλαξης (πρώην φράσεις προφύλαξης) και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή. Οι παράγραφοι 5, 9, 10, 11 και 13.2 της με αριθ. 186220/16.6.10 Απόφασής μας, διαμορφώνονται ως ακολούθως:



**5** 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες
		γρ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα	γρ./ στρέμμα (Μέγιστο)		
<b>Μηλιά</b>	<b>Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis)</b>	<b>40</b>	<b>100-150</b>	<b>60</b>	Εφαρμογές από το φούσκωμα των ανθοφόρων οφθαλμών (λίγο πριν την ρόδινη κορυφή) έως το τέλος της άνθησης και την πτώση των πετάλων.	2/14
<b>Ροδακινιά, Νεκταρινιά</b>	<b>Ωίδιο (Sphaerotheca pannosa)</b>	<b>50</b>	<b>150</b>	<b>75</b>	Εφαρμογές από το στάδιο της εμφάνισης του καρπιδίου έως την πλήρη ωρίμανση και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από τους DMIs.	2/14
	<b>Μονίλια (Monilinia laxa)</b>	<b>50-75*</b>	<b>100-150*</b>	<b>75</b>	Εφαρμογές από το στάδιο της εμφάνισης του καρπιδίου έως την πλήρη ωρίμανση και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από τους DMIs.	2/14
<b>Αμπέλι (Επιτραπέζιες ποικιλίες)</b>	<b>Ωίδιο (Uncinula necator)</b>	40	80-100	40	<b>Εφαρμογές από την έναρξη της άνθησης μέχρι το τέλος της άνθησης ανά 12-14 ημέρες.</b>	2/12-14
<b>Αμπέλι (Οινοποιήσιμες ποικιλίες)</b>	<b>Ωίδιο (Uncinula necator)</b>	40	80-100	40	Εφαρμογές από το στάδιο της καρπόδεσης μέχρι το κλείσιμο της σταφυλής ανά 12-14 ημέρες.	2/12-14
<b>Σπαράγγι</b>	<b>Σκωρίαση (Puccinia asparagi)</b>	--	100	100	Εφαρμογές μετά τη συγκομιδή από Ιούλιο μέχρι Σεπτέμβριο εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας με μεσοδιάστημα 14 ημέρες.	2/14

**\*Παρατήρηση:** Στα **Πυρηνόκαρπα** για την καταπολέμηση της **Μονίλιας** ο μεγάλος όγκος νερού (150 λίτρα/στρέμμα) να χρησιμοποιείται με τη χαμηλή δόση σκευάσματος ανά εκατόλιτρο (50 γρ. σκ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού) έτσι ώστε η τελική δόση να μην ξεπερνάει τα 75 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. **Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει Υπέρβαση του Μέγιστου Επιτρεπόμενου Ορίου Υπολειμμάτων.**

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μηλιά	35 ημέρες
Ροδακινιά	7 ημέρες
Νεκταρινιά	7 ημέρες
<b>Αμπέλι (Επιτραπέζιες ποικιλίες)</b>	<b>Εφαρμογή μέχρι το τέλος της άνθησης</b>
Αμπέλι (Οινοποιήσιμες ποικιλίες)	21 ημέρες
Σπαράγγι	6 μήνες

<b>9.</b> ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ	  GHS08                      GHS09	<b>ΠΡΟΣΟΧΗ</b>
<b>10.</b> ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ	<b>H361d</b> Υποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. <b>H411</b> Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. <b>EUH401</b> Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.	
<b>11.</b> ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ	<b>P405 + P102</b> Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. <b>P270</b> Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. <b>P201</b> Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. <b>P220</b> Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. <b>P281</b> Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. <b>SP 1</b> Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.	

Παρατήρηση: Η ανωτέρω ταξινόμηση και επισήμανση που είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, θα είναι υποχρεωτική από την 1<sup>η</sup> Ιουνίου 2015. Μέχρι τότε το σκεύασμα δύναται να κυκλοφορεί με τη σήμανση που αναγράφεται στη με αριθ. 186220/16.6.10 Απόφασή μας.

**Β.** Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 186220/16.6.10 Απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 6038/65212/18.6.13 Απόφασή μας.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ**  
**ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**  
 α/α

**Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ**