



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

3 - 1 - 2014

Αθήνα,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αριθ. πρωτ: 10517/120830 π.ε.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
 Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
 TELEFAX: 210 92 12 090
 Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου
 Τηλέφωνο: 210 92 87 161
 e-mail: syg036@minagric.gr

Προς: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
 Σωρού 18-20, Μαρούσι
 Τ.Κ. 151 25
 E-mail: nikos.tsakalis@bayer.com

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) **CONSIST 50 WG**”

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 823/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με παρέκκλιση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τις ημερομηνίες λήξης της έγκρισης των δραστικών ουσιών **trifloxystrobin**.

7. Την έγκρισή του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος **μυκητοκτόνου FLINT 50 WG**.
8. Την από 18/12/2013 εισήγηση της Υπηρεσίας.
9. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.13 (ΦΕΚ 2240/Β'/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράψουν “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
10. Την από 7-10-2013 αίτηση της εταιρείας Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **CONSIST 50 WG** της εταιρείας Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

60.397
3/1/2014
31-7-2016

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα

CONSIST 50 WG

- 1.2.β Μορφή:

Εναιωρηματοποιησιμοι κόκκοι

1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (εξ)

Δραστική ουσία 1	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	trifloxystrobin
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	96 % (β/β) min
Χημική ομάδα	Ομάδα δρώντος Qols (Quinone outside Inhibitors), υποομάδα oximinoacetates
Παρασκευαστής	Bayer CropScience AG Industrial Operations, Alfred Nobel Str. 50
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): Bayer CropScience AG Industrial Operations, CH-4132 Muttenz, Switzerland
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν με το με αριθ. πρωτ. 115977/14-11-2003 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Bayer Ελλάς ABEE
Σωρού 18-20, Μαρούσι
ΑΜΕ: 2724 / 01ΑΤ / Β / 86 / 685
Τ.Κ. 151 25
Τηλ.: 210 6166000
Fax: 210 6109100
E-mail: www.bayercropscience.gr

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Bayer Ελλάς ABEE
Ταχ. Δ/ση: Σωρού 18-20, Μαρούσι
Τ.Κ.: 151 25
Τηλ.: 210 6166374
Fax: 210 6109100
E-mail: nikos.tsakalis@bayer.com

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Bayer CropScience A.G.

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση):

1. Agraform LLC
133 East Krauss Street
St Louis, MO 62111, USA
2. Bayer CropScience AG
Alte Heerstrasse, 41538 Dormagen
Germany
3. Exwold Technologies Ltd
PO Box 270, Brenda Road
Hartlepool TS25 2BW, United Kingdom
4. Bayer CropScience (China) Co.Ltd.
No.5 Road, Hangzhou Economic &
Technological
Development Zone, Hangzhou, 310018
P.R. China
5. Bayer CropScience Limited
Plot No.: 66/1 to 75/2 G.I.D.C. Incl.
Estate, Himatnagar - 383001
Dist. Sabarkantha, Gujarat, India
6. Kwizda Agro GmbH
Kwizdaallee 1, 2100 Leobendorf, Austria
7. Bayer SAS, Bayer CropScience
Site de Marle
Rue Antoine Laurent de Lavoisier ZI
BP2
02250 Marle-sur-Serre, Zone Industrielle
France
8. SBM Formulation S.A.
Z.I. AV. Jean Foucault
CS 621, 34535 Beziers Cedex, France
9. Schirm GmbH
Standort Lübeck,
Mecklenburger Strasse 229

23568 Lübeck, Germany

10. Bayer SAS, Bayer CropScience
Site de Villefranche
1 avenue Edouard Herriot, BP 442-
Limas
69656 Villefranche-sur-Saône Cedex,
France

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του
σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των
επιχειρήσεων:

1. Bayer CropScience S.L.,
Ctra. Madrid-Valencia. Km. 342,
46930-Quart de Poblet (Valencia)
2. Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ
Β.Ι.Π.Ε. Θεσσαλονίκης, 570 22, Σίνδος,
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
3. AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΒΕΕ
Τ.Θ. 1089, Βιομηχανική Περιοχή
Θεσσαλονίκης,
Σίνδος 57022, Θεσσαλονίκη
4. Orange-Logistics ΕΠΕ
80° Χιλιόμετρο Αθηνών-Λαμίας
Ύπατο Θηβών
5. AGRIPHAR ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, Λεωφόρος
NATO
19300, θέση Πηλιχό, Ασπρόπυργος
Αττικής

στ) Εγγυημένη σύνθεση του
σκευάσματος:

Δραστική ουσία: trifloxystrobin 50,0 % β/β
Βοηθητικές ουσίες 47,9 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του
σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το
με αριθ. πρωτ. 115977/14-11-2003 έγγραφο
της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζεται
στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Είναι
εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα
αρχεία της ΣΕΑ

2 Συσκευασία(ες)

2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Σακουλάκι	2 gr	Σακουλάκι από (εσωτερικά)

			πολυαιθυλένιο/αλουμίνιο/χαρτί σε χαρτοκυτίο
2	Σακουλάκι	10 gr	Σακουλάκι από (εσωτερικά) πολυαιθυλένιο/αλουμίνιο/χαρτί σε χαρτοκυτίο
3	Σακουλάκι	12,5 gr	Σακουλάκι από (εσωτερικά) πολυαιθυλένιο/αλουμίνιο/χαρτί σε χαρτοκυτίο
4	Σακουλάκι	25 gr	Σακουλάκι από (εσωτερικά) πολυαιθυλένιο/αλουμίνιο/χαρτί σε χαρτοκυτίο
5	Σακουλάκι	50 gr	Σακουλάκι από (εσωτερικά) πολυαιθυλένιο/αλουμίνιο/πολυεστέρα σε χαρτοκυτίο
6	Σακουλάκι	62,5 gr	Σακουλάκι από (εσωτερικά) πολυαιθυλένιο/αλουμίνιο/πολυεστέρα σε χαρτοκυτίο
7	Σακουλάκι	100 gr	Σακουλάκι από (εσωτερικά) πολυαιθυλένιο/αλουμίνιο/πολυεστέρα σε χαρτοκυτίο
8	Σακουλάκι	125 gr	Σακουλάκι από (εσωτερικά) πολυαιθυλένιο/αλουμίνιο/πολυεστέρα σε χαρτοκυτίο
9	Σακουλάκι	150 gr	Σακουλάκι από (εσωτερικά) πολυαιθυλένιο/αλουμίνιο/πολυεστέρα σε χαρτοκυτίο
10	Σακουλάκι	300 gr	Σακουλάκι από (εσωτερικά) πολυαιθυλένιο/αλουμίνιο/πολυεστέρα σε χαρτοκυτίο

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό και βάλτε τον αναδευτήρα σε λειτουργία. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Σε περίπτωση μιγμάτων βυτίου, βάλτε το CONSIST 50 WG πρώτο και συνεχίστε με τα υπόλοιπα σκευάσματα, αναδεύοντας συνεχώς.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: ---

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής ανάκτησης ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: ---

Προφυλάξεις για τους χειριστές: ---

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο με κυρίως προληπτική αλλά και θεραπευτική δράση για την καταπολέμηση του ωιδίου.
Εμφανίζει διελασματική και τοπικά διασυστηματική κίνηση καθώς και αξιόλογη δράση με ατμούς.
Η δραστική ουσία trifloxystrobin είναι παρεμποδιστής της μιτοχονδριακής αναπνοής των μυκήτων στη θέση Qo του συμπλόκου III του κυτοχρώματος bc 1 (ομάδα Qols, υποομάδα oximinooacetates).

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ. σκευάσματος / στρέμμα (max)	γρ. σκευάσματος / 100 λίτρα υγρού Υγρού	Όγκος υγρού λίτρα / στρέμμα		
Αμπέλι	Ωίδιο (<i>Uncinula necator</i>)	12,5	12,5	30-100	Προληπτικές επεμβάσεις από το στάδιο μήκους βλαστού 10 εκ. μέχρι το κλείσιμο της σταφυλής. Το προϊόν εμφανίζει δευτερεύουσα δράση εναντίον του περονόσπορου (<i>Plasmopara viticola</i>). Μεσοδιάστημα ψεκασμών: 10-14 ημέρες.	3
Μηλιά	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i>)	7,5-10	7,5-10	100-150	Προληπτικές επεμβάσεις από το στάδιο της πράσινης κορυφής μέχρι μέγεθος καρπού ημίσεος του τελικού. Για το φουζικλάδιο και το ωίδιο θεραπευτικές επεμβάσεις με τη δόση των 10 γρ. σκευάσματος / 100 λίτρα νερό και μόνο κατόπιν σύστασης από τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Μεσοδιαστήματα ψεκασμών: 10-12 μέρες.	3
	Ωίδιο (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	10	10	100-150		
Αχλαδιά	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i>)	7,5-10	7,5-10	100-150	Προληπτικές επεμβάσεις από το στάδιο της πράσινης κορυφής μέχρι μέγεθος καρπού ημίσεος του τελικού. Για το φουζικλάδιο και το ωίδιο θεραπευτικές επεμβάσεις με τη δόση των 10 γρ. σκευάσματος / 100 λίτρα νερό και μόνο κατόπιν σύστασης από τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Μεσοδιαστήματα ψεκασμών: 10-12 μέρες.	3
	Ωίδιο (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	10-15	10	100-150		
	Στεμφύλιο (<i>Stemphylium</i> spp.)	15	15	100		
Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	15	15	100	Από την πτώση των πετάλων μέχρι το μέγεθος του καρπού να φτάσει το 90% τελικού μεγέθους. Μεσοδιαστήματα ψεκασμών: 10-14 μέρες.	3
Ελιά	Κυκλοκόνιο (<i>Cycloconium</i>)	10	10-15	100-150	Από το στάδιο όπου οι βλαστοί φτάνουν το 70%	2 / Μόνο 1 εφαρμογή

	<i>oleaginum</i>)				του τελικού μεγέθους μέχρι και το στάδιο όπου ο καρπός αποκτάει ανοιχτό πράσινο-κίτρινο χρώμα.	επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του Φθινοπώρου.
Τομάτα (Θ)	Ωίδιο (<i>Leveillula taurica</i>)	12,5	12,5	100	Μεσοδιαστήματα ψεκασμών: 10-14 μέρες. Προληπτικές επεμβάσεις (πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων).	3
Πεπόνι (Α, Θ)	Ωίδιο (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	12,5	12,5	100	Μεσοδιαστήματα ψεκασμών: 10-14 μέρες. Προληπτικές επεμβάσεις (πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων).	3
		25*	25*			

Παρατηρήσεις:

* στο πεπόνι προτείνεται η εφαρμογή της μεγαλύτερης δόσης των 25 γρ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού, υπό συνθήκες υψηλής πίεσης προσβολής και για μεγαλύτερα μεσοδιαστήματα.

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα Π της παρούσας

6

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

- Εφαρμοστε το CONSIST 50 WG προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών και αποφύγετε τις θεραπευτικές εφαρμογές.
- Εφαρμόστε το CONSIST 50 WG σε προγράμματα ψεκασμών σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από τους Qols με τα οποία δεν εμφανίζει διασταυρωτή ανθεκτικότητα.
- Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2-3 ανάλογα με την καλλιέργεια.

7

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

-

-

-

8

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε

Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις.

άλλης παρενέργειας
στα φυτά ή τα
προϊόντα τους.

9 ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ



10 ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

11 ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

P102 Μακριά από παιδιά.
P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
P220 Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
P270 Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P262 Να μην έρθει σε επαφή με το δέρμα.
P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα.
P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.

Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία, γάντια και κατάλληλες μπότες εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό.

Sp1 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
Spe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μian απέκαστη ζώνη προστασίας **20 μέτρων** για τις δενδρώδεις καλλιέργειες και **5 μέτρων** για την καλλιέργεια του αμπελιού από τα επιφανειακά ύδατα.

EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

P333 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

-
- Μετακινήστε τον ασθενή μακριά από την επικίνδυνη ζώνη και μεταφέρετέ τον σε σταθερή πλάγια θέση.
- Απομακρύνετε τα ρούχα που ήρθαν σε επαφή με το ψεκαστικό υγρό.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ξεπλύνετε καλά το δέρμα που ήρθε σε επαφή με το ψεκαστικό υγρό με αρκετή ποσότητα νερού και σαπουνι και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε καλά τα μάτια με νερό για αρκετή ώρα.
- Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
- Εφαρμόστε πλύση στομάχου και συμπτωματική θεραπεία.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 2107793777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μήλα	14
Αχλάδια	14
Αμπέλι	28
Ελιά	14
Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά	7
Τομάτα, Πεπόνι	3

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Ο συνιστώμενος μέγιστος χρόνος αποθήκευσης του CONSIST 50 WG είναι 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, στην αρχική του κλειστή συσκευασία. Το σκεύασμα θα πρέπει να αποθηκεύεται σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

Β**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ ηλεκτρονικά τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α.α.**

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ