



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 12 - 5 - 2014  
Αριθ. πρωτ: 3710/39892

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Κ. Μαρκάκης  
Τηλέφωνο: 210 928 7226  
e-mail: [syg061@minagric.gr](mailto:syg061@minagric.gr)

Προς: BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ  
Σωρού 18-20, Μαρούσι, Αθήνα  
TK 15125  
Κοιν.: Εσωτερική διανομή:  
Τμήμα Δ της Δ/νσής μας  
(Υπόψη κου Κ. Μαρκάκη)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της με αριθ.  
6772/1-4-2003 οριστικής  
έγκρισης του  
φυτοπροστατευτικού  
προϊόντος (μυκητοκτόνο)  
Teldor 50 WG (δ.ο.  
fenhexamid 50%) ως προς το  
φάσμα δράσης (διεύρυνση σε  
ήσσονος σημασίας χρήση), την  
ταξινόμηση και σήμανση του  
σκευάσματος»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερο το άρθρο 45 αυτού.
2. Τον Ν. 4036 (ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012) σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, την ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Την με αρ. πρωτ. 98112/1-4-2003 απόφαση μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 6772/1-4-2003 **οριστική** έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) Teldor 50 WG (δ.ο. fenhexamid 50%) όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. 97800/20-6-2011 απόφαση μας και ισχύει.
4. Τη με αριθ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς,

Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράψουν «“με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”»

5. Τις με αριθ. Πρωτ. 3710/39892/26-3-2014 και 3954/43362/8-4-2013 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
6. Τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. 98112/1-4-2003 οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος(μυκητοκτόνο) Teldor 50 WG (δ.ο. fenhexamid 50%), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 6772/1-4-2003 απόφαση μας όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. 97800/20-6-2011 απόφαση μας και ισχύει ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση) καθώς και την ταξινόμηση και σήμανση του σκευάσματος προκειμένου αυτή να εναρμονιστεί με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 .

**Συγκεκριμένα τα σημεία 5, 9, 10, 11 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:**

<b>5</b>   5.1 Φάσμα δράσης		<b>Δόσεις σκευάσματος</b>			<b>Τρόπος και χρόνος εφαρμογής</b>	<b>Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο</b>
<b>Πεδίο Εφαρμογής</b>	<b>Στόχος</b>	<b>Γρ. σκ./στρ.</b>	<b>Γρ./ 100 λίτρα υγρού</b>	<b>Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρέμμα</b>		
<b>Αμπέλι</b> (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα)	<b>Βοτρύτης</b> ( <i>Botrytis cinerea</i> )	100-150	100-150	100	Εφαρμογές στην άνθηση, λίγο πριν το κλείσιμο του βότρου μέχρι την ωρίμανση.	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται
<b>Φράουλα</b> (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)	<b>Βοτρύτης</b> ( <i>Botrytis cinerea</i> )	150	-	50-70	Εφαρμογές κυρίως στην άνθηση και μέχρι την ωρίμανση.	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται
<b>Τομάτα</b> (Θερμοκηπίου)	<b>Βοτρύτης</b> ( <i>Botrytis cinerea</i> )	150	150	100	Προληπτικοί ψεκάσμοι από την εμφάνιση των πρώτων καρπών και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται

Πιπεριά (Θερμοκηπίου)	<b>Βοτρύτης</b> ( <i>Botrytis cinerea</i> )	150	150	100	Προληπτικοί ψεκασμοί από την εμφάνιση των πρώτων καρπών και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται
Αγγούρι (Θερμοκηπίου)	<b>Βοτρύτης</b> ( <i>Botrytis cinerea</i> )	150	150	100	Προληπτικοί ψεκασμοί από την εμφάνιση των πρώτων καρπών και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται
Κολοκύθι (Θερμοκηπίου)	<b>Βοτρύτης</b> ( <i>Botrytis cinerea</i> )	150	150	100	Προληπτικοί ψεκασμοί από την εμφάνιση των πρώτων καρπών και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται
Καρποί Ακτινιδιάς (μόνο μετασυλλεκτική εφαρμογή)	<b>Βοτρύτης</b> ( <i>Botrytis cinerea</i> )	-	100	-	Εμβάπτιση καρπών μετά τη συγκομιδή.	1
Κερασιά (καλλιέργεια ήσσονος σημασίας) <sup>3</sup>	Βοτρύτης ( <i>Botrytis cinerea</i> )  Μονίλια ( <i>Monilia spp.</i> )	100-150	-	150-250	1-2 εφαρμογές κατά την ανθοφορία και 1-2 εφαρμογές στις δύο εβδομάδες που προηγούνται της συγκομιδής  Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή 1 ημέρα	Για να αποφευχθεί η εμφάνιση φαινομένων ανθεκτικότητας, ο αριθμός των εφαρμογών στις οποίες χρησιμοποιείται το προϊόν να μην υπερβαίνει το μισό του προβλεπόμενου για κάθε καλλιεργητική περίοδο αριθμού εφαρμογών για την καταπολέμηση του <i>Botrytis cinerea</i> και του <i>Monilia spp</i>

**Παρατηρήσεις:**

1. Δεν επιτρέπεται η χρήση του σκευάσματος σε σταφύλια που προορίζονται για σταφίδα.
  2. Το διάλυμα εμβάπτισης που παραμένει μετά το τέλος της κατεργασίας θα πρέπει να αραιώνεται με δεκαπλάσια ποσότητα νερού και να απελευθερώνεται σε γυμνό έδαφος το οποίο :
    - α.) Βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 μέτρων από υδάτινη επιφάνεια και
    - β.) Υπάρχει αδιαπέραστο στρώμα εδάφους ή χαμηλός υδροφόρος ορίζοντας (> 2 μέτρα βάθος).
  3. Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στη καλλιέργεια σπανακιού από τη χρήση του σκευάσματος.
- Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του.

**9** ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ**10** ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

**H411** Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
**EUH401** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**11** ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

**P102** Μακριά από παιδιά.  
**P201** Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.  
**P220** Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.  
**P270** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P273** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.  
**P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.  
 «Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό».  
**P405** Φυλάσσεται κλειδωμένο.

**SP1** Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.  
**SPe3** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μian ανέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες του αμπελιού και της φράουλας και **10 μέτρων** για τις καλλιέργειες της τομάτας, του αγγουριού και του κολοκυθιού.

**13** Προστασία των καταναλωτών**13.1** Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)

Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά σε mg/kg
«Έχουν οριστεί κοινοτικά MRLs».	

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Κερασιά	1

Η ανωτέρω ταξινόμηση και σήμανση είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1272/2008 και είναι υποχρεωτική από 1-6-2015.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 6772/1-4-2003 απόφαση μας με την οποία χορηγήθηκε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν Teldor 50 WG (δ.ο. fenhexamid 50%) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ**

**α.α.**

**Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ**