



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 19 - 8 - 2014
Αριθ. πρωτ: 6277/66402

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Κ. Μαρκάκης
Τηλέφωνο: 210 928 7226
e-mail: syg061@minagric.gr

Προς: BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ΣΩΡΟΥ 18-20, ΜΑΡΟΥΣΙ

Κοιν.: Εσωτερική διανομή:
Τμήμα Δ της Δ/νσής μας
(Υπόψη κου Κ. Μαρκάκη)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ.
60.382 οριστικής έγκρισης του
φυτοπροστατευτικού
προϊόντος (μυκητοκτόνο)
SERENADE MAX (δ.ο. *Bacillus
subtilis-strain QST 713*) ως
προς το φάσμα δράσης
(διεύρυνση σε ήσσονος
σημασίας χρήσεις)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερο το άρθρο 45 αυτού.
2. Τον Ν. 4036 (ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012) σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, την ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Την με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 (ΦΕΚ Β΄/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας »
4. Την με αρ. πρωτ. 2161/23744/12-9-2013 απόφαση μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60.382 **οριστική** έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) SERENADE MAX (δ.ο. *Bacillus subtilis-strain QST 713*) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την Έκθεση Αξιολόγησης με ημερομηνία 9/5/2014 καθώς και το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν σχόλια από τα άλλα ΚΜ της νότιας ζώνης
6. Τη με αριθ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράψουν «“με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”»
7. Τη με αριθ. Πρωτ. 6277/66402/21-5-2014 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
8. Τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. 60.382 οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος(μυκητοκτόνο) SERENADE MAX (δ.ο. *Bacillus subtilis-strain QST 713*), που χορηγήθηκε με την με. αριθ. 2161/23744/12-9-2013 απόφαση μας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Συγκεκριμένα τα σημεία 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

5 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ./στρέμμα	γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Αμπέλι	Βοτρυτής (<i>Botrytis cinerea</i>)	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις και αφού έχει ανθίσει το 80% των ανθέων μέχρι την αρχή της ωρίμανσης των καρπών (όταν οι καρποί αρχίζουν να αποκτούν το τυπικό χρώμα της ποικιλίας τους) Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 14	5
Μηλιά Αχλαδιά (1)	Φουζικλάδιο (<i>Venturia</i> Spp.)	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις, από την πράσινη κορυφή μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν μέγεθος 20 χιλιοστών (mm). Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 7	8

	Βακτηριακό κάψιμο μηλοειδών (<i>Erwinia amylovora</i>)	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής (κατά τη διάρκεια της άνθισης) ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις . Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 7	4
Φράουλα (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου)	Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i>)	250-350	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις , από την έναρξη της άνθισης και μέχρι τη συγκομιδή. Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 7	4
Μαρούλι (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου)	Σκληρωτίνια (<i>Sclerotinia spp.</i>)	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις , από το στάδιο των τεσσάρων πραγματικών φύλλων μέχρι και τον πλήρη σχηματισμό της κεφαλής του μαρουλιού. Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 7	4
Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Νεκταρινιά (2)	Φαιά σήψη (<i>Monilinia spp.</i>)	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις , από το στάδιο που ο καρπός έχει το μέγεθος καρυδιού μέχρι και τη συγκομιδή Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 7	4
	Βακτηριακό κάψιμο (<i>Xanthomonas arboricola</i>)	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις,, από την πτώση του κάλυκα (τέλος καρπόδεσης) μέχρι που καρποί αρχίζουν να αποκτούν το τελικό τους χρώμα. Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 7	4
Τομάτα (Υπαίθρου &	Βοτρύτης	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα	4

Θερμοκηπίου)	(<i>Botrytis cinerea</i>) Βακτηριακή κηλίδωση (<i>Pseudomonas syringae</i>)	250-400	---	50-100	με τις γεωργικές προειδοποιήσεις, από το στάδιο της καρπόδεσης μέχρι και τη συγκομιδή. Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 7 Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις, από το στάδιο πριν την άνθιση μέχρι και τη συγκομιδή. Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 7	
Πιπεριά, Μελιτζάνα (Υπαίθρου & Θερμοκηπίο υ)	Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i>)	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις, από το στάδιο της καρπόδεσης μέχρι και τη συγκομιδή. Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 7	4
ΡΟΔΙΑ (μικρής σημασίας χρήση) ⁴	ΒΟΤΡΥΤΗΣ (<i>Botrytis spp.</i> <i>Botrytis cinerea</i>)	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμογή από την έναρξη της καρπόδεσης μέχρι την πλήρη ωρίμανση των καρπών ΒΒCH: 71-89 Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες.	4
ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ (μικρής σημασίας χρήση) ⁴	ΒΟΤΡΥΤΗΣ (<i>Botrytis spp.</i>) ΒΑΚΤΗΡΙΟ (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Actinidiae</i> (PSA))	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμογή από την έναρξη της καρπόδεσης μέχρι την πλήρη ωρίμανση των καρπών ΒΒCH: 71-89 Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες.	4
ΑΓΚΙΝΑΡΑ (μικρής σημασίας χρήση) ⁴	ΒΟΤΡΥΤΗΣ (<i>Botrytis spp.</i>)	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμογή	4

					από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων μέχρι την πλήρη ωρίμανση. BBCH: 71-89 Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες.	
ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙ ΧΛΩΡΟ (μικρής σημασίας χρήση) ⁴	ΒΟΤΡΥΤΗΣ (<i>Botrytis spp.</i>)	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμογή από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων μέχρι την πλήρη ωρίμανση. BBCH: 71-89 Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες.	4
ΦΑΣΟΛΙ ΞΕΡΟ (μικρής σημασίας χρήση) ⁴	ΒΑΚΤΗΡΙΟ (<i>Xanthomonas spp.</i> <i>Pseudomonas spp.</i> <i>Pseudomonas syringae</i>)	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμογή από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων μέχρι την πλήρη ωρίμανση. BBCH: 71-89 Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες.	4
ΑΝΗΘΟΣ (μικρής σημασίας χρήση) ⁴	ΒΟΤΡΥΤΗΣ (<i>Botrytis spp.</i>)	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμογή από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων μέχρι την πλήρη ωρίμανση. BBCH: 71-89 Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες.	4
ΜΑΙΔΑΝΟΣ (μικρής σημασίας χρήση) ⁴	ΒΟΤΡΥΤΗΣ (<i>Botrytis spp.</i>)	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμογή από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων μέχρι την πλήρη ωρίμανση. BBCH: 71-89 Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες.	4
ΜΠΑΜΙΑ (μικρής σημασίας χρήση) ⁴	ΒΟΤΡΥΤΗΣ (<i>Botrytis spp.</i>)	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμογή από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων μέχρι την πλήρη ωρίμανση. BBCH: 71-89	4

					Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες.	
ΜΠΡΟΚΟΛΛΟ (μικρής σημασίας χρήση) ⁴	ΒΑΚΤΗΡΙΟ (<i>Pseudomonas</i> <i>spp.</i>).	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμογή από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων μέχρι την πλήρη ωρίμανση. BBCH: 71-89 Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες.	4
ΣΤΕΒΙΑ (μικρής σημασίας χρήση) ⁴	ΒΟΤΡΥΤΗΣ (<i>Botrytis spp.</i>)	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμογή από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων μέχρι την πλήρη ωρίμανση. BBCH: 71-89 Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες.	4

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- (1) Συνολικά το μέγιστο των εφαρμογών δεν είναι παραπάνω από οκτώ
- (2) Συνολικά το μέγιστο των εφαρμογών δεν είναι παραπάνω από τέσσερις
- (3) Επειδή το σκεύασμα μπορεί να αφήσει ένα λευκό επίχρισμα πάνω στο φυτό συνιστούμε να μη χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά το μέγιστο προτεινόμενο βλαστικό στάδιο.
- (4) Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργειες ροδιάς, ακτινιδιάς, αγκινάρας, κρεμμύδι χλωρό, φασόλι ξερό, άνηθος, μαϊδανός, μπάμια, μπρόκολο και στέβια από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος SERENADE MAX

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II της παρούσας

13 Προστασία των καταναλωτών

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
-----------------	--------

Αμπέλι, Μηλιά, Αχλαδιά, Φράουλα, Μαρούλι, Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα Ροδακινιά, Βερικοκιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά, Νεκταρινιά, Ροδιά, Ακτινιδιά, Αγκινάρα, Κρεμμύδι χλωρό, Φασόλι ξερό, Άνηθος, Μαϊδανός, Μπάμια, Μπρόκολο, Στέβια	3

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 2161/23744/12-9-2013 απόφαση μας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ

α.α.

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ