



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Αθήνα, 23-7-2014
Αριθ. πρωτ: 7884/85786**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7211
e-mail: svg046@minagric.gr**

**Προς: BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20
15125-ΜΑΡΟΥΣΙ**

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 60.405 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) FLINT MAX 75 WG (tebuconazole + trifloxystrobin) ως προς το φάσμα δράσης, σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 61/2014 »

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 80 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον Κανονισμό 61/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24-1-14, "για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες *cyromazine*, *fenpropidin*, *formetanate*, *oxamyl* και *tebuconazole* μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα".
4. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.13 (ΦΕΚ 2240/Β'10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν "με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού"».
5. Το σχετικό Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
6. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 7884/85786/2.7.14 σχετική αίτηση της εταιρείας BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Α.** Τροποποιούμε τη με αριθ. **60.405** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **FLINT MAX 75 WG** (tebuconazole + trifloxystrobin) που χορηγήθηκε με τη αριθ. 1370/18220/7.2.14 Απόφασή μας ως προς το φάσμα δράσης, σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 61/2014. Η παράγραφος 5 της με αριθ. 1370/18220/7.2.14 Απόφασής μας, διαμορφώνεται ως ακολούθως:

| 5 5.1 Φάσμα δράσης | | Δόσεις σκευάσματος | | | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο |
|----------------------------------|--|----------------------|------------------------------------|------------------|---|--|
| Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος | γρ./ 100 λίτρα νερού | Όγκος ψεκαστικού υγρού λίτρα/ στρ. | γρ. σκ./ στρέμμα | | |
| Μηλιά | Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i>) Ωίδιο (<i>Podosphaera leucotricha</i>) Αλτερνάρια (<i>Alternaria alternata</i>) | 20 | 150 | 30 | Προληπτικές εφαρμογές από την περίοδο πριν την άνθηση μέχρι πριν τη συγκομιδή (πλήρης ωρίμανση). Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 10-12 ημέρες | 3 |
| Αχλαδιά | Φουζικλάδιο (<i>Venturia pirina</i>) Στεμφύλιο (<i>Stemphylium vasicarium</i>) | 20 | 150 | 30 | Προληπτικές εφαρμογές από την περίοδο πριν την άνθηση μέχρι πριν τη συγκομιδή (πλήρης ωρίμανση). Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 10-12 ημέρες | 3 |
| Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά | Ωίδιο (<i>Sphaerotheca pannosa</i>) | 20 | 150 | 30 | Προληπτικές εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογών: 10-12 ημέρες | 2 |
| | Μονίλια (<i>Monilia</i> spp.) | | | | Προληπτικές εφαρμογές από την έναρξη της άνθησης με μεσοδιάστημα εφαρμογών 12-14 ημερών και πριν τη συγκομιδή (πλήρης ωρίμανση) με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημερών. | |
| | Εξώασκος της Ροδακινιάς (<i>Taphrina deformans</i>) | | | | Προληπτικές εφαρμογές από την έναρξη της βλάστησης. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 12-14 ημέρες. | |
| Δαμασκηνιά, Κερασιά | Ωίδιο (<i>Sphaerotheca pannosa</i>) | 20 | 150 | 30 | Προληπτικές εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογών: 10-12 ημέρες | 3 |
| | Μονίλια (<i>Monilia</i> spp.) | | | | Προληπτικές εφαρμογές από την έναρξη της άνθησης με μεσοδιάστημα εφαρμογών 12-14 ημερών και πριν τη συγκομιδή (πλήρης ωρίμανση) με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημερών. | |
| | Εξώασκος της Ροδακινιάς (<i>Taphrina deformans</i>) | | | | Προληπτικές εφαρμογές από την έναρξη της βλάστησης. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 12-14 ημέρες. | |
| Ελιά | Κυκλοκόνιο (<i>Spilocaea oleagina</i>) | 20 | 125 | 25 | Προληπτική εφαρμογή από την έναρξη της βλάστησης μέχρι πριν την άνθηση. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 12-14 ημέρες. | 1 |

| | | | | | | |
|---|--|-------|---|----|--|---|
| Τομάτα, Πιπεριά (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου) | Ωίδιο (<i>Leveillula taurica</i>) | 20-30 | 150 (Θερμοκήπι ο) 100 (Υπαίθριες) | 30 | Προληπτικές εφαρμογές από το στάδιο πριν την άνθηση έως πριν τη συγκομιδή (πλήρης ωρίμανση). Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 8-12 ημέρες. | 3 |
| Αγγούρι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου) | Ωίδιο (<i>Podosphaera fusca, Erysiphe cichoracearum</i>) | 20-30 | 150 (Θερμοκήπι ο) 100 (Υπαίθριες) | 30 | Προληπτικές εφαρμογές από το στάδιο πριν την άνθηση έως πριν τη συγκομιδή (πλήρης ωρίμανση). Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 8-12 ημέρες. | 3 |
| Παρατηρήσεις: 1. Προληπτικές εφαρμογές πριν την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. 2. Σε περίπτωση υψηλής προσβολής χρησιμοποιείστε το Flint Max στην υψηλή του δοσολογία και με τα πιο σύντομα μεσοδιαστήματα. Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας | | | | | | |

Β. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 1370/18220/7.2.14 Απόφασή μας.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
α/α

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ