



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 02 - 12 - 2014
 Αριθ. πρωτ: 13403/152572

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
 Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
 TELEFAX: 210 92 12 090
 Πληροφορίες: Π. Θεοδωρής
 Τηλέφωνο: 210 928 72 25
 e-mail: svg058@minagric.gr

Προς: **OXON ITALIA, SpA**
Via Sempione, 195,
20016 Pero (MI), Italy
Δια της:
SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ
Ήρας 3
Τ.Κ. 19400 Κορωπί
(με απόδειξη)

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής έγκρισης
 διάθεσης στην αγορά στο
 φυτοπροστατευτικό προϊόν
 (μυκητοκτόνο) **LIETO WG**”

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερο τα άρθρα 29, 33 και 37.4 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις
3. Τον Κανονισμό 1272/2008/ΕΚ για την Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία ουσιών και μειγμάτων
4. Τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
5. Τον Καν. 540/2011 της Επιτροπής της 25^{ης} Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Καν. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκριμένων δραστικών.
6. Τον Καν. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
7. Την σχετική αξιολόγηση της Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης της Ισπανίας, καθώς και την έγκριση διάθεσης στην αγορά της Ισπανίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος LIETO με αρ. έγκρισης n° ES-00004.
8. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.13 (ΦΕΚ 2240/Β'/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς,

Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράψουν “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”».

9. Το εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

10. Την 614/7171/20.01.2012 αίτηση της εταιρείας **OXON ITALIA, SpA** διά της **SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ.**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με τον Καν. 1107/2009, άρθρα 29, 33 και 37.4, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **LIETO WG** της εταιρείας **OXON ITALIA, SpA** με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

60432

02/12/2014

31/01/2018

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

1.2.β Μορφή:

LIETO WG

**WG (Water Dispersible Granules/
Βρέξιμοι κόκκοι)**

1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες)

Δραστική ουσία 1	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσιών/ών κατά ISO	Cymoxanil
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	Cymoxanil: 97.00 % (β/β) min
Χημική ομάδα	Cymoxanil (χημική ομάδα): Ακεταμίδια
Παρασκευαστής	OXON Italia S.p.A. - Via Sempione, 195 20016 Pero (MI), Italy
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	OXON Italia SpA. Strada provinciale Km 2.6, 27030 Mezzana Bigli (PV), Italy
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών Ουσιών έχουν υποβληθεί από την Παρασκευάστρια Εταιρεία και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής
Δραστική ουσία 2	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσιών/ών κατά ISO	Zoxamide
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	Zoxamide: 95.00 % (β/β) min
Χημική ομάδα	Zoxamide (χημική ομάδα): Βενζιμιδαζόλες
Παρασκευαστής	Gowan Comercio Internacional e Servicos L ^{da} mitada, Avendida do Infante 50-9004-521 Funchal- Madeira-Portugal
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	DALIAN CHEMPHY CHEMICAL CO. LTD, 1111 Zhongshan Road Dalian 116011, People's Republic of China
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών Ουσιών έχουν υποβληθεί από την Παρασκευάστρια Εταιρεία και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

OXON ITALIA, SpA
Via Sempione, 195, 20016 Pero (MI), Italy
Τηλ.: +39 02 35378235
Fax: +39 (02) 3390 275
E-mail: EGallizia@oxon.it

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Ον/νυμο: Απόστολος Σαμούδης
SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ
Έγρας 3
Τ.Κ. 19400 Κορωπί
Τηλ.: 210 5223 834
Fax: 210 5223 139
E-mail: info@sipcam.gr

β) Υπεύθυνος για την διάθεση στην αγορά σύμφωνα με το νόμο 4036/2012:

ΣΙΠΚΑΜ ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ
Έγρας 3
Τ.Κ. 19400 Κορωπί
Τηλ.: 210 5223 834
Fax: 210 5223 139
E-mail: info@sipcam.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

OXON ITALIA S.p.A.
Via Sempione 195-20016,
Pero (MI)-Italy

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

1. Gowan Milling
12300 E. County
8th Street
Yuma, Arizona 85365

2. Sipcam S.p.A.
Via Vittorio Veneto, 81
26857 Salerano sul Lambro (LO)
Italy

3. SBM Formulation
CS 621-ZI
Avenue Jean Foucault
Beziers 34535
France

4. Schirm GmbH, Division Sideco
Mecklenburger Straße 229
D-23568 Lübeck
Germany

5. A.D.I.C.A. srl
Via Aurelio Saffi 1
40131 Bologna (BO)
Italy

6. Diachem S.p.A.
Uffici e stabilimento
Via Mozzanica, 9/11
24043 Caravaggio (BG)
Tel. centralino +39 0363.355611
Fax +39 0363.355610
e-mail: info@diachemagro.com

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

1. Gowan Milling
12300 E. County
8th Street
Yuma, Arizona 85365
2. Sipcam S.p.A.
Via Vittorio Veneto, 81
26857 Salerano sul Lambro (LO)
Italy
3. SBM Formulation
CS 621-ZI
Avenue Jean Foucault
Beziers 34535
France
4. Schirm GmbH, Division Sideco
Mecklenburger Straße 229
D-23568 Lübeck
Germany
5. A.D.I.C.A. srl
Via Aurelio Saffi 1
40131 Bologna (BO)
6. ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ,
Μάνδρα Αττικής
7. ΑΓΚΡΟΣΙΝΤ ΚΑΝΔΗΛΙΔΗ ΑΕ,
Μάνδρα Αττικής
8. ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.
Νέα Σάντα, Κιλκίς

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Cymoxanil: 33 % (β/β)
Zoxamide: 33 % (β/β)
Βοηθητικές ουσίες : 34 % β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

2

Συσκευασία(ες)

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Σάκοι ή Σακούλες εντός χάρτινου κιβωτίου	40-70-80-90-100-175-200-225-250-350-400-450-500-700-750-800-900-1000-1200-1350-1400-1500-1600-1800-3600	Χάρτινο κιβώτιο και εσωτερικά σακούλες Polyester
2	Σάκοι ή Σακούλες εντός χάρτινου κιβωτίου	40-70-80-90-100-175-200-225-250-350-400-450-500-700-750-800-900-1000-1200-1350-1400-1500-1600-1800-3600	Χάρτινο κιβώτιο και εσωτερικά σακούλες multi-layer PE.
3	Σάκοι & Σακούλες	40-70-80-90-100-175-200-225-250-350-400-450-500-700-750-800-900-1000-1200-1350-1400-1500-1600-1800-3600	Multiwall bag: Polyester + Aluminium + Polyethylene
4	Σάκοι & Σακούλες	40-70-80-90-100-175-200-225-250-350-400-450-500-700-750-800-900-1000-1200-1350-1400-1500-1600-1800-3600	Χάρτινες σακούλες με εσωτερική στρώση Polyethylene

3

Οδηγίες

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

χρήσης:

Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμογές με ψεκασμούς φυλλώματος.**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας συνεχώς. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση ακόμη και κατά την εφαρμογή.**Συνδυαστικότητα:** ---**Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Αδειάστε τελείως το δοχείο του ψεκαστικού. Ξεπλύνετε τα μηχανήματα εξωτερικά με νερό. Ξεπλύνετε το εσωτερικό του δοχείου του ψεκαστικού με καθαρό νερό συμπεριλαμβανομένων των σωληνώσεων και των μπεκ. Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο με καθαρό νερό κατά το ήμισυ αναδεύστε και αδειάστε τελείως. Επαναλάβετε την διαδικασία μέχρι να απομακρυνθούν τα ορατά υπολείμματα και ο αφρός. Φίλτρα και μπεκ αφαιρούνται και καθαρίζονται ξεχωριστά με καθαρό νερό.**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Καύση σε εγκεκριμένες για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεις, βάση της κείμενης νομοθεσίας. Οι κενές συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το **LIETO WG** είναι μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση του περονόσπορου σε πατάτες, τομάτες, μελιτζάνες και αμπέλια με προστατευτική και διασυστηματική δράση. Το **cymoxanil** συνεισφέρει στο σκεύασμα διευρύνοντας το φάσμα δράσης του ως διασυστηματικό και μυκητοκτόνο επαφής με προληπτική και θεραπευτική δράση. Επιπλέον δρα ανασταλτικά στη δημιουργία σπορίων από τον μύκητα. Το **zoxamide** είναι ένα προστατευτικό μυκητοκτόνο επαφής το οποίο πρέπει να εφαρμόζεται πριν την εγκατάσταση της ασθένειας. Δρα εξειδικευμένα εναντίον των οωμυκήτων εμποδίζοντας την κυτταρική διαίρεση σταματώντας την ανάπτυξη των μυκήτων και τη βλάστηση των σπορίων.

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ./ στρ. (max)	γρ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Πατάτα	Περονόσπορος <i>Phytophthora infestans</i>	45		20 -100	Εφαρμογή από το στάδιο της έκπτυξης του 1 ^{ου} πλευρικού βλαστού (5 εκ) και μετά. Ψεκασμοί φυλλώματος κάθε 7-10 ημέρες με καλό λούσιμο των φυτών.	3
Τομάτα, Μελιτζάνα	Περονόσπορος <i>Phytophthora infestans</i>	40-45		50-80	Εφαρμογή από το στάδιο έκπτυξης του 3 ^{ου} φύλλου και μετά. Ψεκασμοί φυλλώματος κάθε 10 ημέρες κατ' ελάχιστο, με καλό λούσιμο των φυτών.	3

Αμπέλι (επιτραπέζιο-οινοποιήσιμο)	Περωνόσπορος <i>Plasmopara viticola</i>	35-40	35-200	20-100	Εφαρμογή από το στάδιο έκπτυξης του 4 ^{ου} φύλλου και μετά. Ψεκασμοί φυλλώματος κάθε 7-10 ημέρες με καλό λούσιμο των φυτών.	3
---	--	-------	--------	--------	--	---

Παρατηρήσεις:

1. Καλό είναι να ακολουθούνται οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές όπου εφαρμόζονται.
2. Αυξάνετε τον όγκο του ψεκαστικού καθώς η καλλιέργεια αυξάνει σε φυλλική επιφάνεια.
3. Προσαρμόστε τις δόσεις ανάλογα, έτσι ώστε να μην ξεπεραστεί η μέγιστη δόση ανά στρέμμα.

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Για την αποφυγή ανάπτυξης φαινομένων ανθεκτικότητας χρησιμοποιείτε το προϊόν σύμφωνα με πρόγραμμα επεμβάσεων στο οποίο το LIETO WG θα εναλλάσσεται με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
 - της πρόσβασης του ανθρώπου

ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το Σκεύασμα

-

-

1. Η είσοδος των ανθρώπων να αποφεύγεται, αν δεν έχει πλήρως στεγνώσει το φύλλωμα των καλλιεργειών.
2. Όσοι εισέρχονται για εργασία σε καλλιέργειες αμπέλου μετά τον ψεκασμό, να φορούν υποχρεωτικά προστατευτικά γάντια.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

- 9** Εικονογράμματα κινδύνου:

			ΠΡΟΣΟΧΗ
GHS07	GHS08	GHS09	

- 10** Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H302	Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H317	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H361fd	Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
H373	Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα, θύμος αδένας), ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
H410	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

11 Δηλώσεις προφύλαξης:

P102 + P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
 P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
 P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους κανονισμούς επικίνδυνων αποβλήτων.
 Sp1 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Μη καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη μόλυνση του αγροτικού περιβάλλοντος και των δρόμων).
 Sp3 Για όλες τις καλλιέργειες του φάσματος δράσης: Αφήστε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά νερά. Σε περίπτωση χρήσης ακροφυσίων μείωσης αερομεταφοράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%, αφήστε μία απέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων.
 EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

P301+312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
 P302 + 352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
 P333+313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

13**Προστασία των καταναλωτών****13.1**

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

«Έχουν οριστεί κοινοτικά MRLs» (Reg. 396/2005)	
Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Πατάτες	7
Τομάτες, Μελιτζάνα	3
Σταφύλια (Επιτραπέζια & Οινοποιήσιμα)	28

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος¹.

Φυλάξτε το σφραγισμένο στην αρχική του συσκευασία σε μέρος ξηρό δροσερό και καλά αεριζόμενο. Προστατεύστε το από ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας (παγετό και > 40 °C ζέστη). Στις παραπάνω συνθήκες το προϊόν παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον.

15 **Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο **Παράρτημα ΙΙΙ** της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει: Εντός δύο ετών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις, να προσκομίσει στις αρμόδιες αρχές στοιχεία ή τεκμηρίωση για την επίδραση σε ποιοτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά στην καλλιέργεια της σουλτανίνας/κορινθιακής σταφίδας.

Β**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
α/α**

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ