



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 31 - 5 - 2016
Αριθ.πρωτ: 5635/62855

Ταχ . Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 9212090
Πληροφορίες: Νίκος Παπανικολάου
Τηλέφωνο: 210 9287230
e-mail: npapanikolaou@minagric.gr

Προς: **AgroFresh Holding France S.A.S.**
23-25, avenue Mac-Mahon
75017 Paris, France
Δια μέσου της
Ευτυχία Ε. Λεφάκη
Σωκράτους 12
176 71 Καλλιθέα
e-mail: lefakief@otenet.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορρυθμιστική ουσία) SmartFresh™ ProTabs (1-methylcyclopropene 2% β/β)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 533/2013 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 2013 για την τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών 1-methyl-cyclopropene, chlorothalonil, chlorotoluron, cypermethrin, daminozide, forchlorfenuron, indoxacarb, thiophanate-methyl και tribenuron.

2

7. Την με αριθμό 2150057 έγκρισή του στην Γαλλία.
8. Την υπ' αριθ. 9379/119137/2.11.2015 (ΦΕΚ 2367Β'/4.11.2015) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
9. Τις από 27.7.2015, 22.12.2015 κα 14.04.2016 αιτήσεις της εταιρείας AgroFresh Holding France S.A.S.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορρυθμιστική ουσία) **SmartFresh™ ProTabs** της εταιρείας **AgroFresh Holding France S.A.S.** Γαλλίας με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

8253
31.05.2016
31.10.2018

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
- 1.2.β Μορφή:

SmartFresh™ ProTabs
Δισκία (TB) (Απελευθερώνουν ατμό της δραστικής ουσίας)

1.3 Δραστική ουσία

Δραστική ουσία	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	1-methylcyclopropene (1-MCP)
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	96 % (β/β) min
Χημική ομάδα	
Παρασκευαστής	AgroFresh Inc. 400 Arcola Road, Collegeville Pennsylvania 19426 ΗΠΑ
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): IsleChem LLC 2801 Long Road, Grand Island New York 14072 ΗΠΑ
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν με το με αριθ. πρωτ. 7085/83489/27.7.2015 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι . Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

AgroFresh Holding France S.A.S.
 23-25, avenue Mac-Mahon
 75017 Paris, France
 Γαλλία
 Τηλ: +33 4 89 82 92 49
 E-mail: bmeiller@agrofresh.com

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Ευτυχία Ε. Λεφάκη
 Σωκράτους 12
 176 71 Καλλιθέα
 Τηλ.: 210 93 41 976
 E-mail: lefakief@otenet.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

ΑΓΚΡΟΣΕΛΛ Ι.Κ.Ε.
 Ανδρέα Παπανδρέου 53,
 Άγιος Ιωάννης, 55132 Καλαμαριά,
 Τηλ.: 2310 449686
 E-mail: skarros@agrocell.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

AgroFresh Inc.
 400 Arcola Road, Collegeville
 Pennsylvania 19426
 ΗΠΑ

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της
 επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση):
Freund-Vector Corporation
 675 44th Street
 Marion, IA 52302
 ΗΠΑ

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των
 επιχειρήσεων:

- 1. Freund-Vector Corporation**
 675 44th Street
 Marion, IA 52302
 ΗΠΑ
- 2. Orrion Chemicals Orgaform**
 Z.I. Le Pressoir Vert
 45400 Semoy
 Γαλλία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

1-methylcyclopropene: 2 % β/β

Βοηθητικές ουσίες: 98% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το με αριθ. πρωτ. 7085/83489/27.7.2015 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζεται στο [Παράρτημα Ι](#). Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ .

2 Συσσκευασίες

Το σύστημα/ εφαρμογής του σκευάσματος αυτού αποτελείται από τρία ξεχωριστά μέρη / συστατικά (τα δισκία του σκευάσματος SmartFresh ProTab, τα δισκία του ενεργοποιητή SmartFresh ProActivators και το διάλυμα ενεργοποίησης SmartFresh ProPack).

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφεται ξεχωριστά η συσκευασία για το φ.π. αλλά και για το καθένα από τα άλλα δύο προϊόντα που περιλαμβάνονται στο σύστημα εφαρμογής του σκευάσματος.

Η ετικέτα κάθε ξεχωριστής συσκευασίας θα φέρει την απαιτούμενη επισήμανση. Το ίδιο ισχύει και για τα εξωτερικά χαρτοκιβώτια μεταφοράς / αποθήκευσης αυτών. Στην περίπτωση μεταφοράς / προσωρινής αποθήκευσης από κοινού όλων των συσκευασιών σε μεγάλο κοινό εξωτερικό χαρτοκιβώτιο, η ετικέτα του χαρτοκιβωτίου επιβάλλεται να φέρει την πιο αυστηρή επισήμανση (π.χ. την επισήμανση του διαλύματος ενεργοποίησης SmartFresh ProPack εφόσον συμπεριλαμβάνεται).

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	SmartFresh ProTabs /φ.π. <u>Σακούλα με τα κίτρινα δισκία του φ.π.</u> , βάρους 4.2γρ./TB (0,084 γρ. δ.ο.) <u>Σακούλα με τα ροζ δισκία του φ.π.</u> , βάρους 0,84 γρ./TB (0,0168 γρ. δ.ο)	Σακούλα 20 * 11,5εκ. που περιέχει: 1 δισκίο (4,2γρ.) ή 5 δισκία (21 γρ.) ή 10 δισκία (42 γρ.) κίτρινου χρώματος Σακούλα 20 * 11,5εκ. που περιέχει: 1 δισκίο (0,84γρ.) ή 5 δισκία (4,2 γρ.) ή 10 δισκία (8,4 γρ.) ροζ χρώματος	Λευκή επίπεδη πολυστρωματική σακούλα από: PET/White E/ALFoil/PE
2	SmartFresh ProActivators Σακούλα με τα υπόλευκα δισκία του ενεργοποιητή 1.6 γρ. /TB	Σακούλα 20 * 11,5εκ. που περιέχει: 8 δισκία (12,8 γρ) χρήση με ροζ δισκία φ.π ή 40 δισκία (64γρ.) χρήση με κίτρινα δισκία φ.π.	Λευκή επίπεδη πολυστρωματική σακούλα από: PET/White E/ALFoil/PE
3	SmartFresh ProPack Ειδική σακούλα /περιέκτης που περιέχει το υδατικό διάλυμα ενεργοποίησης (10% κιτρικό οξύ)	Σακούλα 130*205*80 mm (W*L*G): 200 κ.εκ. (χρήση με ροζ δισκία φ.π) ή Σακούλα 203*290*100 mm(W*L*G): 1 λίτρο (χρήση με κίτρινα δισκία φ.π.)ή Σακούλα 300*380*160 mm (W*L*G): 4 λίτρα (χρήση με κίτρινα δισκία φ.π.)	Εύκαμπτη πολυστρωματική σακούλα με ενισχυμένο πάτο για να μένει όρθια από :48PETC-FLEXO INK/ 60BON / 6.0 MIL WHITE LLDPE

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Τρόπος εφαρμογής

Το SmartFresh™ ProTabs εφαρμόζεται με ένα ειδικά ανεπτυγμένο και κατοχυρωμένο σύστημα απελευθέρωσης της δραστικής ουσίας, που αποτελείται από τρία (3) συστατικά μέρη:

- α) κίτρινα ή/και ροζ δισκία του σκευάσματος **Smart Fresh™ ProTabs**
- β) υπόλευκα δισκία του ενεργοποιητή **SmartFresh™ ProActivators**
- γ) ειδικό διάλυμα ενεργοποίησης **SmartFresh™ ProPack**

Συγκεκριμένα τα κίτρινα ή/και ροζ δισκία του σκευάσματος Smart Fresh™ ProTabs πρέπει να χρησιμοποιηθούν μαζί με υπόλευκα δισκία του ενεργοποιητή SmartFresh™ ProActivators αφού διαλυθούν ταυτόχρονα στο ειδικό διάλυμα ενεργοποίησης SmartFresh™ ProPack.

Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται σε αεροστεγείς χώρους συντήρησης που διαθέτουν ανεμιστήρες εσωτερικού αέρα.

Ακολουθήστε με προσοχή τις παρακάτω οδηγίες:

1. Πριν από την εφαρμογή βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εφαρμογής μπορεί να σφραγιστεί ερμητικά και γρήγορα, διαθέτει εσωτερικό σύστημα αερισμού και δεν έχει εμφανείς χαραμάδες ή ρωγμές και δεν υπάρχει πιθανότητα διαρροής του εξατμιζόμενου προϊόντος.
Προετοιμαστείτε να κλείσετε και να σφραγίσετε τις πόρτες. Ενεργοποιείστε το εσωτερικό σύστημα αερισμού.
2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τον απαιτούμενο αριθμό από δισκία προϊόντος, δισκία ενεργοποιητή και σακούλες του διαλύματος ενεργοποίησης που αντιστοιχεί στο μέγεθος του χώρου συντήρησης που προορίζεται για εφαρμογή, σύμφωνα με τις οριζόμενες ποσότητες στον ειδικό πίνακα δοσολογίας.
3. Τοποθετήστε τη σακούλα με το διάλυμα ενεργοποίησης όρθια σε μια σταθερή επιφάνεια. Αφαιρέστε την ταινία σφράγισης από τη σακούλα του διαλύματος καθώς και από τις σακούλες του σκευάσματος και του ενεργοποιητή. Ρίξτε ΟΛΑ τα δισκία πρώτα του ενεργοποιητή και μετά του σκευάσματος απευθείας στο διάλυμα ενεργοποίησης. Φροντίστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία εντός 15 λεπτών.
4. Εξέλθετε αμέσως από τον χώρο, κλείστε τις πόρτες και βεβαιωθείτε ότι είναι ερμητικά κλεισμένες, για να εξασφαλιστεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα. Η απελευθέρωση στο χώρο συντήρησης του 1-methylcyclopropene θα αρχίσει λίγα λεπτά μετά από την προσθήκη του σκευάσματος SmartFresh™ ProTabs, στο διάλυμα ενεργοποίησης.
5. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής να διατηρήσετε σε συνεχή λειτουργία τους ανεμιστήρες του εσωτερικού ψυκτικού συστήματος για διασφάλιση καλής κυκλοφορίας του αέρα εντός του θαλάμου. Ταυτόχρονα όλα τα συστήματα καθαρισμού (απορροφητές διοξειδίου του άνθρακα -CO₂ - και αιθυλενίου) και οι γεννήτριες όζοντος πρέπει να έχουν απενεργοποιηθεί.

6. Μην ανοίξετε τις πόρτες τουλάχιστον για 12 ώρες για την τομάτα και για 24 ώρες για μήλα, αχλάδια, δαμάσκηνα και ακτινίδια.
Για καλύτερα αποτελέσματα, σε χώρους ή κοντέινερ συντήρησης με σύστημα ελεγχόμενης ατμόσφαιρας μην αλλάξετε την ατμόσφαιρα του χώρου σε συνθήκες ελεγχόμενης ατμόσφαιρας για 24 ώρες τουλάχιστον. Συμβουλευτείτε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο για οδηγίες χρήσης σε κάθε ποικιλία.
7. Μετά το πέρας της εφαρμογής, ο θάλαμος εφαρμογής πρέπει να αεριστεί σχολαστικά κρατώντας στη μέγιστη ισχύ τη λειτουργία του συστήματος αερισμού του ψυκτικού μηχανισμού για τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την επανείσοδο.
8. Μείνετε μακριά από τη ζώνη αερισμού κατά την περίοδο αυτή.

.....

Μόλις σφραγιστεί ο θάλαμος εφαρμογής πρέπει να αναρτηθεί μία πινακίδα στην εξωτερική πλευρά της πόρτας του με την ένδειξη:

“ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ- ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ-
ΕΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ SMARTFRESH™ SMARTTABS

Η πινακίδα πρέπει να μείνει αναρτημένη στην πόρτα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εφαρμογής και η διαδικασία του αερισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ.

Η εκπαίδευση των χειριστών θα γίνεται με ευθύνη του κατόχου της έγκρισης. Οι εκπαιδευόμενοι γεωπόνοι και χειριστές θα γνωστοποιούνται στην Αρμόδια Αρχή και στην τοπική Αρμόδια Υπηρεσία.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΆΛΛΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μη χρησιμοποιείτε το SmartFresh™ ProTabs σε ανάμιξη ή ταυτόχρονα με άλλα μετασυλλεκτικά προϊόντα.

Μη χρησιμοποιείτε το SmartFresh™ ProTabs σε φρούτα στα οποία έχει προηγηθεί εφαρμογή Ethephon.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση των καταλοίπων εφαρμογής και των κενών συσκευασίας:

Με το πέρας της διαδικασίας εφαρμογής τα κατάλοιπα του διαλύματος και τα κενά συσκευασίας συλλέγονται σε ειδικά δοχεία/σακούς και απορρίπτονται ως μη επικίνδυνα απόβλητα.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το SmartFresh™ ProTabs είναι φυτορρυθμιστική ουσία στη μορφή δισκίων που περιέχουν τη δραστική ουσία 1-methylcyclopropene (1-MCP). Η δραστική ουσία 1-MCP αναστέλλει τη δέσμευση και δράση του αιθυλενίου εξουδετερώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις του στην ποιότητα φρούτων και λαχανικών κατά την περίοδο συντήρησης.

5		5.1 Φάσμα δράσης			
Προϊόντα	Στόχος	Δόσεις προϊόντος Αριθ. δισκίων/ m^3 αποθήκης		Όροι εφαρμογής	
		1 κίτρινο δισκίο (4.2 γρ.) για όγκο θαλάμου:	1 ροζ δισκίο (0.84 γρ.) για όγκο θαλάμου:	Μεγ. αριθ. εφαρμογών	Καταληκτικός χρόνος εφαρμογής
Μήλα	Διατήρηση συνεκτικότητας και οξύτητας, επιβράδυνση της ωρίμασης και έλεγχος του επιφανειακού εγκαύματος	40-75 m^3 αποθήκης	8-15 m^3 αποθήκης	3	Το συντομότερο δυνατόν μετά τη συγκομιδή το πολύ εντός 7 ημερών *
		Μέγιστη μεμονωμένη δόση: 0.112 γρ. προϊόντος / m^3 (2.24 mg δ.ο. / m^3)			
Αχλάδια	Διατήρηση συνεκτικότητας, επιβράδυνση της ωρίμασης, και έλεγχος επιφανειακού εγκαύματος και μείωση στο εσωτερικό καφέτισμα των καρπών	50-120 m^3 αποθήκης	10-24 m^3 αποθήκης	1	Το συντομότερο δυνατόν μετά τη συγκομιδή το πολύ εντός 7 ημερών
		Μέγιστη μεμονωμένη δόση: 0.081 γρ. προϊόντος / m^3 (1.62 mg δ.ο. / m^3)			
Δαμάσκηνα	Διατήρηση συνεκτικότητας, επιβράδυνση στο μαλάκωμα των καρπών	50-70 m^3 αποθήκης	10-14 m^3 αποθήκης	1	Το συντομότερο δυνατόν μετά τη συγκομιδή το πολύ εντός 7 ημερών
		Μέγιστη μεμονωμένη δόση: 0.081 γρ. προϊόντος / m^3 (1.62 mg δ.ο. / m^3)			
Ακτινίδια	Διατήρηση συνεκτικότητας, ρύθμιση της ωρίμασης / επιβράδυνση στο μαλάκωμα των καρπών	50-70 m^3 αποθήκης	10-14 m^3 αποθήκης	1	Το συντομότερο δυνατόν μετά τη συγκομιδή το πολύ εντός 7 ημερών
		Μέγιστη μεμονωμένη δόση: 0.081γρ. προϊόντος / m^3 (1.62mg δ.ο. / m^3)			
Τομάτες	Επιβράδυνση της ανάπτυξης/ εμφάνισης του κόκκινου χρώματος. Όταν εφαρμόζεται στην αλλαγή του χρώματος επιβραδύνει το μαλάκωμα της τομάτας.	50-70 m^3 αποθήκης	10-14 m^3 αποθήκης	1	Το συντομότερο δυνατόν μετά τη συγκομιδή κόκκινων καρπών και όχι αργότερα από 24 ώρες
		Μέγιστη μεμονωμένη δόση: 0.081 γρ. προϊόντος / m^3 (1.62 mg δ.ο. / m^3)			

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**

Το σκεύασμα SmartFresh ProTabs χρησιμοποιείται πάντα με τον Ενεργοποιητή SmartFresh™ ProActivators και το διάλυμα ενεργοποίησης SmartFresh™ ProPack

Ρυθμίστε τη δόση (και τον αριθμό εφαρμογών) ανάλογα με το μέγεθος του χώρου συντήρησης, την ποικιλία, το στάδιο ωρίμασης των φρούτων κατά τη συγκομιδή ή το μεσοδιάστημα μεταξύ συγκομιδής και εφαρμογής.

Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένους και αρμόδιους για διεξαγωγή αυτής της εργασίας.

Οι καρποί που προορίζονται για εφαρμογή του SmartFresh™ SmartTabs πρέπει να έχουν συγκομιστεί την κατάλληλη για κάθε ποικιλία χρονική περίοδο.

- 1) Για καλύτερα αποτελέσματα συνιστάται η εφαρμογή του SmartFresh™ SmartTabs σε καρπούς που έχουν συγκομιστεί την κατάλληλη για κάθε ποικιλία χρονική περίοδο, σε καλή κατάσταση και σε κατάλληλη ποιότητα κατά προτίμηση **εντός 7 ημερών από τη συγκομιδή για μήλα, αχλάδια, δαμάσκηνα και ακτινίδια εντός 24 ωρών από τη συγκομιδή κόκκινων καρπών ντομάτας.**
- 2) Καθυστερημένες εφαρμογές μετά τα χρονικά αυτά διαστήματα (24 ώρες και 7 ημέρες) μπορεί να είναι αποτελεσματικές σε ορισμένες περιπτώσεις (ανάλογα με την ποικιλία και την ωρίμαση) αλλά τα αποτελέσματα είναι λιγότερο προβλέψιμα.
- 3) Ενδέχεται να είναι μειωμένη η αποτελεσματικότητα σε καρπούς που είναι σε κακή κατάσταση, χαμηλής ποιότητας και έχουν ωριμάσει πριν από τη συγκομιδή, αποθήκευση και εφαρμογή του σκευάσματος.
- 4) Η εφαρμογή μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε θερμοκρασία μεταξύ της ελάχιστης συνιστώμενης για συντήρηση κάθε ποικιλίας -συμπεριλαμβανομένης της θερμοκρασίας ψύξης και της θερμοκρασίας περιβάλλοντος (20°C).
- 5) Οι καρποί πρέπει να είναι καλής ποιότητας συμβατοί με παρατεταμένη συντήρηση/ αποθήκευση.
- 6) Για τα μήλα φροντίστε οι καρποί να έχουν δεχθεί ισορροπημένη λίπανση ασβεστίου.

Περιορισμοί:

*Ο χρόνος εφαρμογής στα μήλα ισχύει για κάθε διαδοχική παρτίδα συγκομιδής που εισάγεται στον θάλαμο συντήρησης.

Η αποτελεσματικότητα σε ποικιλίες Cox και Bramley είναι περιορισμένη.

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο [Παράρτημα II](#).

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Να εφαρμόζεται σε θάλαμο που κλείνει αεροστεγώς. Η καλή στεγανότητα του θαλάμου διασφαλίζει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα της εφαρμογής (βλ. οδηγίες εφαρμογής).

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
 - της πρόσβασης **του ανθρώπου** ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

--

--

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΜΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ / ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (12 ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ 24 ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΜΗΛΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ) ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ (15 ΛΕΠΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ).

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Η γευστική ποιότητα των μήλων μπορεί να μεταβληθεί μετά τη χρήση του προϊόντος

- 9** Εικονογράμματα κινδύνου (ξεχωριστή ταξινόμηση και επισήμανση για το φ.π. και τα απαραίτητα για την εφαρμογή του συστατικά ενεργοποίησης)

SmartFresh™ ProTabs

(Δισκία σκευάσματος): --

SmartFresh™ ProActivators

(Δισκία Ενεργοποιητή): --

SmartFresh™ ProPack

(Διάλυμα ενεργοποίησης):



(GHS07)

ΠΡΟΣΟΧΗ

- 10** Δηλώσεις επικινδυνότητας (ξεχωριστή ταξινόμηση και επισήμανση για το φ.π. και τα απαραίτητα για την εφαρμογή του συστατικά ενεργοποίησης)

SmartFresh™ ProTabs

(Δισκία σκευάσματος): --

SmartFresh™ ProActivators

(Δισκία Ενεργοποιητή): --

SmartFresh™ ProPack

(Διάλυμα ενεργοποίησης):

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό
H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

P102 + P405 Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο .
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280 Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια πρόσωπο.
SP1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν η τη συσκευασία του.
 (Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά.
 Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους)
ΕΥΗ 401 Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

Προστασία των χειριστών:

ΜΕΙΝΕΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΕΡΙΣΜΟ
 ΜΗΝ ΑΝΑΠΝΕΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΤΜΟΥΣ

Μετά την εφαρμογή συνιστάται να συλλέξετε και να απομακρύνετε τυχόν καταλοίπων του διαλύματος 1-methylcyclopropane.

Ανοίξτε την πόρτα και συνεχίστε τη λειτουργία του συστήματος αερισμού στη μέγιστη ισχύ για τουλάχιστον 15 λεπτά. Συνιστάται κατά τη διάρκεια αυτή να παραμείνετε εκτός της ζώνης αερισμού.

Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένους και αρμόδιους για διεξαγωγή αυτής της εργασίας.

Φορέστε κατά τον χειρισμό του προϊόντος κατάλληλα προστατευτικά γάντια και συγκεκριμένα τον παρακάτω ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό κατά την ενεργοποίηση του συστήματος εφαρμογής και κατά την παραλαβή και απομάκρυνση της σακούλας με τα κατάλοιπα του διαλύματος, μετά από την εφαρμογή :

- Γάντια νιτριλίου εγκεκριμένα για προστασία από χημικά (σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο EN 374-3).
- Ειδική ολόσωμη αδιάβροχη φόρμα (υλικό από βαμβάκι/ πολυεστέρα 35% / 65%, ελάχιστου βάρους 230g/m² min).
- Αδιάβροχος ρουχισμός (μακρυμάνικη μπλούζα ή ποδιά εγκεκριμένης κατηγορίας III τύπου 3 (PB3).
- Προστατευτικά γυαλιά ή μάσκα προσώπου για προστασία από χημικά (σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο EN 166).
- Μπότες ασφαλείας σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς και το πρότυπο EN 13-832-3.

Τα μολυσμένα ρούχα και η ποδιά εργασίας πρέπει να πλένονται πριν ξαναφορεθούν.

Τυχόν εργαζόμενοι στο χώρο για προστασία τους πρέπει να φορέσουν γάντια νιτριλίου μιας χρήσης (αμφιδέξια γάντια από λεπτό υλικό είναι αποδεκτά) και ολόσωμη φόρμα τύπου 5 ή 6.

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Για SmartFresh™ ProTabs και για SmartFresh™ ProActivators:

Σε περίπτωση υποψίας δηλητηρίασης, συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό και καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε καλά με νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης: Χορηγήστε στον παθόντα δυο ποτήρια νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

SmartFresh™ ProPack (Διάλυμα ενεργοποίησης):

Σε περίπτωση υποψίας δηλητηρίασης, συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό και καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων

P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε τα προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε καλά με νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης: Χορηγήστε στον παθόντα δυο ποτήρια νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Σημείωση:

Η ετικέτα κάθε ξεχωριστής συσκευασίας θα φέρει την απαιτούμενη επισήμανση. Το ίδιο ισχύει και για τα εξωτερικά χαρτοκιβώτια μεταφοράς / αποθήκευσης αυτών. Στην περίπτωση μεταφοράς / προσωρινής αποθήκευσης από κοινού όλων των συσκευασιών σε μεγάλο κοινό εξωτερικό χαρτοκιβώτιο, η ετικέτα του χαρτοκιβωτίου επιβάλλεται να φέρει την πιο αυστηρή επισήμανση (π.χ. την επισήμανση του διαλύματος ενεργοποίησης SmartFresh ProPack εφόσον συμπεριλαμβάνεται).

13 Προστασία των καταναλωτών

1-MCP

Όπως έχουν καθοριστεί με τον Κανονισμού 396/2006

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Αποθηκεύεται στην αρχική αεροστεγή συσκευασία του σε μέρος ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια.
Προφυλάξτε το από παγετό .

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο [Παράρτημα III](#) καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει στην ΣΕΑ την αξιολόγηση των περαιτέρω στοιχείων που ζητήθηκαν από την εισηγήτρια χώρα (Γαλλία).

Β Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ