



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΠ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 01-06-2016**

**Αριθ. πρωτ: 4549/52112**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 928 7211  
e-mail: [inasiopoulos@minagric.gr](mailto:inasiopoulos@minagric.gr)**

**Προς: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ  
Εθνικής Αντιστάσεως 73  
Τ.Κ. 15231 – Χαλάνδρι**

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) Qualy-T (δρ. ουσίες: cyprodinil + tebuconazole)»**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup>-10-2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 33 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνονται οι δραστικές ουσίες cyprodinil και tebuconazole.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10<sup>ης</sup>-6-11 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
7. Τον Κανονισμό 1272/2008 του Ε. Κ. και του Συμβουλίου της 16-12-08 “για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006”.
8. Τη με αριθ. 14309/162816/22.12.14 Απόφασή μας με θέμα “Αντικατάσταση των εθνικών απαιτήσεων κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστ. προϊόντων βάση του Καν. 1107/2009”.
9. Τις με αριθ. πρωτ. 7927/86383/3.7.14 και 4549/52112/28.4.16 σχετικές αιτήσεις της εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ.

10. Το με αριθ. ΕΜΠ 1413/13.11.15 έγγραφο του ΜΦΙ, με το οποίο απεστάλησαν στη ΣΕΑ οι απαντητικοί πίνακες και τα τελικά αναθεωρημένα τμήματα Β και Γ της έκθεσης αξιολόγησης του σκευάσματος.
11. Τη με αριθ. Υ 26/6.10.15 (Β' 2144) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.
12. Τη με αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β' 2367/4.11.15) με θέμα την "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- A.** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) Qualy-T (δρ. ουσίες: cyprodinil+tebuconazole). Η έγκριση χορηγείται με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

### **1** Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

#### Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης  
1.1.β Ημερομηνία λήξης

<b>60.536</b>
<b>01.06.2016</b>
<b>31.08.2020</b>

#### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα  
1.2.β Μορφή:

<b>Qualy-T</b>
<b>Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)</b>

#### **1.3 Δραστικές ουσίες**

<b>Δραστική ουσία 1</b>	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	<b>Cyprodinil</b>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	<b>993 g/kg min</b>
Χημική ομάδα	<b>ανιλινοπυριμιδίνες</b>
Παρασκευαστής	<b>ADAMA Makhteshim Ltd</b> Northern Industrial Zone PO Box 60, Beer-Sheva 84100, Ισραήλ <i>European address</i> <b>ADAMA Deutschland GmbH</b> Edmund Rumpler Str. 6 51149 Köln, Germany
Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.	<b>ADAMA Makhteshim Ltd</b> Northern Industrial Zone PO Box 60, Beer-Sheva 84100, Ισραήλ
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Έχουν υποβληθεί και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

<b>Δραστική ουσία 2</b>	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	<b>Tebuconazole</b>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	<b>975 g/kg min</b>
Χημική ομάδα	<b>τριαζολών</b>
Παρασκευαστής	<b>ADAMA Irvita N.V.</b> Pos Cabai Office Park, Unit 13 POB 403, Curacao.

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.	<b>ADAMA Makhteshim Ltd</b> Ramat-Hovav Industrial Zone 84100 -Beer-Sheva, Ισραήλ <b>ADAMA Brasil S/A</b> S.A.Pedro Antonio de Souza, 400 86031-610 Londrina – PR, Brazil <b>Rudong Zhongyi Chemical Co., Ltd</b> The Second Haibin Road Coastal Economic Development Zone Rudong – Jiangsu, China.
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Έχουν υποβληθεί και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

**ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**  
Εθνικής Αντιστάσεως 73, Τ.Κ. 15231 – Χαλάνδρι  
Τηλ.: 211 120 5570, Fax: 211 120 5572  
E-mail: [technical@alfagro.gr](mailto:technical@alfagro.gr)

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

--

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

Ο κάτοχος της έγκρισης

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**ADAMA Makhteshim Ltd**  
PO Box 60, Beer-Sheva 84100, Ισραήλ

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

**ADAMA Makhteshim Ltd**  
PO Box 60, Beer-Sheva 84100, Ισραήλ

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

1. **ADAMA Makhteshim Ltd**  
PO Box 60, Beer-Sheva 84100, Ισραήλ  
  
2. **ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**  
Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτίας  
32 011 - Οινόφυτα, Βοιωτίας  
Τηλ.: 2262 – 30821-3, FAX: 2262 – 30820

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική Cyprodinil 18.75 % (β/ο) + Tebuconazole 12.5 % (β/ο)  
Βοηθητικές ουσίες 69,1% β/β  
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, παρουσιάζεται στο [Παράρτημα Ι](#) της παρούσας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

## 2 Συσσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	50, 60, 80, 100, 120, 150, 160, 200, 240, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800 κ. εκ. & 1 λίτρο	Πλαστικό τύπου COEX (HDPE/EVOH)
2.	Δοχεία	2, 3, 5 & 10 λίτρα	Πλαστικό τύπου COEX (HDPE/EVOH)

**3** Οδηγίες χρήσης:**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.****Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί φυλλώματος.**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Το ψεκαστικό υγρό θα πρέπει να βείσκειται υπό συνεχή ανάδευση.**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύντε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.**Συνδυαστικότητα:** --**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση. Μίγμα δυο δραστικών ουσιών με διαφορετικό τρόπο δράσης:

Το cyprodinil, διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των ανιλινοπυριμιδών, με προληπτική και θεραπευτική δράση. Παρεμποδίζει την βιοσύνθεση των αμινοξέων, αναστέλλοντας την επιμήκυνση του μυκηλίου και την διείσδυση του στους φυτικούς ιστούς.

Το tebuconazole, διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας DMIs (υποομάδα τριαζολών), με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων (Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες). Σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14 (Demethylation Inhibitors – DMIs)

**5** 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο. Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		Κ.εκ./ στρέμμα	Κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Μηλιά	Φουζικλάδιο ( <i>Venturia inaequalis</i> )	42 - 60	60	70 - 100	Εφαρμογή από την πράσινη κορυφή έως το στάδιο μικρών καρπών	1
Αχλαδιά	Φουζικλάδιο ( <i>Venturia pyrina</i> )	42 - 60	60	70 - 100	Εφαρμογή από την πράσινη κορυφή έως το στάδιο μικρών καρπών	1
	Καστανή κηλίδωση ( <i>Stemphlium vesicarium</i> )	48 - 100	60 - 100	80 - 100		

Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερκοκιά	Φαιά σήψη ανθέων και καρπών ( <i>Monilia laxa</i> , <i>Monilia fructigena</i> )	48 - 80	60 – 80	80 - 100	Εφαρμογή όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του παθογόνου, από την έναρξη της άνθησης έως την ωρίμανση	1
Αμπέλι (Επιτραπέζια και Οινοποιήσιμα σταφύλια)	Βοτρύτης ( <i>Botrytis cinerea</i> )	120 - 160	120 – 160	50-100	Εφαρμογή όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του παθογόνου από το κλείσιμο έως την αλλαγή του χρώματος των σταφυλιών	1
Αμπέλι (Επιτραπέζια και Οινοποιήσιμα σταφύλια)	Βοτρύτης ( <i>Botrytis cinerea</i> )	120	120	50-100	Εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του παθογόνου από το κλείσιμο έως την αλλαγή του χρώματος των σταφυλιών	2 με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14-16 ημέρες

**Παρατηρήσεις:**

Να ακολουθούνται οι οδηγίες των Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές που εφαρμόζονται.  
Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II της παρούσας.

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

**Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, συνίσταται οι εφαρμογές με το **Quality-T** να γίνουν με μυκητοκτόνα από άλλες ομάδες με διαφορετικό τρόπο δράσης από τις ανιλινοπυριμιδίνες και τις τριαζόλες.

**7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:  
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας  
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν  
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

--

--

Να αποφεύγεται η επανείσοδος των ανθρώπων μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό .

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, εναισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.

**9** ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ



GHS07, GHS08, GHS09  
**ΠΡΟΣΟΧΗ**

10

ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

**H319** Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  
**H361d** Υποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.  
**H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις  
**EUH208** Περιέχει cyprodinil, Rosin, Propanoic acid και 2-hydroxy-,2-ethylhexyl ester. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

11

ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

**P405 +P102** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  
**P201** Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από την χρήση  
**P270** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν  
**P273** Να αποφεύγετε η ελευθέρωση στο περιβάλλον  
**P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/  
μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.  
«Φοράτε κατάλληλα γάντια, ολόσωμη φόρμα, μπότες και μέσα προστασίας για τα  
μάτια/πρόσωπο κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή»  
«Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν γάντια και ολόσωμη φόρμα εάν εισέλθουν στο πεδίο  
εφαρμογής λίγο μετά τον ψεκασμό».  
**SP1** Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον  
εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.  
**SPE3** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη  
από από μη γεωργική γή:  
Σε αμπέλι:  
**10 μέτρων** με την χρήση συμβατικών ακροφύσιων ή  
**5 μέτρων** με τη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκ. νέφους κατά 50%  
Σε Μηλοειδή:  
**20 μέτρων** με την χρήση συμβατικών ακροφύσιων ή  
**15 μέτρων** με τη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους  
κατά 75%  
**10 μέτρων** με τη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους  
κατά 90%  
**και 10 μέτρα** ζώνη φυτικής κάλυψης  
Σε Πυρηνόκαρπα:  
**25 μέτρων** με την χρήση συμβατικών ακροφύσιων ή  
**15 μέτρων** με τη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους  
κατά 30%  
**10 μέτρων** με τη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους  
κατά 70%  
**3 μέτρων** με τη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά  
90%  
**EUH401** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,  
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

12

Πρώτες  
βοήθειες -  
Αντίδοτο

**P305 + P351 + P338** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε  
προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους,  
εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  
**Σε περίπτωση κατάποσης:** ξεπλύνετε το στόμα. Μη προκαλέσετε εμετό.  
Συμβουλευτείτε γιατρό.  
**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μετακινήστε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και  
προστατεύστε τον από την υποθερμία.  
**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** αφαιρέστε τα ρούχα που έχουν λερωθεί με το  
σκεύασμα και ξεπλύνετε καλά το δέρμα με νερό και σαπούνι.  
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.  
**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777**

13

Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα όρια υπολειμμάτων (MRLs): σύμφωνα με τον Κανονισμό 396/2005, όπως ισχύει.

**13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή**

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μηλιά, Αχλαδιά	60
Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά	7
Αμπέλι	21 (Οινοποιήσιμα) 28 (Επιτραπέζια)

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Διατηρήστε το στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, προστατευμένο από παγετό και πηγές ανάφλεξης. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

**15** Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16** Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**17** Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 2 ετών από την έκδοση της παρούσας να προσκομίσει στην ΣΕΑ και το ΜΦΙ τα παρακάτω, όπως αναφέρονται στην έλθεση αξιολόγησης:

1. A fully validated method according to SANCO/825/00 rev 8.1 (including confirmatory and ILV) for the determination of cyprodinil residues in products of animal origin (milk, eggs, meat, fat, liver/kidney) for the enforcement of cyprodinil, covering the current animal residue definition and the established MRLs.
2. An ILV method for the evaluation of the new LC-MS/MS method (Sahvorost, N. and Class, Th., 2014) at active substance level by RMS Denmark.
3. Δύο Ελληνικά πειράματα φυτοτοξικότητας στις ποικιλίες αχλαδιών «Κοντούλα» και «Κρυστάλλι».
4. Περαιτέρω δοκιμές αποτελεσματικότητας σε μηλοειδή για την καταπολέμηση του Φουζικλάδιου, σε αχλαδιά για την καταπολέμηση της Καστανής Κηλίδωσης και σε πυρηνόκαρπα για την καταπολέμηση της Φαιάς σήψης, σύμφωνα με τις οδηγίες ΕΡΡΟ.
5. Περαιτέρω δοκιμές απουσίας αρνητικών επιδράσεων στις διαδικασίες μεταποίησης και στην ποιότητα των προϊόντων.

**B.** Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Η Προϊσταμένη**  
**της Γενικής Δ/σης Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής**

**ΕΛ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ**