



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΠΑΤ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Φ. & Β.Π.

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 3 - 11 - 2015
Αριθ. Πρωτ. 10420/119230

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Θεοδωρής Παναγιώτης
Τηλέφωνο: 210 928 7225
Email: ptheodoris@minagric.gr

Προς: UPL EUROPE LIMITED

Δια της υπευθύνου επικοινωνίας:
Ευτυχία Ε. Λεφάκη
Σωκράτους 12
176 71 Καλλιθέα
lefakief@otenet.gr

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης
στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό
προϊόν (μυκητοκτόνο) SACRON 45 WG

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 80.5 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
4. Την από 18/05/2015 γνώμη της Αρμόδιας Αρχής της Γαλλίας επί του φακέλου υπ' αριθμ. 2012-1182-SACRON.
5. Τη με αριθ. Πρωτ. 6252/78481(ΦΕΚ 309/Β/02.03.2015) Απόφαση Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του πρώην Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6. Τη με αριθμ. Υ 26/06-10-2015 (ΦΕΚ 2144/τΒ'/06-10-2015) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.

7. Τη με αριθ. πρωτ. 2950/32747/19/03/2012 αιτήσεις της **UPL EUROPE LIMITED**
 8. Το Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 80.5 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **SACRON 45 WG** της εταιρείας **UPL EUROPE LIMITED**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

60483
03/11/2015
31/08/2020

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

SACRON 45 WG

1.2.β Μορφή:

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες)

Δραστική ουσία	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	Cymoxanil
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	97 % (β/β) min
Χημική ομάδα	Ακεταμίδια (cyanoacetamide oximes)
Παρασκευαστής	UPL EUROPE LIMITED Birchwood Park Warrington, WA3 6YN Ηνωμένο Βασίλειο
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	1. SHAOXING EASTLAKE BIOCHEMICAL CO. Mahai Doumen Town Shaoxing, Κίνα 2. UPL LIMITED GIDC Ankleshwar District-Bharuch Gujarat-393002 Ινδία
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν με το με αριθ. πρωτ. 2950/32747/19/03/2012 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

UPL EUROPE LIMITED
 Birchwood Park, Warrington,
 WA3 6YN, Ηνωμένο Βασίλειο
 Τηλ: +44 1925 859009
 Fax: +44 1925 817425
 E-mail: ahaley@uniphos.com

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Ευτυχία Ε. Λεφάκη
 Σωκράτους 12,
 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα
 Τηλ: 210 93 41 976
 E-mail: lefakief@otenet.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
 Εθνικής Αντιστάσεως 73
 Τ.Κ. 15231 – Χαλάνδρι
 Τηλ.: 211 120 5570
 Fax: 211 120 5572
 E-mail: technical@alfagro.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

UPL EUROPE LIMITED
 Birchwood Park
 Warrington, WA3 6YN
 Ηνωμένο Βασίλειο

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

CEREXAGRI B.V.
 Tankhoofd 10
 3196 KE VONDELINGENPLAAT
 Rotterdam, Ολλανδία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

1. CEREXAGRI B.V.
 Tankhoofd 10
 3196 KE VONDELINGENPLAAT
 Rotterdam, Ολλανδία

2. ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
 Διεύθυνση εργοστασίου:
 Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτίας
 32 011 - Οινόφυτα, Βοιωτίας
 Τηλ.: 2262 – 30821-3
 FAX: 2262 – 30820
 E-mail: nikos.kosmidis@alfagro.gr

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

cytioxanil: 45 % β/β

βοηθητικές ουσίες: 54,10 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το με αριθ. πρωτ.

2950/32747/19/03/2012 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Σακίδιο /σακούλα μέσα σε κουτί	25, 30, 50, 60, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800 γρ., 1, 1,5, 2 και 2,5 κιλών	Κουτί από χαρτόνι Σακίδιο /σακούλα από PE ή AL ή σύνθετο υλικό με εσωτερική επίστρωση PE (PET/AL/PE)
2	Σακίδιο /σακούλα	50 γρ., 60, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800 γρ., 1, 1,5, 2 και 2,5 κιλών	PE ή AL ή σύνθετο υλικό με εσωτερική επίστρωση PE (PET/AL/PE)

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμοί φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με καθαρό νερό. Διαλύστε την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού, ρίξτε το στο ψεκαστικό και προσθέστε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας καλά. Συνεχίστε την ανάδευση σ όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό έως του ο αφρός και όλα τα ίχνη του σκευάσματος έχουν απομακρυνθεί.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας (σακούλες/κουτιά) αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Συνδυάζεται ανεξάρτητα με τη σειρά προσθήκης στο ψεκαστικό διάλυμα με προστατευτικά μυκητοκτόνα σκευάσματα διαφορετικού τρόπου δράσης (mancozeb, maneb, βορδιγάλειου πολτού, folpet κ.α.) Σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιούνται οι εγκεκριμένες για κάθε σκεύασμα δόσεις ανά καλλιέργεια/ασθένεια.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο τοπικά διασυστηματικό (δισυσδυτικό) και επαφής με προληπτική και θεραπευτική δράση για την καταπολέμηση του περονόσπορου σε αμπέλι πατάτα και τομάτα υπαίθρου. Δρα ανασταλτικά στη δημιουργία σπορίων από τον μύκητα.

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθ εφαρμογών ανά καλ/κή περίοδο & μεσοδιαστήματα επεμβάσεων (ημέρες)
		γρ/ στρέμμα (max)	γρ/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Αμπέλι (οινοποιήσιμες & επιτραπέζιες ποικιλίες)	Περονόσπορος (<i>Plasmopara viticola</i>)	27	27-54	50-100	Προληπτικοί ψεκασμοί από το στάδιο των 3 φύλλων όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ και έπειτα, ανάλογα με την πίεση προσβολής (BBCH13- 85)	3 ανά 7-10 ημ.
Πατάτα	Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>)	22	22-44	50-100	Προληπτικοί ψεκασμοί που αρχίζουν όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ. και επαναλαμβάνονται ανάλογα με την πίεση προσβολής (BBCH 21- 95)	6 ανά 7-10 ημ.
Τομάτα (Υπαίθρου – επιτραπέζιες ποικιλίες)	Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>)	27	27- 54	50-100	Προληπτικοί ψεκασμοί από το στάδιο του τρίτου πραγματικού φύλλου και έπειτα ανάλογα με την πίεση προσβολής (BBCH 13 - 87)	5 ανά 7 ημ.
Τομάτα (Υπαίθρου – βιομηχανικές ποικιλίες)	Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>)	27	27- 54	50-100	Προληπτικοί ψεκασμοί από το στάδιο του τρίτου πραγματικού φύλλου και έπειτα ανάλογα με την πίεση προσβολής (BBCH 13 -85)	5 ανά 7 ημ.

Παρατηρήσεις:

1. Να χρησιμοποιείται **πάντα** σε ανάμιξη με προστατευτικά μυκητοκτόνα επαφής διαφορετικού τρόπου δράσης (π.χ. mancozeb, folpet, copper κ.λπ.).
2. Οι εφαρμογές είναι προληπτικές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Να ακολουθούνται οι οδηγίες των Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές που εφαρμόζονται.
3. Να αυξάνετε τον όγκο του ψεκαστικού υγρού καθώς η καλλιέργεια αυξάνει σε φυλλική επιφάνεια.
4. Προσαρμόστε τις δόσεις ανάλογα, έτσι ώστε να μην ξεπεραστεί η μέγιστη δόση ανά στρέμμα.

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II της παρούσας

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Για αποτροπή ανάπτυξης συμπτωμάτων ανθεκτικότητας αλλά και για επιμήκυνση της διάρκειας προστασίας λόγω της συνεργιστικής του δράσης συνιστάται κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου να εφαρμόζεται σε ανάμιξη ή εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης.

Να μην εφαρμόζεται αν το φύλλωμα είναι υγρό (μετά από άρδευση ή βροχή) ή αν αναμένεται βροχή ή παγετός αμέσως μετά τον ψεκασμό ή αν τα φυτά είναι σοκαρισμένα.

Αν βρέξει σε λιγότερο από 2 ώρες από την εφαρμογή συνιστάται επανάληψη της εφαρμογής.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
 - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

--

--

Όταν στεγνώσει το φύλλωμα των καλλιεργειών μετά τον ψεκασμό.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

- 9** ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ



(GHS-07)



(GHS-08)



(GHS-09)

- 10** ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης

H361fd: Υποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο.

H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

EUH208 Περιέχει cytochanil. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

EUH401 Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

11 ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
P260 Μην αναπνέετε σκόνη ή εκνεφώματα
P264 Πλύνετε τα χέρια και το πρόσωπο σχολαστικά μετά το χειρισμό.
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο

SP1 ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ
 (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα)

EUH401 Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία κα το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

12 Πρώτες βοήθειες -
Αντίδοτο

Πρώτες βοήθειες

Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα.
P301+P312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Μην προκαλείτε εμετό χωρίς ιατρική συμβουλή και μη χορηγήσετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.
 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική αγωγή.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αμπέλι	28
Πατάτα	7
Τομάτα υπαίθρου	3
Τομάτα βιομηχανική	10
*Πριν από κάθε εφαρμογή να συμβουλευέστε τις οδηγίες χρήσης του εκάστοτε αναμιγνυόμενου προστατευτικού μυκητοκτόνου και να συμμορφώνεστε με τη συνιστώμενη τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.	

14 Συνθήκες αποθήκευσης,
χρονική σταθερότητα του
σκευάσματος.

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο **Παράρτημα III** της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ