



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 19 - 11 - 2015
Αριθ.πρωτ: 9079/102771

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 9212090
Πληροφορίες: Νίκος Παπανικολάου
Τηλέφωνο: 210 9287230
e-mail: npapanikolaou@minagric.gr

Προς: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20,
151 25, Μαρούσι
e-mail: ioannis.tsoutsanis@bayer.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 60405 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) FLINT MAX 75 WG (trifloxystrobin 25% β/β + tebuconazole 50% β/β) ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Την υπ' αριθ. 9379/119137/2.11.2015 (ΦΕΚ 2367Β'/4.11.2015) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων"
4. Την από 23-9-2015 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε τη με αριθ. 60405 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) FLINT MAX 75 WG (trifloxystrobin 25% β/β + tebuconazole 50% β/β) , που

χορηγήθηκε με την αριθ. 1370/18220/07.02.2014 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή.

Συγκεκριμένα, τα σημεία 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

5 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ./100 λίτρα νερού	Όγκος ψεκαστικού υγρού λίτρα/στρέμμα	γρ.σκ./στρέμμα		
Αμπέλι (Επιτραπέζιες ποικιλίες)	Ωίδιο (<i>Erysiphe necator</i>)	18-20	100	18-20	Προληπτικοί/Θεραπευτικοί ψεκασμοί φυλλώματος από την έκπτυξη του πέμπτου φύλλου μέχρι το τέλος της άνθησης. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 14 ημέρες	3
Αμπέλι (Οινοποιήσιμες ποικιλίες)	Ωίδιο (<i>Erysiphe necator</i>)	18-20	100	18-20	Προληπτικοί/Θεραπευτικοί ψεκασμοί φυλλώματος από την έκπτυξη του πέμπτου φύλλου μέχρι την έναρξη χρωματισμού των ραγών. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 14 ημέρες	3
Μηλιά	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i>) Ωίδιο (<i>Podosphaera leucotricha</i>) Αλτερνάρια (<i>Alternaria alternata</i>)	20	150	30	Προληπτικές εφαρμογές από την περίοδο πριν την άνθηση μέχρι πριν τη συγκομιδή (πλήρης ωρίμανση). Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 10-12 ημέρες	3
Αχλαδιά	Φουζικλάδιο (<i>Venturia pirina</i>) Στεμφύλιο (<i>Stemphylium vasicarium</i>)	20	150	30	Προληπτικές εφαρμογές από την περίοδο πριν την άνθηση μέχρι πριν τη συγκομιδή (πλήρης ωρίμανση). Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 10-12 ημέρες	3
Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	20	150	30	Προληπτικές εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογών: 10-12 ημέρες	2

	Μονίλια (<i>Monilia</i> spp.)				Προληπτικές εφαρμογές από την έναρξη της άνθησης με μεσοδιάστημα εφαρμογών 12-14 ημερών και πριν τη συγκομιδή (πλήρης ωρίμανση) με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημερών.	
	Εξώασκος της Ροδακινιάς (<i>Taphrina deformans</i>)				Προληπτικές εφαρμογές από την έναρξη της βλάστησης. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 12-14 ημέρες.	
Δαμασκηλιά, Κερασιά	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	20	150	30	Προληπτικές εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογών: 10-12 ημέρες	3
	Μονίλια (<i>Monilia</i> spp.)				Προληπτικές εφαρμογές από την έναρξη της άνθησης με μεσοδιάστημα εφαρμογών 12-14 ημερών και πριν τη συγκομιδή (πλήρης ωρίμανση) με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημερών.	
	Εξώασκος της Ροδακινιάς (<i>Taphrina deformans</i>)				Προληπτικές εφαρμογές από την έναρξη της βλάστησης. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 12-14 ημέρες.	
Ελιά	Κυκλοκόνιο (<i>Spilocaea oleagina</i>)	20	125	25	Προληπτική εφαρμογή από την έναρξη της βλάστησης μέχρι πριν την άνθηση. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 12-14 ημέρες.	1
Τομάτα, Πιπεριά (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου)	Ωίδιο (<i>Leveillula taurica</i>)	20-30	150 (Θερμοκ ήπιο) 100 (Υπαίθρι ες)	30	Προληπτικές εφαρμογές από το στάδιο πριν την άνθηση έως πριν τη συγκομιδή (πλήρης ωρίμανση). Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 8-12 ημέρες.	3
Αγγούρι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου)	Ωίδιο (<i>Podosphaera fusca, Erysiphe cichoracearum</i>)	20-30	150 (Θερμοκ ήπιο) 100 (Υπαίθρι ες)	30	Προληπτικές εφαρμογές από το στάδιο πριν την άνθηση έως πριν τη συγκομιδή (πλήρης ωρίμανση). Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 8-12 ημέρες.	3

Παρατηρήσεις:

1. Προληπτικές εφαρμογές πριν την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.
2. Σε περίπτωση υψηλής προσβολής χρησιμοποιείτε το Flint Max στην υψηλή του δοσολογία και με τα πιο σύντομα μεσοδιαστήματα.

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο [Παράρτημα II](#) της παρούσας

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αμπέλι (Επιτραπέζιες ποικιλίες)	Εφαρμογή μέχρι το τέλος της άνθησης
Αμπέλι (Οινοποιήσιμες ποικιλίες)	14
Μηλιά, Αχλαδιά	14
Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά	7
Τομάτα, Πιπεριά, Αγγούρι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα	3

- II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. 1370/18220/07.02.2014 Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΠ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ