



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 21 -01 - 2019
Αριθ. πρωτ: 779/11753**

**Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Π. Θεοδωρήs
Τηλέφωνο: 210 928 7225
e-mail: ptheodoris@minagric.gr**

**Προς: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20, Μαρούσι**

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αριθ. 60612 οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) LUNA EXPERIENCE SC (δ.ο. fluopyram και tebuconazole) ως προς το φάσμα δράσης (Χρήσεις Ήσσοнос Σημασίας) και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 452/2016 της Επιτροπής της 29 Μαρτίου 2016.
3. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 (ΦΕΚ Β'/2587) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσοнос σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσοнос σημασίας»
5. Το από Απρίλιο 2018 PART A, όπως αναρτήθηκε στην πλατφόρμα ανταλλαγής εγγράφων της ΕΕ CIRCA BC (επικειροποιημένη έκδοση 16/10/2018) και τα σχόλια των υπολοίπων ΚΜ επί αυτού.
6. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
7. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 12190/118010/08.11.2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Τροποποιούμε την με αριθ. **60612** οριστική έγκριση διάθεσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **LUNA EXPERIENCE SC** (δ.ο. **fluopyram και tebuconazole**) που χορηγήθηκε με την με αριθ. **329/3966/24-04-2017** απόφαση μας ως προς το φάσμα δράσης (Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας- σημείο 5), και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (σημείο 13).

5 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες
		κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	κ.εκ. / στρέμμα	Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα / στρέμμα		
Αμπέλι (Οινοποιήσιμες ποικιλίες) (VITVI)	Ωίδιο (<i>Uncinula necator</i>) UNCINE	30-40	12-40	40-100	Εφαρμογές από το στάδιο των 5 πραγματικών φύλλων και μέχρι οι ράγες να αποκτήσουν μέγεθος σκαγιού (BBCH 15-73).	3/12
Μηλιά (MABSD)	Ωίδιο (<i>Podosphaera leucotricha</i>) PODOLE	40-50	20-75	50-150	Εφαρμογές από το στάδιο της ρόδινης κορυφής μέχρι την έναρξη της συγκομιδής (BBCH 57-87).	2/7 Μία εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο ή εναλλακτικά 2 εφαρμογές από τα μέσα Αυγούστου έως το τέλος Οκτωβρίου όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο.
	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis, Venturia pirina</i>) VENTIN VENTPI					
Αχλαδιά (PYUCO)	Στεμφύλιο (<i>Stemphylium vesicarium</i>) PLEOAL (STEMPS)					
	Αλτερνάρια (<i>Alternaria alternata, Alternaria spp.</i>) ALTEAL ALTESP					
	Μετασυλλεκτικές σήψεις από:					
	Αλτερνάρια (<i>Alternaria mali</i>) ALTEMA	50	75	150		
	Βοτρώτη (<i>Botrytis cinerea</i>) BOTRCI					

	Φαιά σήψη (<i>Monilinia fructigena</i>) MONIFG					
Ροδακινιά (PRNPS) Νεκταρινιά (PRNPN) Βερικοκιά (PRNAR) Κερασιά (PRNAV) Χρήση Ήσσοнос Σημασίας Δαμασκηινιά * (PRNDO)	Φαιά σήψη (<i>Monilinia laxa</i> , <i>Monilinia fructigena</i> , <i>Monilia</i> spp.) MONILA MONIFG MONISP	40-50	75	50-150	Εφαρμογές από το στάδιο της ρόδινης κορυφής μέχρι την έναρξη της συγκομιδής (BBCH 57-87). Η μέγιστη ποσότητα προϊόντος ανά καλλιεργητική περίοδο να μην ξεπερνάει τα 200 κ.εκ./στρέμμα.	2/7 Μία εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο ή εναλλακτικά 2 εφαρμογές από τα μέσα Αυγούστου έως το τέλος Οκτωβρίου στις καλλιέργειες που αυτό είναι εφαρμόσιμο.
	Μετασυλλεκτικές σήψεις από: Βοτρύτη (<i>Botrytis cinerea</i>) BOTRCI					
	Φαιά σήψη (<i>Monilinia fructigena</i> , <i>Monilinia</i> spp.) MONIFG MONISP	50	75			
	Σήψεις από <i>Rhizopus stolonifer</i> και <i>Mucor</i> spp. MUCOSP RIZPST					
	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca pannosa</i>) SPHRPA					
	Σκωρίαση (<i>Tranzschelia pruni-spinosae</i> , <i>Tranzschelia discolor</i>) TRANPS TRANDI	37,5-50	50	50-100		3/14
Χρήση Ήσσοнос Σημασίας Φυστικιά* (PIAVE)	Καμαροσπόριο (<i>Botryosphaeria dothidea</i>) (BOTSDO) Σεπτορίωση (<i>Septoria pistaciae</i>) (SEPTPZ) Αλτερνάρια (<i>Alternaria alternata</i>) (ALTEAL)	40-50	20-75	50-150	Προληπτικός ψεκασμός έως το τέλος της άνθησης (έως BBCH 69)	1/--

Κρεμμύδι (ALLCE) Φρέσκα κρεμμύδια (ALLKU) Σκόρδο (ALLSA) Πράσο (ALLPO) Ασκαλώνια (ALLAS) Βολβίνα (σκορδόχορτ ο, <i>Allium fistulosum</i>) (ALLFI)	Σκωρίαση (<i>Puccinia allii</i>) PUCCAL Στεμφύλιο (<i>Stemphylium</i> sp.) STEMPSP	—	60-100	30-80	Εφαρμογές από το στάδιο της διόγκωσης της βάσης των φύλλων μέχρι την έναρξη αποχρωματισμού του υπέργειου μέρους. Σε έντονη προσβολή να χρησιμοποιείται η υψηλή δόση 100 κ.εκ./στρ.	1
* Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της δαμασκηνιάς και της φιστικιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.						

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Σταφύλια (Οινοποιήσιμες ποικιλίες), Μήλα, Αχλάδια	14
Ροδάκινα, Νεκταρίνια, Κεράσια, Δαμάσκηνα	3
Βερίκοκα	7
Κρεμμύδι, Φρέσκα κρεμμύδια, Σκόρδο, Ασκαλώνια, Βολβίνα (σκορδόχορτο, <i>Allium fistulosum</i>)	7
Πράσο	14
Φυστίκια	35

B Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 329/3966/24-04-2017 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60612 οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) LUNA EXPERIENCE SC (δ.ο. fluopyram και tebuconazole) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ

Ι. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ