



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 18.01.2019  
Αριθμ. πρωτ: 11457/152017 π.ε.

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Άννα Παπαμιχαήλ  
Τηλέφωνο: 210 92 87 237  
e-mail: [apapamichail@minagric.gr](mailto:apapamichail@minagric.gr)

Προς: Nisso Chemical Europe GmbH  
Γερμανία  
(διά του υπεύθυνου επικοινωνίας,  
Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ  
ΒΙ.ΠΕ.Θ., ΣΙΝΔΟΣ, Τ.Κ. 57022,  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της με αριθμό έγκρισης 60370 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CYFLAMID 5 EW (δ.ο. cyflufenamid 5% β/ο) ως προς την κατηγορία και τον τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης (Χρήσεις Ήσσοнос Σημασίας), τις δηλώσεις προφύλαξης καθώς και ως προς την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &amp; ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 και 37.4 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμό πρωτ. 222/2332/21.05.2013 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60370 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) CYFLAMID 5 EW (δ.ο. cyflufenamid 5% β/ο), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 171/2017 της Επιτροπής της 30ής Ιανουαρίου 2017 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών aminopyralid, azoxystrobin, cyantraniliprole, **cyflufenamid**, cyproconazole, diethofencarb, dithiocarbamates, fluazifop-P, fluopyram, haloxyfop, isofetamid, metalaxyl, prohexadione, proaquizafor, pyrimethanil, *Trichoderma atroviride* στέλεχος SC1 και zoxamide μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 1527/2017 της Επιτροπής της 6ης Σεπτεμβρίου 2017 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών **cyflufenamid**, fluopicolide, heptamaloxylglucan και malathion.
6. Τη με αριθμό πρωτ. 1606/16641/14.02.2017 (ΦΕΚ 629/Β/01.03.2017) Απόφαση Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

7. Την από τον Οκτώβρη 2018 αξιολόγηση της αρμόδιας αρχής της Γαλλίας του όμοιου σκευάσματος CYFLODIUM.
8. Την υπ' αριθμό πρωτ. 11457/152017/05-11-2018 αίτηση της εταιρείας Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε τη με αριθμό 60370 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) CYFLAMID 5 EW (δ.ο. cyflufenamid 5% β/ο), που χορηγήθηκε με τη με αριθμό πρωτ. 222/2332/21.05.2013 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την κατηγορία και τον τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης (Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας), τις δηλώσεις προφύλαξης καθώς και ως προς την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις.

**Συγκεκριμένα τα σημεία 4, 5, 11 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:**

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το CYFLAMID 5 EW είναι ένα μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση για την καταπολέμηση του ωιδίου (*Uncinula necator*) στα Αμπέλια, στις Μηλιές (*Podosphaera leucotricha*) και στα Πυρηνόκαρπα (*Sphaerotheca pannosa*).  
Λόγω του διαφορετικού τρόπου δράσης του παρουσιάζει μεγάλης διάρκειας αποτελεσματικότητα κατά του ωιδίου.

| 5 Φάσμα δράσης   |   |                             |                |                                  |   |   |
|--|---|-----------------------------|----------------|----------------------------------|---|---|
| Πεδίο Εφαρμογής  | Στόχοι  | Δόσεις σκευάσματος          |                |                                  | Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής   | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών /καλλ/κη περίοδο |
|  |   | κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού | κ.εκ./ στρέμμα | Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα |   |   |
| Αμπέλι (Οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια) (VITVI) | Ωΐδιο <i>Uncinula necator</i> (UNCINE)        | 40-50                       | 50             | 80 - 100                         | Προληπτική επέμβαση από την έναρξη της ανθοφορίας μέχρι την ανάπτυξη των ραγών. | 2/10-14 ημέρες                              |
| Μηλιά (MABSD)  | Ωΐδιο <i>Podosphaera leucotricha</i> (PODOLE) | 30-50                       | 50             | 90-150                           | Προληπτικές επεμβάσεις από τα πρώτα ξεδιπλωμένα φύλλα μέχρι πριν τη συγκομιδή.  | 2/7-10 ημέρες                               |

|  |   |       |    |        |   |            |
|--|---|-------|----|--------|---|------------|
| Ροδακινιά (PRNPS), Βερικοκιά (PRNAR)<br><br>Χρήσεις ήσσονος σημασίας (ΧΗΣ): Κεράσια (PRNAV), Δαμάσκηνα (PRNDO) | Ωΐδιο ( <i>Sphaerotheca pannosa</i> ή <i>Podosphaera pannosa</i> ) (SPHRPA) | 25-50 | 50 | 50-100 | Προληπτικές επεμβάσεις από το στάδιο των πλήρως αναπτυγμένων φύλλων μέχρι πριν τη συγκομιδή. (BBCH 19-87) | 2/7 ημέρες |
|--|---|-------|----|--------|---|------------|

**Παρατηρήσεις:**

- Η δόση και ο όγκος του ψεκαστικού διαλύματος θα πρέπει να είναι ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών και τη φυλλική επιφάνεια.
- Εφαρμόστε το CYFLAMID 5 EW όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μετά τις πρώτες ενδείξεις προσβολής από το ωΐδιο.
- Όπου η πίεση της ασθένειας παραμένει υψηλή ή υπάρχει επαναπροσβολή, μπορεί να επαναληφθεί ο ψεκασμός. Εφαρμόζεται 2 φορές με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-14 ημέρες εάν υπάρχει πίεση από την ασθένεια.
- Το προϊόν διαθέτει εκλεκτικότητα στα ωφέλιμα αρθρόποδα της οικογενείας Phytoseiidae.
- Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας Κερασιά και Δαμασκηλιά: δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν στην αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του.

**11**

Δηλώσεις προφύλαξης

**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.**P501:** Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Κατά την εφαρμογή και κατά την ανάμιξη/φόρτωση να φοράτε κατάλληλη στολή εργασίας και προστατευτικά γάντια.

Σε περίπτωση που οι εργάτες πρέπει να εισέλθουν στον αγρό σύντομα μετά την εφαρμογή θα πρέπει να φορούν μακρυμάνικο πουκάμισο, γάντια και μακρύ παντελόνι.

**SP1:** Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.**SPe 1:** Για να προστατέψετε τα υπόγεια νερά μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει τη δραστική ουσία cyflufenamid περισσότερο από μία φορά στα δύο χρόνια στα πυρηνόκαρπα.**EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**13** Προστασία των καταναλωτών

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

| Πεδίο εφαρμογής                                      | ΡΗΙ<br>(σε ημέρες) |
|--|--------------------|
| Αμπέλια  | 21                 |
| Μηλιές   | 14                 |
| <b>Ροδακινιά, Βερικοκιά,<br/>Κερασιά, Δαμασκηνιά</b> | <b>14</b>          |

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 222/2332/21.05.2013 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ**

**Ι. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ**