



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 06-03-2019  
Αριθ. πρωτ: 11786/158044 Π.Ε.**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
ΤΕΛΕΦΑΧ: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Μαρία Γάσπαρη  
Τηλέφωνο: 210 928 7250  
e-mail: [mgaspari@minagric.gr](mailto:mgaspari@minagric.gr)**

**Προς: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ  
Σωρού 18-20  
151 25 Μαρούσι  
e-mail: [ioannis.tsoutsanis@bayer.com](mailto:ioannis.tsoutsanis@bayer.com)**

**ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αριθ. 60382 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SERENADE MAX WP (δραστική ουσία *Bacillus subtilis-strain* QST 713) ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση ως προς τις ασθένειες στην συκιά- Χρήση Ήσσοнос Σημασίας και τον χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος).**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
3. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 (ΦΕΚ Β'/2587) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσοнос σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσοнос σημασίας»
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
6. Τη με αριθ. πρωτ. 10028/131884/1-10-2018 επιστολή της Litras Fresh
7. Τη με αριθ. πρωτ. 10028/131884/8-10-2018 επιστολή της Υπηρεσίας
8. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 11786/158044/15-11-2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
9. Το εισηγητικό σημείωμα της Υπηρεσίας

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Τροποποιούμε την με αριθ. **60382** οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνου) **SERENADE MAX WP (δραστική ουσία *Bacillus subtilis-strain QST 713*)** που χορηγήθηκε με την με αριθ. 2161/23744/12-9-2013 ΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης (**διεύρυνση ως προς τις ασθένειες στην συκιά- Χρήση Ήσσονος Σημασίας και τον χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος**)

Συγκεκριμένα, το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

<b>5</b>	5.1 Φάσμα δράσης
----------	------------------

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής (3)	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ./στρέμμα	γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Αμπέλι	Βοτρυτής ( <i>Botrytis cinerea</i> )	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις και αφού έχει ανθίσει το 80% των ανθέων μέχρι την αρχή της ωρίμανσης των καρπών (όταν οι καρποί αρχίζουν να αποκτούν το τυπικό χρώμα της ποικιλίας τους)  Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 14	5
Μηλιά Αχλαδιά <sup>(1)</sup>	Φουζικλάδιο ( <i>Venturia Spp.</i> )	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις, από την πράσινη κορυφή μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν μέγεθος 20 χιλιοστών (mm).  Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 7	8

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής (3)	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ./στρέμμα	γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
	Βακτηριακό κάψιμο μηλοειδών ( <i>Erwinia amylovora</i> )	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής (κατά τη διάρκεια της άνθισης) ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις .  Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 7	4
Φράουλα (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου)	Βοτρυτής ( <i>Botrytis cinerea</i> )	250-350	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις , από την έναρξη της άνθισης και μέχρι τη συγκομιδή. Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 7	4
Μαρούλι (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου)	Σκληρωτία ( <i>Sclerotinia spp.</i> )	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις , από το στάδιο των τεσσάρων πραγματικών φύλλων μέχρι και τον πλήρη σχηματισμό της κεφαλής του μαρουλιού.  Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 7	4

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής (3)	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ./στρέμμα	γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Νεκταρινιά <sup>(2)</sup>	Φαιά σήψη ( <i>Monilinia spp.</i> )	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις, από το στάδιο που ο καρπός έχει το μέγεθος καρυδιού μέχρι και τη συγκομιδή  Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 7	4
	Βακτηριακό κάψιμο  ( <i>Xanthomonas arboricola</i> )	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις, από την πτώση του κάλυκα (τέλος καρπόδεσης) μέχρι που καρποί αρχίζουν να αποκτούν το τελικό τους χρώμα.  Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 7	
Τομάτα (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου)	Βοτρύτης ( <i>Botrytis cinerea</i> )	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις, από το στάδιο της καρπόδεσης μέχρι και τη συγκομιδή. Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 7	4
	Βακτηριακή	250-			Εφαρμόστε με την εμφάνιση	

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής (3)	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ./στρέμμα	γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
	κηλίδωση ( <i>Pseudomonas syringae</i> )	400	---	50-100	της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις , από το στάδιο πριν την άνθιση μέχρι και τη συγκομιδή. Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 7	
Πιπεριά, Μελιτζάνα (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου)	Βοτρυτής ( <i>Botrytis cinerea</i> )	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις , από το στάδιο της καρπόδεσης μέχρι και τη συγκομιδή. Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 7	4
ΡΟΔΙΑ (μικρής σημασίας χρήση) <sup>4</sup>	ΒΟΤΡΥΤΗΣ ( <i>Botrytis spp.</i> <i>Botrytis cinerea</i> )	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε προληπτικά ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμογή από την έναρξη της καρπόδεσης μέχρι την πλήρη ωρίμανση των καρπών BBCH: 71-89  Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες.	4
ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ (μικρής σημασίας χρήση) <sup>4</sup>	ΒΟΤΡΥΤΗΣ ( <i>Botrytis spp.</i> )  ΒΑΚΤΗΡΙΟ ( <i>Pseudomonas syringae pv. Actinidiae</i> (PSA)	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε προληπτικά ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμογή από την έναρξη της καρπόδεσης μέχρι την πλήρη ωρίμανση των καρπών  BBCH: 71-89  Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες.	4
ΑΓΚΙΝΑΡΑ (μικρής σημασίας χρήση) <sup>4</sup>	ΒΟΤΡΥΤΗΣ ( <i>Botrytis spp.</i> )	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε προληπτικά ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμογή από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων μέχρι	4

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής (3)	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ./στρέμμα	γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
					την πλήρη ωρίμανση. BBCH: 71-89 Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες.	
ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙ ΧΛΩΡΟ  (μικρής σημασίας χρήση) <sup>4</sup>	ΒΟΤΡΥΤΗΣ ( <i>Botrytis spp.</i> )	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε προληπτικά ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμογή από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων μέχρι την πλήρη ωρίμανση. BBCH: 71-89 Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες.	4
ΦΑΣΟΛΙ ΞΕΡΟ  (μικρής σημασίας χρήση) <sup>4</sup>	ΒΑΚΤΗΡΙΟ ( <i>Xanthomonas spp.</i> <i>Pseudomonas spp.</i> <i>Pseudomonas syringae</i> )	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε προληπτικά ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμογή από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων μέχρι την πλήρη ωρίμανση. BBCH: 71-89 Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες.	4
ΜΠΑΜΙΑ  (μικρής σημασίας χρήση) <sup>4</sup>	ΒΟΤΡΥΤΗΣ ( <i>Botrytis spp.</i> )	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε προληπτικά ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμογή από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων μέχρι την πλήρη ωρίμανση. BBCH: 71-89 Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες.	4

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής (3)	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ./στρέμμα	γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
ΜΠΡΟΚΟΛΟ  (μικρής σημασίας χρήση) <sup>4</sup>	ΒΑΚΤΗΡΙΟ ( <i>Pseudomonas spp.</i> )	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε προληπτικά ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμογή από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων μέχρι την πλήρη ωρίμανση.  BBCH: 71-89  Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες.	4
ΣΤΕΒΙΑ  (μικρής σημασίας χρήση) <sup>4</sup>	ΒΟΤΡΥΤΗΣ ( <i>Botrytis spp.</i> )	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε προληπτικά ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμογή από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων μέχρι την πλήρη ωρίμανση.  BBCH: 71-89  Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες.	4
Μικρής σημασίας χρήση <sup>4</sup>  ΜΥΡΤΙΛΛΟ  ΣΜΕΟΥΡΟ	ΒΟΤΡΥΤΗΣ ( <i>Botrytis spp.</i> <i>Botrytis cinerea</i> )  ΜΟΝΙΛΙΑ ( <i>Monilinia vaccinii-corymbosi</i> )  ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε προληπτικά ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμογή από την έναρξη της καρπόδεσης μέχρι την πλήρη ωρίμανση των καρπών .  Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες.	4

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής (3)	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ./στρέμμα	γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
	<p>(<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i>)</p> <p>ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΛΑΙΜΟΥ</p> <p>(<i>Agrobacterium tumefaciens</i>)</p> <p>ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΚΟΣ</p> <p>(<i>Gordonia cassandrae</i>, <i>Fusicoccum putrefaciens</i>)</p>					
Μικρής σημασίας χρήση <sup>4</sup>	<p>ΒΟΤΡΥΤΗΣ (<i>Botrytis</i> spp.)</p> <p>ΕΝΔΟΣΗΨΗ ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑ (<i>Pseudomonas syringae</i>)</p> <p><b>Σκωρίαση (<i>Cerotelium fici</i>)</b></p>	250-400	---	50-100	<p>Εφαρμόστε προληπτικά ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμογή από την πτώση του κάλυκα (τέλος καρπόδεσης) μέχρι και τη συγκομιδή.</p> <p>Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες.</p>	4
ΣΥΚΙΑ						
Μικρής σημασίας χρήση <sup>4</sup>	<p>ΒΟΤΡΥΤΗΣ (<i>Botrytis</i> spp.)</p>	250-400	---	50-100	<p>Εφαρμόστε προληπτικά ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμογή από την έναρξη της καρπόδεσης μέχρι την πλήρη ωρίμανση των καρπών</p> <p>Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες.</p>	4
ΑΒΟΚΑΝΤΟ						



Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής (3)	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ./στρέμμα	γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Μικρής σημασίας χρήση <sup>4</sup>  ΚΟΛΟΚΥΘΙ  (αποκλειστικά για την ποικ. Melopero)	ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ  ( <i>Pseudomonas syringae</i> )	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε προληπτικά ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις, από το στάδιο πριν την άνθιση μέχρι και τη συγκομιδή. Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 7	4
Μικρής σημασίας χρήση <sup>4</sup>  ΣΠΑΝΑΚΙ  (Υ & Θ)	ΒΟΤΡΥΤΗΣ  ( <i>Botrytis spp.</i> )	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε προληπτικά ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμογή από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων μέχρι την πλήρη ανάπτυξη της φυλλικής μάζας.  Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες.	4
Μικρής σημασίας χρήση <sup>4</sup>  ΑΝΤΙΔΙ  ΣΤΑΜΝΑΓΚΑΘΙ  (Υ & Θ)	ΒΟΤΡΥΤΗΣ  ( <i>Botrytis spp.</i> )	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε προληπτικά ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμογή από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων μέχρι την πλήρη ανάπτυξη της φυλλικής μάζας.  Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες.	4

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής (3)	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ./στρέμμα	γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Μικρής σημασίας χρήση <sup>4</sup>  ΡΟΚΑ (Υ & Θ)	ΒΟΤΡΥΤΗΣ ( <i>Botrytis spp.</i> )  ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ ( <i>Pseudomonas syringae</i> )	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε προληπτικά ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμογή από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων μέχρι την πλήρη ανάπτυξη της φυλλικής μάζας.  Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες.	4
Μικρής σημασίας χρήση <sup>4</sup>  ΠΡΑΣΟ	ΒΟΤΡΥΤΗΣ ( <i>Botrytis spp.</i> )	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε προληπτικά ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμογή από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων μέχρι την πλήρη ωρίμανση.  Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες.	4
Μικρής σημασίας χρήση <sup>4</sup>  ΟΣΠΡΙΑ (Υ & Θ):  ΑΡΑΚΑΣ  ΦΑΚΗ  ΚΟΥΚΙΑ  ΡΕΒΙΘΙ	ΒΟΤΡΥΤΗΣ ( <i>Botrytis spp.</i> )  ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ ( <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>pisi</i> , <i>Pseudomonas pisi</i> )	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε προληπτικά ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμογή από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων μέχρι την πλήρη ωρίμανση.  Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες.	4

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής (3)	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ./στρέμμα	γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Μικρής σημασίας χρήση <sup>4</sup>  Καπνός	ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ  ( <i>Pseudomonas tabacina</i> , <i>Pseudomonas sp.</i> )	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε προληπτικά ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμογή από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων μέχρι την πλήρη ωρίμανση.  Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες.	4
Μικρής σημασίας χρήση <sup>4</sup>  ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ  Α.ΥΠΑΙΘΡΟΥ:  Ρίγανη, Σέλινο, Βασιλικός, Δυόσμος, Γιασεμί, Γλυκάνισος, Δάφνη, Δενδρολίβανο, Δίκταμο, Θυμάρι, Κάππαρη, Κορίανδρος, Κρόκος, Κύμινο, Λεβάντα, Μάραθος, Μαντζουράνα, Μελισσόχορτο, Μέντα, Μαϊντανός, Άνιθος, Μαστίχα Χίου, Αρώνια,	ΒΟΤΡΥΤΗΣ ( <i>Botrytis spp.</i> )  ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ  ( <i>Pseudomonas syringae</i> )	250-400	---	50-100	Εφαρμόστε προληπτικά ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμογή από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων μέχρι την πλήρη ανάπτυξη της φυλλικής μάζας/πλήρη ωρίμανση.  Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες.	4

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής (3)	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ./στρέμμα	γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
<p>Χαμομήλι, Φασκόμηλο, Ύσσωπος, Σάλβια, Τσάι βουνού, Τριανταφυλλιά (για αρωματοποίηση).</p> <p>Β. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ:</p> <p>Ρίγανη, Σέλινο, Βασιλικός, Δυόσμος, Γιασεμί, Γλυκάνισος, Δάφνη, Δενδρολίβανο, Δίκταμο, Θυμάρι, Κάππαρη, Κορίανδρος, Κρόκος, Κύμινο, Λεβάντα, Μάραθος, Μαντζουράνα, Μελισσόχορτο, Μέντα, Μαϊντανός, Άνιθος, Αρώνια, Χαμομήλι, Φασκόμηλο, Ύσσωπος, Σάλβια, Τσάι βουνού, Τριανταφυλλιά (για αρωματοποίηση).</p>						

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

- (1)Συνολικά το μέγιστο των εφαρμογών δεν είναι παραπάνω από οκτώ
- (2)Συνολικά το μέγιστο των εφαρμογών δεν είναι παραπάνω από τέσσερις
- (3)Επειδή το σκεύασμα μπορεί να αφήσει ένα λευκό επίχρισμα πάνω στο φυτό συνιστούμε να μη χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά το μέγιστο προτεινόμενο βλαστικό στάδιο.
- (4)Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις μικρής σημασίας χρήσεις από την εφαρμογή του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

**B**

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 2161/23744/12-9-2013 ΥΑ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ.  
Δ/ΝΣΗΣ**

**Δρ Ι.ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ**