



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 10-10-2019
Αριθ. πρωτ: 9996/242118**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΚΑΛΛΙΘΕΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Κ. Μητσοπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 165
e-mail: kmitsopoulou@minagric.gr**

**Προς: W. NEUDORFF GmbH KG, Γερμανίας
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας,
της εταιρείας ΝΙΤΡΟΦΑΡΜΑ.Ε.
Οικ. Τετρ. 20 Β 35-55, 57400, ΣΙΝΔΟΣ)
e-mail: info@nitrofarm.gr**

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 14707 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) TRIONA NEW EW (Paraffin oil [CAS 8042-47-5] 54,6% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις), τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή»

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο**

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον συμπεριλαμβάνεται η δραστική ουσία paraffin oil.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
7. Την με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 (ΦΕΚ Β'/2587) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».

8. Την με αριθ. 619/46787/8.3.19 (ΦΕΚ Β' 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ. Αραχωβίτη, του Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ολ. Τελιγιωρίδου με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής "με εντολή Υπουργού", "με εντολή Υφυπουργού" ή "με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού", κατά περίπτωση, στους: Γεν. Γραμματέα, Γεν. Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γεν. Δ/σης Προϊσταμένου Δ/σης και Προϊσταμένου Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων" (Β' 988), όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» (Β' 1241) και τροποποιήθηκε με την αριθ. 1679/153682/25-06-2019 (Β' 2701) ΚΥΑ.
9. Τη με αριθ. 5745/130075/16.07.2019 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 14707 άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) TRIONA NEW EW (Paraffin oil [CAS 8042-47-5] 54,6% β/ο).
10. Τη με αριθ. 7852/85220/01.07.2014 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 14483 άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) PROMANAL NEU (paraffin oil [CAS 8042-47-5] 54,6 % β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
11. Τη υπ' αριθμ. 9996/242118/26.09.2019 αίτηση της εταιρείας W. NEUDORFF GmbH KG δια της ΝΙΤΡΟΦΑΡΜΑ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α Τροποποιούμε την με αριθμό 14707 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) TRIONA NEW EW (Paraffin oil [CAS 8042-47-5] 54,6% β/ο), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 5745/130075/16.07.2019 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις), τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Συγκεκριμένα, τα σημεία **5, 11** και **13** διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο εφαρμογής	Στόχοι	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ.)	κ.εκ. / στρ		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Λεμονιά CIDLI, Μανταρινιά (Κλημεντίνες) CIDRE, Πορτοκαλιά CIDI	Κοκκοειδή Κόκκινη ψώρα και άλλες ψώρες (<i>Aonidiella aurantii</i> - AONDAU)	1000 – 2000	50 – 150	500 – 3000	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής και πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών (έως BBCH 69-81)	2 / > 60
Μηλιά MABSD	Τετράνυχτοι (<i>Panonychus ulmi</i> - METTUL)	1000	45 – 120	450 – 1200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής έως το δέσιμο	2/6 - 7

					των καρπών και μετά την συγκομιδή. (BBCH 54-71 και BBCH 99)	
Μηλιά MABSD, Αχλαδιά PYUCO	Αφίδες (<i>Aphis pomi</i> - APHIPO, <i>Dysaphis plantaginea</i> - DYSAPL)	1000	45 – 120	450 – 1200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής από την πράσινη κορυφή και μετά την συγκομιδή. (BBCH 56-71 και BBCH 99)	
Μηλιά MABSD, Αχλαδιά PYUCO	Ψύλλα (<i>Cacopsylla pyri</i> - PSYLPI)	1000	45 – 120	450 – 1200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής από την αρχή της βλάστησης έως μικρούς καρπούς (BBCH 1-75)	
Βερικοκιά PRNAR Κερασιά PRNAV Ροδακινιά PRNPS Δαμασκηνιά PRNDO	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> - MYZUPE, <i>Myzus cerasi</i> - MYZUCE, <i>Hyalopterus sp.</i> - HYALSP)	1000	45 – 120	450 – 1200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής από την ροζ κορυφή και μετά την συγκομιδή. (BBCH 57-69 και BBCH 99)	2/7
Ελιά OLVEU	Κοκκοειδή Λεκάνιο και άλλες ψώρες (<i>Saissetia oleae</i> -SAISOL)	2000	30 – 75	600 – 1500	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής από την πτώση των πετάλων έως μικρούς καρπούς. (BBCH 67-77)	1
Τομάτα LYPES, Μελιτζάνα SOLME, Πιπεριά CPSAN, Αγγούρι CUMSA, Κολοκύθι CUUPG, Πεπόνι CUMME,	Αλευρώδεις (<i>Bemisia tabaci</i> - BEMITA, <i>Trialeurodes vaporariorum</i> - TRIAVA) Θρίπες (<i>Frankliniella occidentalis</i> - FRANOC)	1000	30 – 120	300 – 1200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	α) 2/7 β) 2/>60 (8)

Καρπούζι CITLA (θερμοκηπίου)						
Κουνουπίδι BRSOX, Μπρόκολο BRSOK (υπαίθρου)	Αλευρώδεις (<i>Aleyrodes proletella</i> - ALEUPR)	1000	30 – 100	300 – 1000	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	2 / >60
Αμυγδαλιά* PRNDU <u>χρήση ήσσονος σημασίας</u>	Κοκκοειδή Ψώρα Σαν Ζοζέ <i>Quadraspidio- tus perniciosus</i> (QUADPE) Βαμβακάδα ή Διάσπις <i>Pseudalaca- spis pentagona</i> (PSEAPE) <i>Planococcus/ Pseudococcus sp.</i> (PSECSP) Μυτιλόμορφη ψώρα <i>Lepidosaphes ulmi</i> (LEPSUL) Κόκκινη ψώρα <i>Aonidiella aurantii</i> (AONDAU) Κ.α. ψώρες <i>Sphaeroleca- nium Prunastri</i> (LECAPN) <i>Eulecanium persicae</i> (LECAPE) <i>Melanaspis inopinata</i> (MELAIN) Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus</i>	1000	45-120	450 – 1200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής από την ροζ κορυφή και μετά την συγκομιδή. (BBCH 57-69 και BBCH 99)	2/7

	<i>urticae</i> (TETRUR)					
Αμπέλι VITVI	<u>χρήσεις</u> <u>ήσσανος</u> <u>σημασίας</u> Ψευδόκοκκος ή Βαμβακάδα <i>Planococcus</i> <i>citri*</i> (PSECCI) <i>Planococcus</i> <i>ficus*</i> (PLANFI) Κ.α. Ψώρες <i>Parthenoleca-</i> <i>nium corni*</i> (LECACO) <i>Pulvinaria</i> <i>vitis*</i> (PULVVI) Ερίνωση <i>Eriophyes</i> <i>vitis*</i> (ERPHVI) Μετκάλφα <i>Metcalfa</i> <i>pruinosa*</i> - (METFPR) Θρίπες <i>Frankliniella</i> <i>occidentalis*</i> - (FRANOC) Δροσόφιλα <i>Drosophila</i> <i>suzukii*</i> - (DROSSU)	1000	45-120	450 – 1200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής από την αρχή της βλάστησης έως το δέσιμο των καρπών και μετά την συγκομιδή. (BBCH 01-71 και BBCH 99)	2/7
Ακτινιδιά* ATIDE	<u>χρήση ήσσανος</u> <u>σημασίας</u> Κίτρινος Τετράνυχος <i>Tetranychus</i> <i>urticae</i> (TETRUR) Ψώρα Σαν Ζοζέ <i>Quadraspidiot</i> <i>us perniciosus</i> (QUADPE)	1000	45-120	450 – 1200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής από την αρχή της βλάστησης έως το δέσιμο των καρπών και μετά την συγκομιδή. (BBCH 01-71 και BBCH 99)	2/7

	<p>Βαμβακάδα ή Διάσπις <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (PSEAPE)</p> <p>Μετκάλφα <i>Metcalfa pruinosa</i> (METFPR)</p> <p>Βαμβακάδα <i>Eurhyllura sp.</i> (EURHSP)</p>					
<p>Ροδιά * PUNGR</p> <p><u>χρήση ήσσονος σημασίας</u></p>	<p>Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR)</p> <p>Ακάρεα <i>Eriophyes grannati</i> (ACEIGA)</p> <p>Αλευρώδεις <i>Trialeurodes vaporariorum</i> (TRIAVA) <i>Bemisia tabaci</i> (BEMITA)</p> <p>Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO) <i>A. fabae</i> – (APHIFA) <i>Macrosiphum euphorbiae</i> – (MACSEU) <i>Myzus persicae</i> – (MYZUPE)</p> <p>Θρίπες <i>Thrips sp.</i> (THRISP)</p>	1000	45-120	450 – 1200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής από την αρχή της βλάστησης έως το δέσιμο των καρπών και μετά την συγκομιδή. (BBCH 01-71 και BBCH 99)	2/7
<p>Συκιά* FIUCA</p> <p><u>χρήση ήσσονος σημασίας</u></p>	<p>Κίτρινος Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR) Κηροπλάστης</p>	1000	45-120	450 – 1200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής από την αρχή της βλάστησης έως το δέσιμο	2/7

	<p><i>Ceroplastes rusci</i> (CERPRU) Λογχαία ή μαύρη μύγα των σύκων <i>Carpolonchaea aristella</i> (CAROAR)</p> <p>Ψύλλα <i>Homotoma ficus</i> (HOMTFI)</p>				<p>των καρπών και μετά την συγκομιδή. (BBCH 01-71 και BBCH 99)</p>	
--	---	--	--	--	--	--

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

1. Ο όγκος ψ.υ. εξαρτάται από το ύψος του φυτού.
2. Στα Εσπεριδοειδή χρησιμοποιήστε τη μικρή δόση στην πρώτη εφαρμογή και τη μεγάλη στην δεύτερη, για την προστασία των καρπών.
3. Κατά τη χρήση του σκευάσματος, τα δένδρα πρέπει να είναι ποτισμένα. Ποτίζουμε μία εβδομάδα πριν από τον ψεκασμό.
4. Αποφύγετε τον ψεκασμό όταν τα φυτά είναι στρεσαρισμένα, σε περιόδους έντονης ξηρασίας, υπερβολικής υγρασίας και όταν υπάρχει παγετός.
5. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32°C γιατί μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα φυτοτοξικότητας.
6. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα 40 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή θείου ή θειασβεστίου.
7. Να μην προηγείται ή έπεται εφαρμογή σκευάσματος με δ.ο. captan, folpet ή dithianon σε διάστημα τουλάχιστον 1 εβδομάδας.
8. Στα θερμοκήπια να μην πραγματοποιείται δεύτερη εφαρμογή με μεσοδιάστημα μικρότερο των 60 ημερών όταν γίνεται χρήση σκευασμάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς.
9. Στις υπαίθριες καλλιέργειες κουνουπίδι, μπρόκολο το μεσοδιάστημα αφορά την περίοδο διαδοχικών/κλιμακτών φυτεύσεων στον ίδιο αγρό.

***Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες αμυγδαλιά, αμπέλι, ακτινιδιά, ροδιά και συκιά από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.**

11 Δηλώσεις Προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφυλάξης.
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Sp1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.
Spre3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:

- 10 μέτρων σε Εσπεριδοειδή
- 10 μέτρων σε ελιά
- 20 μέτρων σε Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, **αμυγδαλιά, αμπέλι, ακτινίδιο, συκιά, ροδιά** - πρώιμες εφαρμογές

- 10 μέτρων σε Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, **αμυγδαλιά, αμπέλι, ακτινίδιο, συκιά, ροδιά** - όψιμες εφαρμογές

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Λεμονιά, Μανταρινιά (Κλημεντίνες), Πορτοκαλιά	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος
Μηλιά, Αχλαδιά	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος
Ροδακινιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Βερικοκιά	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος
Ελιά	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος
Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά Αγγούρι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι (θερμοκηπίου)	Δεν ορίζεται
Κουνουπίδι, Μπρόκολο (υπαίθρου)	Δεν ορίζεται
Αμυγδαλιά, Αμπέλι, Ακτινιδιά, Ροδιά, Συκιά	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος

B Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 5745/130075/16.07.2019 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Ι. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ