



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 6/03/2019  
Αριθμ. πρωτ: 1502/25103

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Δ. Καραμάνου  
Τηλέφωνο: 210 928 7228  
e-mail: [dkaramanou@minagric.gr](mailto:dkaramanou@minagric.gr)

Προς: SYNGENTA Hellas AEBE  
Λ. Ανθούσας,  
15349-Ανθούσα Αττικής  
e-mail: [Georgia.Diakou@syngenta.com](mailto:Georgia.Diakou@syngenta.com)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της αριθ. 14686 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) DIVEPRON 25 WG (δ.ο. fenoxycarb 25% β/β) ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε χρήση ήσσονος σημασίας), τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις»

#### ΑΠΟΦΑΣΗ

#### Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον συμπεριλαμβάνεται η δραστική ουσία fenoxycarb.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
7. Την με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 (ΦΕΚ Β'/2587) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας»

8. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
9. Τη με αριθμό 4932/67546/10.05.2018 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος INSEGAR 25 WG.
10. Τη με αριθμό 12509/166939/06.02.2019 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος DIVEPRON 25 WG.
11. Την με αριθμό ΕΜΠ455/28.04.2017 αξιολόγηση της αρμόδιας αρχής της για τη διεύρυνση του φάσματος σε χρήση ήσσονος σημασίας, του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος INSEGAR 25 WG.
12. Την με αριθ. πρωτ. 1502/25103/07.02.2019 αίτηση της εταιρείας SYNGENTA Hellas ABEE.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. 14686 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) DIVEPRON 25 WG (δ.ο. fenoxycarb 25% β/β), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 12509/166939/06.02.2019 απόφασή μας, ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε χρήση ήσσονος σημασίας), τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις.

Τα σημεία **5**, **11** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης:						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ. / στρέμματα (max)	γρ / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρέμμα)		
Μηλοειδή: Μηλιά (MABSD), Αχλαδιά (PYUCO), Κυδωνιά (CYDOB), Μουσουλιά (ΕΙΟJA)	Καρπόκαψα ( <i>Cydia pomonella</i> , CARPPO)	90	60	20-150	Ψεκασμός φυλλώματος.  Από το στάδιο σχηματισμού του καρπού έως το στάδιο της προχωρημένης ωρίμανσης-χρωματισμού των καρπών. (BBCH 71-85)	2 εφαρμογές με 12 ημέρες μεσοδιάστημα
	Φυλλορύκτες ( <i>Phyllonorycter corylifoliella</i> PRYCCO, <i>Phyllonorycter blancardella</i> LITHBL, <i>Cemiosstoma scitella</i> LEUCSC, <i>Lyonetia</i> sp. LYONSP)	75	50	20-150		
	Ψύλλα αχλαδιάς ( <i>Psylla pyri</i> , PSYLP1)	90	60	20-150		
	Κοκκοειδή ( <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> , QUADPE)					
Ροδακινιά (PRNPS)	Βλαστορύκτης της ροδακινιάς ( <i>Grapholitha molesta</i> , LASPMO)	90	60	20-150	Ψεκασμός φυλλώματος.  Από το στάδιο σχηματισμού	2 εφαρμογές με 12-14 ημέρες μεσοδιάστημα

	Κοκκοειδή ( <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> , PSEAPE)				του καρπού έως το στάδιο της προχωρημένης ωρίμανσης-χρωματισμού των καρπών. (BBCH 71-85)	
Δαμασκηλιά (PRNDO)	Καρπόκαψα δαμασκηλιάς ( <i>Laspeyresia funebrana</i> , LASPFU)	90	60	20-150	Ψεκασμός φυλλώματος.  Από το στάδιο σχηματισμού του καρπού έως το στάδιο της προχωρημένης ωρίμανσης-χρωματισμού των καρπών. (BBCH 71-85)	2 εφαρμογές με 10 ημέρες μεσοδιάστημα
Αμπέλι (VITVI)	Ευδεμίδα ( <i>Polychrosis botrana</i> , POLYBO)  Κογχυλίδα ( <i>Clysia ambiguella</i> , CLYSAM)  Κοκκοειδή ( <i>Planococcus citri</i> , PSECCI)	60	40	20-150	Ψεκασμός φυλλώματος.  Από το στάδιο της καρπόδεσης έως το στάδιο πριν τη συγκομιδή όπου οι ράγες αρχίζουν να μαλακώνουν. (BBCH 71-85)	2 εφαρμογές με 12-14 ημέρες μεσοδιάστημα
Ελιά (OLVEU)	Λεκάνιο ( <i>Saissetia oleae</i> , SAISOL)	60	40	150	Ψεκασμός φυλλώματος.  Από το στάδιο όπου ο καρπός έχει αποκτήσει το 10% του τελικού του μεγέθους έως το στάδιο όπου έχει αποκτήσει το 90% του τελικού του μεγέθους- το κατάλληλο στάδιο για συλλογή πράσινου καρπού. (BBCH 71-79)	2 εφαρμογές με 10 ημέρες μεσοδιάστημα

Καρυδιά (IUGRE)	Καρπόκαψα ( <i>Cydia pomonella</i> , CARPRO)	32	27	100-120	Ψεκασμός φυλλώματος.  Από το στάδιο όπου ο καρπός έχει αποκτήσει το 10% του τελικού του μεγέθους έως το στάδιο της προχωρημένης ωρίμανσης/ χρωματισμού του καρπού. (BBCH 71-85)	2 εφαρμογές με 12 ημέρες μεσοδιάστημα
Φιστικιά * (PIAVE)  <u>(χρήση ήσσονος σημασίας)</u>	Ψύλλα ( <i>Agonoscena targionii</i> , AGONTA)	90	60	20-150	Ψεκασμός καλύψεως.  Από την εμφάνιση των πρώτων προσβολών έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (Εως BBCH 85)	1

**Παρατηρήσεις:**

1. Για τη μέγιστη αποτελεσματικότητα του σκευάσματος, η χρήση του να πραγματοποιείται στα κοκκοειδή όταν τα 2/3 του πληθυσμού είναι σε κινητά στάδια και στα λεπιδόπτερα με την έναρξη των εναποθέσεων των αυγών και στις προνύμφες του τελευταίου σταδίου.
2. Ο μικρός όγκος ψεκαστικού να εφαρμόζεται στα νεαρά δένδρα.

\* Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στη καλλιέργεια της φιστικιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στην καλλιέργεια αυτή ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

**11**ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Φοράτε προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα, στις καλλιέργειες μηλοειδών, πυρηνοκάρπων, ελιάς και φιστικιάς που εφαρμόστηκε το σκεύασμα.

SPe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη-στόχους αφήστε μία απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τις γειτονικές καλλιέργειες στους οπωρώνες.

**13 Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

<b>Φυτικά προϊόντα</b>	<b>Ημέρες</b>
Ελιά	60
Αμπέλι, Δαμασκηλιά, Καρυδιά	21
Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μηλιά, Μουσμουλιά, Ροδακινιά	14
<b>Φιστικιά</b>	<b>30</b>

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 12509/166939/06.02.2019 απόφασή μας.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

**I. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ**