



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 06 -03-2019  
Αριθ. πρωτ: 1268/20961**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΚΑΛΛΙΘΕΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Δ. Καραμάνου  
Τηλέφωνο: 210 92 87 228  
e-mail: [dkaramanou@minagric.gr](mailto:dkaramanou@minagric.gr)**

**Προς: W. NEUDORFF GmbH KG  
(δια του υπευθύνου επικοινωνίας,  
της εταιρίας  
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.  
– «AGRIBIZ»  
Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα)  
e-mail: [a.toutoutzidakis@agribiz.gr](mailto:a.toutoutzidakis@agribiz.gr)**

**ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 14684 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) PULP (δ.ο. paraffin oil, CAS 8042-47-5) ως προς το φάσμα δράσης και τη τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή για χρήσεις ήσσονος σημασίας»**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Ο**

**ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον συμπεριλαμβάνεται η δραστική ουσία paraffin oil.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

7. Την με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 (ΦΕΚ Β'/2587) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
8. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
9. Τη με αριθ. 11760/157754/06.02.2019 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 14684 άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) PULP (δ.ο. paraffin oil/CAS 8042-47-5).
10. Τη με αριθ. 7852/85220/01.07.2014 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 14483 άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) PROMANAL NEU (δ.ο. paraffin oil/CAS 8042-47-5).
11. Τη με αριθ. 10471/101551/27.11.2017 τροποποίησης της οριστικής άδειας για χρήσεις ήσσονος σημασίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) PROMANAL NEU (δ.ο. paraffin oil/CAS 8042-47-5).
12. Τη υπ' αριθμ. 1268/20961/01.02.2019 αίτηση της εταιρείας W. NEUDORFF GmbH KG δια της 'Τουτουζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.'.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε την με αριθμό έγκρισης 14684 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **PULP** (δ.ο. Paraffin oil, CAS 8042-47-5) η οποία χορηγήθηκε με την με αρ. πρωτ. 11760/157754/06.02.2019 απόφασή μας, ως το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε χρήση ήσσονος σημασίας) και την τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή.

Τα σημεία **5**, **11** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο εφαρμογής	Στόχοι	Δόσεις			Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
		κ.εκ. σκευάσματος /100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/ στρ.)	κ.εκ. σκευάματος / στρ		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Λεμονιά CIDLI, Μανταρινιά (Κλημεντίνες) CIDRE, Πορτοκαλιά CIDSΙ	Κοκκοειδή Κόκκινη ψώρα και άλλες ψώρες ( <i>Aonidiella aurantii</i> - ΑΟΝΔΑΥ)	1000 -2000	50-150	500-3000	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής και πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών. (έως BBCH 69-81)	2 / > 60

<p>Αμυγδαλιά* PRNDU</p> <p><u>(χρήση ήσσονος σημασίας)</u></p>	<p>Κοκκοειδή Ψώρα Σαν Ζοζέ (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>-QUADPE)</p> <p>Βαμβακάδα ή Διάσπικ (<i>Pseudalacaspis pentagona</i>-PSEAPE) (<i>Planococcus / Pseudococcus</i> sp-PSECSP)</p> <p>Μυτιλόμορφη ψώρα (<i>Lepidosaphes ulmi</i>-LEPSUL)</p> <p>Κόκκινη ψώρα (<i>Aonidiella aurantii</i> - AONDAU)</p> <p>Κ.α. ψώρες (<i>Sphaerolecanium prunastri</i>-LECAPN) (<i>Eulecanium persicae</i>-LECAPE) (<i>Melanaspis inopinata</i>-MELAIN)</p> <p>Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>-TETRUR)</p>	1000	45-120	450 – 1200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής από την ροζ κορυφή και μετά την συγκομιδή. (BBCH 57-69 και BBCH 99)	2/7
Μηλιά MABSD	Τετράνυχος ( <i>Panonychus ulmi</i> -METTUL)	1000	45-120	450 – 1200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής έως το δέσιμο των καρπών και μετά την συγκομιδή. (BBCH 54-71 και BBCH 99)	2/6 - 7
Μηλιά MABSD, Αχλαδιά	Αφίδες ( <i>Aphis pomi</i> - APHIPO,	1000	45-120	450 – 1200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της	

ΡΥΥΟ	<i>Dysaphis plantaginea</i> - DYSAPL)				προσβολής από την πράσινη κορυφή και μετά την συγκομιδή. (BBCH 56-71 και BBCH 99)	
Μηλιά MABSD, Αχλαδιά ΡΥΥΟ	Ψύλλα ( <i>Cacopsylla pyri</i> - PSYLPI)	1000	45-120	450 – 1200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής από την αρχή της βλάστησης έως μικρούς καρπούς (BBCH 1-75)	
Βερικοκιά PRNAR Κερασιά PRNAV Ροδακινιά PRNPS Δαμασκηνιά PRNDO	Αφίδες ( <i>Myzus persicae</i> - MYZUPE, <i>Myzus cerasi</i> - MYZUCE, <i>Hyalopterus sp.</i> - HYALSP)	1000	45-120	450 – 1200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής από την ροζ κορυφή και μετά την συγκομιδή. (BBCH 57-69 και BBCH 99)	2/7
Ελιά OLVEU	Κοκκοειδή Λεκάνιο και άλλες ψώρες ( <i>Saissetia oleae</i> - SAISOL)	2000	30-75	600-1500	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής από την πτώση των πετάλων έως μικρούς καρπούς. (BBCH 67-77)	1
Αμπέλι VITVI	Ψευδόκοκκος ή Βαμβακάδα * ( <i>Planococcus citri</i> , PSECCI <i>Planococcus ficus</i> , PLANFI)  Κ.α. Ψώρες* ( <i>Parthenolecanium corni</i> – LECACO) ( <i>Pulvinaria vitis</i> - PULVVI)  Ερίνωση *	1000	45-120	450 – 1200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής από την αρχή της βλάστησης έως το δέσιμο των καρπών και μετά την συγκομιδή. (BBCH 01-71 και BBCH 99)	2/7

	<p><i>(Eriophyes vitis-ERPHVI)</i></p> <p>Μετκάλφα* <i>(Metcalfa pruinosa-METFPR)</i></p> <p>Θρίπες* <i>(Frankliniella occidentalis-FRANOC)</i></p> <p>Δροσόφιλα* <i>Drosophila suzukii – DROSSU)</i></p>					
<p>Ακτινιδιά* ATIDE</p> <p><u>(χρήση ήσσονος σημασίας)</u></p>	<p>Κίτρινος Τετράνυχος <i>(Tetranychus urticae-TETRUR)</i></p> <p>Ψώρα Σαν Ζοζέ <i>(Quadraspidiotus perniciosus-QUADPE)</i></p> <p>Βαμβακάδα ή Διάσπις <i>(Pseudaulacaspis pentagona-PSEAPE)</i></p> <p>Μετκάλφα <i>(Metcalfa pruinosa-METFPR)</i></p> <p>Βαμβακάδα <i>(Eurphyllura sp.-EURHSP)</i></p>	1000	45-120	450 – 1200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής από την αρχή της βλάστησης έως το δέσιμο των καρπών και μετά την συγκομιδή. (BBCH 01-71 και BBCH 99)	2/7
<p>Ροδιά * PUNGR</p> <p><u>(χρήση ήσσονος σημασίας)</u></p>	<p>Τετράνυχος <i>(Tetranychus urticae TETRUR)</i></p> <p>Ακάρεια <i>(Eriophyes grannati ACEIGA)</i></p> <p>Αλευρώδεις <i>(Trialeurodes</i></p>	1000	45-120	450 – 1200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής από την αρχή της βλάστησης έως το δέσιμο των καρπών και μετά την συγκομιδή. (BBCH 01-71	2/7

	<p><i>varorarium-</i> TRIAVA <i>Bemisia tabaci</i> – BEMITA)</p> <p>Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> – APHIGO <i>A. fabae</i> - APHIFA, <i>Macrosiphum</i> <i>euphorbiae</i> - MACSEU, <i>Myzus persicae</i>- MYZUPE)</p> <p>Θρίπες (<i>Thrips sp</i> - THRISP)</p>				και BBCH 99)	
<p>Συκιά* FIUCA</p> <p><u>(χρήση</u> <u>ήσσονος</u> <u>σημασίας)</u></p>	<p>Κίτρινος Τετράνυχος (<i>Tetranychus</i> <i>urticae</i> TETRUR) Κηροπλάστης (<i>Ceroplastes rusci</i> CERPRU) Λογχαία ή μαύρη μύγα των σύκων (<i>Carpolonchaea</i> <i>aristella-</i> CAROAR)</p> <p>Ψύλλα (<i>Homotoma ficus</i> -HOMTFI)</p>	1000	45-120	450 – 1200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής από την αρχή της βλάστησης έως το δέσιμο των καρπών και μετά την συγκομιδή. (BBCH 01-71 και BBCH 99)	2/7
<p>Τομάτα LYPES, Μελιτζάνα SOLME, Πιπεριά CPSAN, Αγγούρι CUMSA, Κολοκύθι CUUPG, Πεπόνι CUMME, Καρπούζι CITLA (θερμοκηπίου)</p>	<p>Αλευρώδεις (<i>Bemisia tabaci</i> - BEMITA, <i>Trialeurodes</i> <i>varorarium</i> - TRIAVA)</p> <p>Θρίπες (<i>Frankliniella</i> <i>occidentalis</i> - FRANOC)</p>	1000	30-120	300-1200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	α) 2/7 β) 2/>60 (8)
Κουνουπίδι	Αλευρώδεις	1000	30-100	300 – 1000	Εφαρμογές με	2 / >60

BRSOX, Μπρόκολο BRSOK (υπαίθρου)	( <i>Aleyrodes proletella</i> - ALEUPR)				την εμφάνιση της προσβολής,	
---	--	--	--	--	-----------------------------------	--

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :**

1. Ο όγκος ψ.υ. εξαρτάται από το ύψος του φυτού.
2. Στα Εσπεριδοειδή χρησιμοποιήστε τη μικρή δόση στην πρώτη εφαρμογή και τη μεγάλη στην δεύτερη, για την προστασία των καρπών.
3. Κατά τη χρήση του PULP, τα δένδρα πρέπει να είναι ποτισμένα. Ποτίζουμε μία εβδομάδα πριν από τον ψεκάσμο.
4. Αποφύγετε τον ψεκάσμο όταν τα φυτά είναι μισομαραμένα, σε περιόδους έντονης ξηρασίας, υπερβολικής υγρασίας και όταν υπάρχει παγετός.
5. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32 °C γιατί μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα φυτοτοξικότητας.
6. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα 40 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή θείου ή θειασβεστίου.
7. Να μην προηγείται ή έπεται εφαρμογή σκευάσματος με δ.ο. captan, folpet ή dithianon σε διάστημα τουλάχιστον 1 εβδομάδας.
8. Στα θερμοκήπια να μην πραγματοποιείται δεύτερη εφαρμογή με μεσοδιάστημα μικρότερο των 60 ημερών όταν γίνεται χρήση σκευασμάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς.
9. Στις υπαίθριες καλλιέργειες κουνουπίδι, μπρόκολο το μεσοδιάστημα αφορά την περίοδο διαδοχικών/κλιμακωτών φυτεύσεων στον ίδιο αγρό.

\* Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες αμυγδαλιά, αμπέλι, ακτινιδιά, ροδιά και συκιά από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

**11**

Δηλώσεις  
προφύλαξης

**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P202:** Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφυλάξης.

**P501:** Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τοπικούς κανονισμούς

**Sp1:** Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

**Spe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μian αφέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:

- 10 μέτρων σε Εσπεριδοειδή

- 10 μέτρων σε Ελιά

- 20 μέτρων σε Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, **αμυγδαλιά, αμπέλι, ακτινίδιο, συκιά, ροδιά** - πρώιμες εφαρμογές

- 10 μέτρων σε Μηλοειδή και Πυρηνόκαρπα, **αμυγδαλιά, αμπέλι, ακτινίδιο, συκιά, ροδιά** - όψιμες εφαρμογές

**EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**13 Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Λεμονιά, Μανταρινιά (Κλημεντίνες), Πορτοκαλιά	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος
Μηλιά, Αχλαδιά	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος
Ροδακινιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Βερικοκιά	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος
<b>Αμυγδαλιά</b>	<b>Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος</b>
Ελιά	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος
<b>Αμπέλι</b>	<b>Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος</b>
<b>Ακτινιδιά</b>	<b>Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος</b>
<b>Ροδιά</b>	<b>Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος</b>
<b>Συκιά</b>	<b>Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος</b>
Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά Αγγούρι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι (θερμοκηπίου)	Δεν ορίζεται
Κουνουπίδι, Μπρόκολο (υπαίθρου)	Δεν ορίζεται

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 11760/157754/06.02.2019 απόφασή μας.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

**I. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ**