



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 22 - 05 - 2019
Αριθ. πρωτ: 5261/116269**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Π. Θεοδωρής
Τηλέφωνο: 210 928 7225 – 7214
e-mail: ptheodoris@minagric.gr**

**Προς: INDUSTRIAS AFRASA S.A.
Ισπανίας
(δια της εταιρείας: Τουτουτζιδάκης
Αντώνιος και ΣΙΑ ΕΕ, "AGRIBIZ",
Ξενίας 1, 115 27-Αθήνα)**

ΘΕΜΑ: « Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) GALAXIA MAX (Glyphosate 18% + MCPA 18%) »

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 33 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης}-6-11 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον Κανονισμό με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1907/2006.
7. Την υπ' αριθ. πρωτ. 619/46787 (ΦΕΚ 988/Β'/22-03-2019) Απόφαση με θέμα " Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού», «με εντολή Υφυπουργού» ή «με εντολή

Υπουργού και Υφυπουργού», κατά περίπτωση, στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων."

8. Την από 25.10.2018 αξιολόγηση (Registration Report) της Ελλάδας ως Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης.
9. Την υπ' αριθ. πρωτ. 6452 / 62836 / 09.06.2017 αίτηση καθώς και τα υπ' αριθ. πρωτ. 13314 / 129728 / 04.12.201, 3186 / 45352 / 23.03.2018, 10298 / 135821/ 08.10.2018, 10381 / 136901 / 10.10.2018, 1966/32666/18.02.2019 και 3681/73853/09.04.2019 συμπληρωματικά στοιχεία της εταιρείας INDUSTRIAS AFRASA S.A., Ισπανίας δια της εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. – «AGRIBIZ».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A. Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

70334

22/05/2019

31/10/2020

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

GALAXIA MAX

1.2.β Μορφή:

Πυκνό διάλυμα (SL)

1.3 Δραστικές ουσίες

Δραστική ουσία 1	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Glyphosate
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	95 % β/β
Χημική ομάδα	φωσφονογλυκινών
Παρασκευαστής	Industrias Afrasa, S.A. Ciudad de Sevilla, 53 46988 - Pol. Ind. Fuente del Jarro – PATERNA (VALENCIA) Ισπανία
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Hangzhou March Chemicals Laboratory 7-B Ziyun Building Xizi Garden, 598 North Zhong Shan Road, Hangzhou, Κίνα
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Glyphosate-Afrasa , όπως προσδιορίζεται στο Annex II - Doc JII της αίτησης (Αρ. Πρωτ. 126872/06-03-2009) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

Δραστική ουσία 2

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	MCPA
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	98 % β/β
Χημική ομάδα	φαινοξυαλκανοϊκών
Παρασκευαστής	CIECH Sarzyna S.A.

	ul. Chemikow 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Πολωνία
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	CIECH Sarzyna S.A. ul. Chemikow 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Πολωνία
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Έχουν υποβληθεί με την αρ. πρ. 101581/24.10.11 αίτηση της εταιρείας CIECH Sarzyna S.A. και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

INDUSTRIAS AFRASA S.A.
Ciudad de Sevilla, 53 –
46988 Pol. Ind. Fuente del Jarro PATERNA
(VALENCIA) ΙΣΠΑΝΙΑ
Mrs. Silvia Rodrigo
e-mail: srodrigo@afrasa.es
Τηλ.: +34 96 132 17 00
Fax: +34 96 132 17 16

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας

**Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. –
“Agribiz”**
Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα
Τηλ.: 210 7471000
Fax: 2107471009
E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ
Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου, ΤΘ 1026
Τ.Κ. 570 22
Τηλ.: 2310 569630 -33
Fax: 2310 797047
E-mail: registration@farmachem.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

INDUSTRIAS AFRASA S.A.
Ciudad de Sevilla, 53 –
46988 Pol. Ind. Fuente del Jarro PATERNA
(VALENCIA) ΙΣΠΑΝΙΑ

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

INDUSTRIAS AFRASA S.A.
Ciudad de Sevilla, 53 –
46988 Pol. Ind. Fuente del Jarro PATERNA
(VALENCIA) ΙΣΠΑΝΙΑ

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

INDUSTRIAS AFRASA S.A.
Ciudad de Sevilla, 53 –
46988 Pol. Ind. Fuente del Jarro PATERNA
(VALENCIA) ΙΣΠΑΝΙΑ

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες
Glyphosate 18% (24,29% β/ο υπό μορφή
άλατος ισοπροπυλαμίνης) +
MCPA 18% (23,3% β/ο υπό μορφής άλατος
ισοπροπυλαμίνης)

Βοηθητικές ουσίες: **56,4 %** (β/β)

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στο Part C και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας αρχής

2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλη μέσα σε κουτί	200 έως 600 κ.εκ	HDPE Κουτί χάρτινο
2.	Φιάλες	200 έως 2 λίτρα	HDPE
3.	Δοχεία	2 έως 20 λίτρα	HDPE

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Κατευθυνόμενος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 20-50 λίτρα νερό στο στρέμμα, χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια με το φύλλωμα ή τους τρυφερούς βλαστούς ή τους καρπούς των καλλιεργειών προς αποφυγήν τυχόν συσσώρευσης υπολειμμάτων τους καρπούς. Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI).

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινείτε καλά τη φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Συνδυαστικότητα: Δε συνιστάται η ανάμιξη με άλλα σκευάσματα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση τους μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών και πλατύφυλλων) ζιζανίων. Συνδυασμός ενός μη εκλεκτικού ζιζανιοκτόνου (glyphosate) και ενός ορμονικού (MCPA). Το glyphosate απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας την βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων. Το MCPA απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες των πλατύφυλλων ζιζανίων και μετακινείται δια μέσου συμπλαστή και αποπλάστη και συγκεντρώνεται στους νεαρούς μεριστωματικούς ιστούς, αναστέλλοντας την ανάπτυξη των ζιζανίων. Τα συμπτώματα εμφανίζονται 2 – 4 ημέρες μετά τον ψεκασμό.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο. Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		Κ.εκ./ στρ	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Εσπεριδοειδή Γκρέιπ φρουτ CIDPA, Λεμονιά CIDLI, Μανταρινιά CIDRE, Πορτοκαλιά CIDSI Φράπα CIDGR Κιτρολέμονα CIDME Περγαμόντα CIDAB Κουμκουάτ FOLSS Νεραντζιά CIDAU (άνω των 3 ετών)	Ετήσια αγρωστώδη ¹ και πλατύφυλλα ² ζιζάνια	400 – 600	20 – 50	Κατευθυνόμενος ψεκάσμος όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης (Άνοιξη-Καλοκαίρι)	1 – 2 / 90 ημέρες
	Πολυετή ³ ζιζάνια	600			
Μηλοειδή Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO Κυδωνιά CYDOB, Αχλαδόμηλα PYUPC Μουσμουλιά MSPGE (άνω των 3 ετών)	Ετήσια αγρωστώδη ¹ και πλατύφυλλα ² ζιζάνια	400 – 600	30 – 50	Κατευθυνόμενος ψεκάσμος όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης (Άνοιξη-Καλοκαίρι)	1 – 2 / 90 ημέρες
	Πολυετή ³ ζιζάνια	600			
Πυρηνόκαρπα Ροδακινιά PRNPS, Βερικοκιά PRNAR Δαμασκηνιά PRNDO Κερασιά PRNAV Βυσσινιά	Ετήσια αγρωστώδη ¹ και πλατύφυλλα ² ζιζάνια	400 – 600	30 – 50	Κατευθυνόμενος ψεκάσμος όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης (Άνοιξη-καλοκαίρι ή Άνοιξη-φθινόπωρο)	1 – 2 / 90 ημέρες
	Πολυετή ³ ζιζάνια	600			

PRNCE (άνω των 3 ετών)					
Ελιά (ελαιοποιήσιμη και επιτραπέζια) OLVEU (άνω των 3 ετών)	Ετήσια αγρωστώδη ¹ και πλατύφυλλα ² ζιζάνια	400 – 600	20 – 50	Κατευθυνόμενος ψεκασμός την άνοιξη και το φθινόπωρο	1 – 2 / 90 ημέρες
	Πολυετή ζιζάνια	600			
	Εξάλειψη των παραφυάδων	600	20	Κατευθυνόμενος ψεκασμός στην βάση του κορμού, σε παραφυάδες μικρότερες από 25 εκ. την Άνοιξη ή το Φθινόπωρο	1

Παρατηρήσεις:

1. Εφαρμόζεται σε ήδη φυτρωμένα ζιζάνια. Τα αποτελέσματα της επέμβασης μπορούν να παρατηρηθούν σε 2-4 ημέρες μετά την εφαρμογή (ή μία εβδομάδα σε περίπτωση χαμηλών θερμοκρασιών).
2. Για να επιτευχθεί μακρόχρονη δράση να αποφεύγονται οργώματα ή φρεζαρίσματα ένα μήνα πριν και 2 εβδομάδες μετά την εφαρμογή.

Καταπολεμούμενα Ζιζάνια**1.Ετήσια Αγρωστώδη:**

Bromus sp. – BROSS (Βρόμοι).
Digitaria sanguinalis – DIGSA (Αιματόχορτο)
Echinochloa crus-galli – ECHCG (Μουχρίτσα)
Lolium spp. – LOLSS
Poa annua – POAAN
Setaria sp – SETSS (Σετάριας)

2.Ετήσια Πλατύφυλλα:

Amaranthus retroflexus – AMARE (Βλήτα)
Capsella bursa-pastoris – CAPBP (Καψέλλα)
Cardamine hirsuta – CARHI (Καρδαμίνια)
Conyza sp - CNDSS (Κόνυζα)
Convolvulus arvensis – CONAR (Περικοκλάδα)
Diploaxis erucoides – DIPER, (Άγρια ρόκα)
Erigeron sp – ERISS
Malva sylvestris – MALSI (Μολόχα)
Medicago sp– MEDSS (Μηδική)
Ranunculus repens – RANRE (Ρανούγκουλος)
Senecio vulgaris – SENVU (Μαρτιάκος)
Sinapis alba – SINAL (Ήμερο σινάπι)
Sonchus oleraceus – SONOL (Ζωχοί)
Stellaria media – STEME (Στελλάρια)
Veronica sp – VERSS (Βερόνικα)

3. Πολυετή ζιζάνια:*Cynodon dactylon* – CYNDA (Αγριάδα)*Equisetum sp* – EQUSS (αλογοουρά)*Mentha sp* – MENSS (Μέντα)*Oxalis per carpa* - OXASS (Οξαλίδα)*Plantago spp.* – PLASS (Πεντάνευρο)*Taraxacum officinale* – TAROF (Ταραξάκος)*Trifolium repens* – TRFRE (Αγριοτρίφυλλο)**Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:***Sonchus asper* - SONAS (Ζωχοί).*Trifolium arvense* – TRFAR (Αγριοτρίφυλλο).

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

1. Ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας την επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με φύλλωμα, τρυφερούς βλαστούς, παραφυάδες και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος.
2. Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκατεστημένους οπωρώνες από το 3ο έτος από την φύτευσή τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών.
3. Μην ψεκάζετε εάν αναμένεται βροχή σε 6 ώρες.
4. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
5. Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προσ-
τατευόμενης καλλιέργειας

Δεν εφαρμόζεται

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

Δεν εφαρμόζεται

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Το προϊόν μπορεί να βλάψει ευαίσθητες καλλιέργειες όπως αμπέλι, άλλα οπωροφόρα δένδρα, κηπευτικά, μηδική κ.α., γι' αυτό αποφύγετε την επαφή του προϊόντος με

άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

τις καλλιέργειες αυτές ακόμη και με τη μορφή αερομεταφερόμενων σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος. Στην περίπτωση γειτνίασης με καλλιέργειες μηδικής, πραγματοποιήστε την εφαρμογή τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη σπορά της καλλιέργειας αυτής.

9 Εικονογράμματα κινδύνου

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS07

GHS09

10 Δηλώσεις επικινδυνότητας

H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

«Φοράτε γάντια, ολόσωμη φόρμα εργασίας και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και γάντια, ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την εφαρμογή του σκευάσματος»

«Σε περίπτωση επανεισόδου, θα πρέπει να φοράτε γάντια, μακρύ παντελόνι και πουκάμισο με μακριά μανίκια»

Όταν η καλλιέργεια γειτνιάζει με κατοικημένη περιοχή, να αφήνετε ζώνη ασφαλείας 10 μέτρων από αυτή.

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης από τα επιφανειακά ύδατα:

- 20 μέτρων σε μηλοειδή και πυρηνόκαρπα
- 10 μέτρων σε ελιά

SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήνετε μίαν απέκαστη ζώνη προστασίας

- 10 μέτρων από μη γεωργική γη ή
- 5 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς κατά 50 % ή
- 1 μέτρο σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς κατά 90%.

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P305 + P351 + P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P337 + P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός:

Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση κατάποσης: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:** 210 7793777.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργειες	Ημέρες
Εσπεριδοειδή, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα	--
Ελιά	60

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο [Παράρτημα III](#) της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει στην ΣΕΑ εντός 24 μηνών τα ακόλουθα:

1. An enforcement method, including a confirmatory method and an ILV method (validated according to SANCO/825/00 rev-8.1), for the determination of MCPA residues in high oil commodities
2. A new validated method according to guidance document SANCO/825/00 rev.8.1, for monitoring of MCPA residues in soil at 0.05 mg/kg LOQ
3. Study on MCPA residue storage stability in citrus samples - (high-acid content commodity) - (max. 141 days)

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το

περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.

2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ. Α. Μαυρίδου