



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 31.07.2019
Αριθ. πρωτ: 4820/101620

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κ. Μητσοπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 165
e-mail: kmitsopoulou@minagric.gr

Προς: EXCLUSIVAS SARABIA S.A., Ισπανία
(Διά του υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. – Agribiz)
Ξενίας 1, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα
e-mail: technical@alfagro.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 14703 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ESTIUOIL (Paraffin oil/ (CAS 8042-47-5) 79% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση) και τις δηλώσεις προφύλαξης»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 απόφαση (ΦΕΚ Β'/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
6. Την με αριθ. 619/46787/8.3.19 (ΦΕΚ Β' 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ. Αραχωβίτη, του Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ολ. Τελιγιορίδου με θέμα «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Υπουργού”, “με εντολή Υφυπουργού” ή “με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού”, κατά περίπτωση, στους: Γεν. Γραμματέα, Γεν. Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γεν. Δ/σης, Προϊσταμένους Δ/σης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων” (Β' 988), όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» (Β' 1241) και τροποποιήθηκε με την αριθ. 1679/153682/25-06-2019 (Β' 2701) ΚΥΑ.
7. Τη με αριθ. πρωτ. 1756/17293/28.03.2017 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14605 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος LAINCOIL (Paraffin oil/ (CAS 8042-47-5) 79 % β/ο).

8. Τη με αριθ. πρωτ. 4815/101600/18.06.2019 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14703 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ESTIUOIL (Paraffin oil/ (CAS 8042-47-5) 79% β/ο).
9. Τη με αριθ. πρωτ. 4820/101620/09.05.2019 αίτηση της εταιρείας EXCLUSIVAS SARABIA S.A., Ισπανία, δια του υπεύθυνου επικοινωνίας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. – «AGRIBIZ».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Τροποποιούμε την με αριθμό 14703 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ESTIUOIL (Paraffin oil/ (CAS 8042-47-5) 79% β/ο), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 4815/101600/18.06.2019 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση) και τις δηλώσεις προφύλαξης

Συγκεκριμένα, τα σημεία **5** και **11** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/ στρ.)	κ.εκ. / στρ		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Γκρεϊπ φρούτ, CIDPA, Λεμονιά CIDLI, Μανταρινιά CIDRE, Πορτοκαλιά CIDSI, Φράπα CIDGR	Κόκκινη ψώρα (<i>Aonidiella aurantii</i> -AONDAU) Άσπρη ψώρα (<i>Aspidiotus nerii</i> - ASPDNE) Παρλατόρια/ Μαύρη ψώρα (<i>Parlatoria</i> <i>pergande</i> -PARLPE) Μυτιλόμορφη ψώρα (<i>Lepidosaphes</i> <i>beckii</i> -LEPSBE) Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus</i> <i>urticae</i> -TETRUR) κ.α. ακάρεα (<i>Eutetranychus</i> <i>banksi</i> - EUTEBA, <i>Panonychus citri</i> - METTCI)	1000-1500	100-200	1000 - 3000	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολή, πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών.	1
ΜΗΛΟΕΙΔΗ Μηλιά MABSD, Αχλαδιά PYUCO, Κυδωνιά CYDOB, Μουσμουλιά	Ψώρα Σαν-Ζοζέ (<i>Quadraspidiotus</i> <i>perniciosus</i> -QUADPE) Βαμβακάδα (<i>Pseudaulacaspis</i> <i>pentagona</i> *- PSEAPE)	750 -1000	50-150	375- 1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολή, πριν την άνθηση.	1

MSPGE, Αχλαδομηλιά PYUPC	Ψευδόκοκκος <i>(Planococcus citri*</i> PSECCI) Ψώρες <i>(Eriococcus</i> <i>lagerstroemiae*</i> ERIOIA) Ματόψειρα <i>(Eriosoma</i> <i>Lanigerum*</i> ERISLA)					
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Βερικοκιά PRNAR Κερασιά PRNAV Ροδακινιά PRNPS Δαμασκηλιά PRNDO	Ψώρα Σαν-Ζοζέ <i>(Quadraspidiotus</i> <i>perniciosus</i> <i>-QUADPE)</i> Βαμβακάδα <i>(Pseudalacaspis</i> <i>pentagona</i> <i>-PSEAPE)</i> Κίτρινος τετράνυχος <i>(Tetranychus</i> <i>urticae*- TETRUR)</i>	750 - 1000	50-150	375- 1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολή, πριν την άνθηση.	1
Αμυγδαλιά* PRNDU <i>(χρήση ήσσονος</i> <i>σημασίας)</i>	Ψώρα Σαν Ζοζέ <i>(Quadraspidiotus</i> <i>perniciosus-</i> <i>QUADPE)</i> Βαμβακάδα ή Διάσπης <i>(Pseudalacaspis</i> <i>pentagona-</i> <i>PSEAPE)</i> <i>(Planococcus</i> <i>/Pseudococcus</i> <i>citri-PSECCI)</i> (Diaspis-DIASSP) Λεκάνιο <i>(Saissetia oleae-</i> <i>SAISOL)</i> Παρλατόρια <i>(Parlatoria oleae-</i> <i>PARLOL)</i> Μυτιλόμορφη ψώρα <i>(Lepidosaphes</i> <i>ulmi-LEPSUL)</i> Κηροπλάστης <i>(Ceroplastes</i> <i>rusci-CERPRU)</i> Ψώρες <i>(Sphaerolecanium</i>	750-1000	50-150	375-1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	1

	<p><i>prunastri-LECAPN)</i> <i>(Eulecanium persicae-LECAPE)</i> Κίτρινος τετράνυχος <i>(Tetranychus urticae-TETRUR)</i> Κόκκινος Τετράνυχος <i>(Metatetranychus ulmi-METTUL)</i> Παραμορφωτικό ακάρι <i>(Aceria sheldoni-ACEISH)</i> Ακάρεα <i>(Aculus pelekassi-ACULPE)</i> <i>(Bryobia rubrioculus-BRYORU)</i></p>					
Φουντουκιά* CYLAV <i>(χρήση ήσσονος σημασίας)</i>	<p>Βαμβακάδα <i>(Diaspis-DIASSP)</i> Κίτρινος Τετράνυχος <i>(Tetranychus urticae-TETRUR)</i> Κόκκινος Τετράνυχος <i>(Metatetranychus ulmi- METTUL)</i> Ακάρεα <i>(Bryobia praetiosa-BRYOPR)</i></p>	750–1000	50–150	375–1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	1
Φιστικιά* PIAVE <i>(χρήση ήσσονος σημασίας)</i>	<p>Κίτρινος Τετράνυχος <i>(Tetranychus urticae-TETRUR)</i> Λεκάνιο <i>(Saissetia oleae-SAISOL)</i> Ψώρες <i>(Parthenolecanium prunosum-LECAPI)</i> <i>(Parthenolecanium corni-LECACO)</i> <i>(Coccus</i></p>	750–1000	50–150	375–1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	1

	<i>hesperidum-COCICHE)</i>					
Ελιά OLVEU	Παρλατόρια <i>(Parlatoria oleae*-PARLOL)</i> Λεκάνιο <i>(Saissetia oleae*-SAISOL)</i> Πολλίνια <i>(Pollinia pollini*-POLNPO)</i> Άσπρη ψώρα <i>(Aspidiotus nerii*-ASPDNE)</i> Μυτιλόμορφη ψώρα <i>(Lepidosaphes ulmi*-LEPSUL)</i> Ψώρες <i>(Leucaspis riccae*-LEUARI)</i> <i>(Chrysomphalus dictyospermi*-CHRYDI)</i> Ακάρεα <i>(Eriophyes vitis*-ERPHVI)</i> <i>(Tegolophus hassani*-TEGLSP)</i> <i>(Oxycenus maxwelli*-OXYNMA)</i> <i>(Eotetranychus carpini*-EOTECA)</i>	750 – 1000	50 – 150	375 –1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	1
Αμπέλι VITVI	Ψευδόκοκκος <i>(Planococcus citri*-PSECCI)</i> <i>(Planococcus ficus*-PLANFI)</i> Ερίνωση <i>(Eriophyes vitis*-ERPHVI)</i> Κίτρινος Τετράνυχος <i>(Tetranychus urticae*-TETRUR)</i>	750 – 1000	50 – 150	375 –1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	1
Ροδιά* PUNGR (χρήση ήσσονος σημασίας)	Τετράνυχος <i>(Tetranychus Urticae-TETRUR)</i> Ακάρεα <i>(Eriophyes</i>	750 – 1000	50 – 150	375 –1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής,	1

	<i>grannati</i> -ACEIGA)				πριν την άνθηση	
Συκιά* FIUCA (χρήση ήσσονος σημασίας)	Κίτρινος Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> -TETRUR) Κόκκινος Τετράνυχος (<i>Metatetranychus Ulmi</i> - METTUL) Κηροπλάστης (<i>Ceroplastes rusci</i> - CERPRU) Ψευδόκοκκος (<i>Planococcus ficus</i> - PLANFI)	750 – 1000	50 – 150	375 –1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	1
Ακτινιδιά* ATIDE (χρήση ήσσονος σημασίας)	Κίτρινος Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> -TETRUR) Κόκκινος Τετράνυχος (<i>Metatetranychus ulmi</i> -METTUL) Ψώρα Σαν Ζοζέ (<i>Quadraspidiotus Perniciosus</i> -QUADPE) Βαμβακάδα ή Διάσπις (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i> -PSEAPE)	750 – 1000	50 – 150	375–1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

1. Το εύρος των δόσεων και ο όγκος ψεκαστικού υγρού είναι ανάλογα με το ύψος των φυτών και την ένταση της προσβολής.
 2. Κατά τη χρήση του ESTIUOIL τα δένδρα πρέπει να είναι επαρκώς ποτισμένα. Ποτίζουμε μία εβδομάδα πριν από τον ψεκασμό.
 3. Αποφύγετε τον ψεκασμό όταν τα φυτά είναι στρεσαρισμένα, σε περιόδους έντονης ξηρασίας ή όταν υπάρχει παγετός.
 4. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32⁰C, γιατί μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα φυτοτοξικότητας.
 5. Να μη γίνεται εφαρμογή του ESTIUOIL επί 40 ημέρες, μετά την εφαρμογή θείου ή θειασβεστίου ή σκευασμάτων με δ.ο. captan ή folpet.
- * Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Φιστικιά, Ελιά, Αμπέλι, Ροδιά, Συκιά και Ακτινιδιά καθώς και για την αποτελεσματικότητα κατά των εχθρών ήσσονος σημασίας από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

11

Δηλώσεις
προφύλαξης:

P405+ P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Sp1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα: 5 μέτρων σε Εσπεριδοειδή και 10 μέτρων σε Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, **Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Φιστικιά, Ελιά, Αμπέλι, Ροδιά, Συκιά και Ακτινιδιά.**

Spe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους, να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη.

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

B

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 4815/101600/18.06.2019 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ

Ι. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ