



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 28 - 08 - 2019
Αριθ. πρωτ: 8732/212744

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 9212090
Πληροφορίες: Θεοδωρής Παναγιώτης
Τηλέφωνο: 210 9287225
e-mail: ptheodoris@minagric.gr

Προς: ΒΙ-ΡΑ ΝV/SA, Βέλγιο
(δια της εταιρείας
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ ΕΕ,
"AGRIBIZ", Ξενίας 1,
115 27-Αθήνα)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 60.649 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο με ζωντανούς μικροοργανισμούς) VINTEC® (*Trichoderma atroviride* strain SC1 15% β/β) ως προς τις συσκευασίες και το φάσμα δράσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ' αριθ. πρωτ. 619/46787/08-03-2019 (ΦΕΚ 988/Β'/22-03-2019) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού», «με εντολή Υφυπουργού» ή «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού», κατά περίπτωση, στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων", όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» στο ΦΕΚ Β' αριθ. 1241/12-04-2019 και τροποποιήθηκε με την αριθ. 1679/153682/25.06.19 (Β' 2701) ΚΥΑ.
4. Την άδεια διάθεσης στην αγορά της Γαλλίας με αριθμό έγκρισης (ΑΜΜ):2169998 όπως τροποποιήθηκε από τις 08.02.2019

2

5. Τις με αριθ. πρωτ. 10064/132297/02-10-2018 και 4308/90284/23-04-20149 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Τροποποιούμε την με αριθ. 60.649 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο με ζωντανούς μικροοργανισμούς) VINTEC®, που χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 3966/38523/05-12-2017 απόφασή μας και τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 2036/29573/01-06-2018 απόφασή μας, ως προς τις συσκευασίες και το φάσμα δράσης.

Συγκεκριμένα, τα σημεία 2 και 5 διαμορφώνονται ως εξής:

2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Κουτί με εσωτερικό σακίδιο/α	10 γρ. έως 1 κιλό	Σακίδιο σύνθετου υλικού Πολυαιθυλένιο / αλουμίνιο / Πολυαιθυλένιο Κουτί χάρτινο
2	Σακίδιο	10 γρ. έως 1 κιλό	Σακίδιο σύνθετου υλικού Πολυαιθυλένιο / αλουμίνιο / Πολυαιθυλένιο

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο. Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
		Γραμ. /στρ. (Μεγ.)	Γραμ. /100 λίτρα ψ.υ.	Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ		
Αμπέλι VITVI, (Ποικιλίες επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες) (2,3,4)	Ίσκα (<i>Phaeomoniella chlamydospora</i> – RHMOCH, <i>Phaeoacremonium aleophilum</i> – TOGNMI, <i>Diplodia seriata</i> – DIPDSE <i>anamorph of Botryosphaeria obtusa</i> – BOTSOB)	20	200	10 – 20	Κατευθυνόμενος ψεκασμός στις πληγές κλαδέματος, κατά το λήθαργο της καλλιέργειας, μετά το κλάδεμα και πριν το φούσκωμα των οφθαλμών. Επανάληψη ψεκασμού, εάν χρειαστεί, όταν επικρατούν δυσμενές καιρικές	1 – 2 / 7

	Ευτυπίωση (<i>Eutypa lata</i> – EUTYLA)				συνθήκες (έντονες βροχές > 10 mm ή χαμηλές θερμοκρασίες < 10° C) κατά ή μετά την πρώτη εφαρμογή	
Φυτώρια αμπελιού και προετοιμασία μοσχευμάτων ⁽¹⁾	Ίσκα (<i>Phaeoconiella chlamydospora</i> – PHMOCH, <i>Phaeoacremonium aleophilum</i> – TOGNMI, <i>Diplodia seriata</i> – DIPDSE <i>anamorph of Botryosphaeria obtusa</i> – BOTSOB)	--	200	--	Εφαρμογή πριν την φύτευση με εμβάπτιση ή διαβροχή (Drench) των κληματίδων (υποκείμενα και εμβόλια) ή με άρδευση των εμβολιασμένων φυτών	1 – 4
Τομάτα ⁽⁵⁾ LYPES (Θερμοκηπίου)	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> – BOTRCI	15	5 – 10	50 – 150	Προληπτικοί ψεκασμοί που ξεκινούν όταν οι πρώτοι πλευρικοί βλαστοί είναι ορατοί έως τη συγκομιδή BBCH 21 – 89	8 / 5

Παρατηρήσεις:1. Για την προετοιμασία μοσχευμάτων:

Πρώτη εφαρμογή: πριν την αποθήκευση των κληματίδων σε ψυγείο, με εμβάπτιση ή διαβροχή (Drench) για 3 ώρες. Αυτή η εφαρμογή δεν απαιτείται σε περίπτωση θερινού εμβολιασμού.

Δεύτερη εφαρμογή: κατά τη διάρκεια της ενυδάτωσης των κληματίδων (όταν τα υποκείμενα βρίσκονται σε σπαργή), πριν τον εμβολιασμό, με εμβάπτιση ή διαβροχή (Drench) για 5 - 12 ώρες

Τρίτη εφαρμογή: κατά τη στρωμάτωση, με άρδευση των κληματίδων (υποκείμενα)

Τέταρτη εφαρμογή: πριν τη φύτευση, με εμβάπτιση ή διαβροχή (Drench) των ακρών των προς φύτευση κληματίδων (υποκείμενα και εμβόλια) για 1 ημέρα. Μπορεί να εφαρμόζεται σε συνδυασμό με σκευάσματα που περιέχουν Mycorrhiza και με ορμονικά σκευάσματα για την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος.

2. Εφαρμόστε το Vintec®, τις ημέρες που έπονται του κλαδέματος, μόλις η ελάχιστη θερμοκρασία φθάσει τους 10 °C για τουλάχιστον 5 ώρες και η σχετική υγρασία είναι >70%.

3. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρειάζεται μετά την εφαρμογή, να ακολουθήσει περίοδος 48 ωρών χωρίς βροχή ή παγετό.

4. Συνιστάται η χρήση του Vintec® σε συνδυασμό με προληπτικά καλλιεργητικά μέσα όπως η χρήση ελεγμένων υποκείμενων, η εξασφάλιση ποιότητας των μοσχευμάτων, το είδος, η εποχή και η ποιότητα του κλαδέματος, ο περιορισμός της προσβολής στον αγρό με απομάκρυνση και κάψιμο των νεκρών κληματίδων.

5. Στην πράξη τα κάτω φύλλα των φυτών τομάτας αφαιρούνται από το φυτό τακτικά (περίπου εβδομαδιαίως). Έτσι, κάθε εβδομάδα υπάρχουν νέες πληγές, οι οποίες μπορεί να μολυνθούν με *Botrytis cinerea*.
Συνιστάται η εφαρμογή του Vintec κάθε φορά που δημιουργούνται νέες πληγές σαν προληπτική θεραπεία.
6. Η χρήση του σκευάσματος μπορεί να ενταχθεί σε προγράμματα ολοκληρωμένης καταπολέμησης.

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. 3966/38523/05-12-2017 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθ. πρωτ. 2036/29573/01-06-2018 απόφασή μας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ